Cabinet Dentaire du Bourg

36 rue de Melun, 77176 Savigny-le-Temple
01 83 86 97 81 · cabinetdentairedubourg.fr

FICHE CONSEIL 02

Les premiers jours après votre implant

Comment favoriser la cicatrisation de l'os et de la gencive autour de l'implant.

LE JOUR DE LA POSE

- Appliquez du froid sur la joue, par périodes de 10 minutes.
- Ne crachez pas et ne rincez pas votre bouche pendant 24 heures.
- Évitez les efforts physiques, le tabac et l'alcool.

LES JOURS SUIVANTS

- Mangez tiède et mou, du côté opposé à l'implant.
- Brossez les autres dents normalement ; autour de l'implant, suivez les consignes données au fauteuil.
- Prenez le traitement prescrit en respectant les doses.
- Ne portez pas de prothèse amovible sur la zone, sauf si nous vous l'avons indiqué.

LE TABAC

- Le tabac augmente nettement le risque d'échec de l'implant : l'arrêter, même temporairement, aide la cicatrisation.

APPELEZ LE CABINET SI

- le saignement ne s'arrête pas ;
- la douleur ou le gonflement augmentent après le 3e jour ;
- vous avez de la fièvre.

Sources : UFSBD, Fiche Implant · EFP, Prévention de la péri-implantite · HAS, Douleur postopératoire en chirurgie buccale (2005)