

 **목표** — 번호만 적힌 **미지 혈액 시료**의 ABO 혈액형을
항 A·항 B 혈청과의 **응집 반응**으로 직접 판정하라.

나의 시료 번호

(), ()

A. 실험 방법

- 1 판정판 두 칸에 **같은 시료**를 각각 한 방울씩 떨어뜨린다. (시료 1개당 2칸 사용)
- 2 한 칸엔 **항 A 혈청**, 다른 칸엔 **항 B 혈청**을 한 방울씩 떨어뜨린다.
- 3 각 칸을 **이쑤시개로 섞고** 1~2분간 관찰한다. **이쑤시개는 칸마다 새로운 쪽으로!**
- 4 결과를 관찰하고 활동지에 기록한다.

⚠ **유의** — 혈청 스포이트 끝이 시료에 닿지 않게(교차 오염 방지) · 모의 혈액이므로 인체에 무해하나 입·눈에 넣지 말 것 · 흘리면 즉시 닦기

B. 실험 결과 기록

시료 번호	항 A 혈청 응집 여부	항 B 혈청 응집 여부	판정한 혈액형
()	(O / X)	(O / X)	()형
()	(O / X)	(O / X)	()형

C. 판정 근거 서술 & 고찰

1. 아래 예시 문장을 완성하여, 두 시료를 그렇게 판정한 **근거**를 서술하시오. (응집이 일어나 응집원이 있으면 '있음', 응집이 일어나지 않아 응집원이 없으면 '없음'에 ○표)
- ▶ **첫번째 시료** : 항 A 혈청과의 응집 결과로부터 응집원 _____ 가 (**있음 · 없음**), 항 B 혈청과의 응집 결과로부터 응집원 _____ 가 (**있음 · 없음**)을 알 수 있다. 따라서 _____ 번 혈액은 _____ 형이다.
 - ▶ **두번째 시료** : 항 A 혈청과의 응집 결과로부터 응집원 _____ 가 (**있음 · 없음**), 항 B 혈청과의 응집 결과로부터 응집원 _____ 가 (**있음 · 없음**)을 알 수 있다. 따라서 _____ 번 혈액은 _____ 형이다.
2. 내가 판정한 혈액을 아래 환자에게 **소량 수혈**할 때, 빈칸을 채우고 알맞은 말에 ○표 하시오. (소량 수혈이므로 공혈자의 혈장에 든 응집소는 충분히 희석되어 무시한다.)
- ▶ 나의 **첫번째** 시료(_____ 번, _____ 형)를 **O형 환자**에게 소량 수혈하면,
O형 환자 혈장에는 응집소 _____ · _____ 가 모두 있고, 내 시료의 응집원은 _____ (이)므로 응집 반응이 (**일어난다 · 일어나지 않는다**).
 - ▶ 나의 **두번째** 시료(_____ 번, _____ 형)를 **AB형 환자**에게 소량 수혈하면,
AB형 환자 혈장에는 응집소가 _____ . 따라서 응집 반응이 (**일어난다 · 일어나지 않는다**).