

דפי 2

שאלה 7

אנחנו רוצים למצוא את המרכז μ_j של המרחב M_j החד-ממדי.

הביטוי: $\|x_i - \mu_j\|$.

אם חוקי אוקלידס איננו ידועים: $\|x_i - \mu_j\|^2 = (x_i - \mu_j)^T (x_i - \mu_j)$

~~המשפט הבא~~

גם זה נכון: $(x_i - \mu_j)^T (x_i - \mu_j) = x_i^T x_i - x_i^T \mu_j - \mu_j^T x_i + \mu_j^T \mu_j \stackrel{(1)}{=} \|x_i\|^2 - 2x_i^T \mu_j + \|\mu_j\|^2$

$\|x_i\|^2 - 2x_i^T \mu_j + \|\mu_j\|^2 \stackrel{(2)}{=} 1 - 2x_i^T \mu_j + 1 = 2 - 2x_i^T \mu_j$

כאן מקבלים:

(1) $x_i^T \mu_j = \mu_j^T x_i$

(2) $\|x_i\|^2 = 1, \|\mu_j\|^2 = 1$ בוקר המרחב החד-ממדי.

לכן, הביטוי שקיבלנו מופיע מקצוע פחות ביטוי מלא במכנס. כמובן שאם מניחים את הביטוי, אנחנו צריכים שהמרחב יהיה חד-ממדי. אחרי זה נראה שכל הניגון. כזוהי $\max_j (x_i^T \mu_j) = \max_j (2 - 2x_i^T \mu_j)$

זה הוא קטע חזק. אולי ישנה יתרונה של $\max_j (x_i^T \mu_j)$ וכן ניתן להשתמש במרחב. אז $\max_j (x_i^T \mu_j) = \max_j (2 - 2x_i^T \mu_j)$ נכון.

שאלה 1 ע"פ א

כפי הנקרא תגובה היא לא.

אלאורית A מחשב את המכש הנקב A יזי בק שהיו מכש מחשב
אורית A כמה לקוד. סומר, המחשב הנקב A יזי כמה בק
היחידה וזה כי כל הנקודות A מחשב A המחשב.

אלאורית B , מכש B חסיה וזה A המחשב A המחשב הנקב
נכנס לוק הנקוד (A, B) . שלב האיטיות העיה A המחשב
האלאורית B יזי A המחשב, לזאת אלאורית A B
כל העכ"ל באוריות שצ"ל. לכן, A המחשב העיה
היוק A הנקודת ופנה בין A המחשב A המחשב
יכנס ללוק A המחשב.

שאלה 2 א

בהינתן שתי קבוצות A ו- B בעלות n איברים, נניח כי $|A \cap B| = k$.
 א. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.
 ב. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.

שאלה 2 ב

מכיוון שהקבוצה A מכילה את k האיברים, נניח כי $|A \cap B| = k$.
 א. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.
 ב. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.

מכיוון של k איברים קיימת חבורה H של k איברים, נניח כי $|A \cap B| = k$.
 א. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.
 ב. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.

שאלה 2 ג

(א) בכוון.

היה קבוצה A של n איברים, נניח כי $|A \cap B| = k$.
 א. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.
 ב. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.

קבוצה A של n איברים, נניח כי $|A \cap B| = k$.
 א. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.
 ב. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.

$$|N_{A_1}(x) \cap N_{A_2}(x)| \geq |N_{A_1}(x) \cap N_{A_2}(x)|$$

מכיוון שהמספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$ הוא $n - k$, נניח כי $|A \cap B| = k$.
 א. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.
 ב. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.

(ב) בכוון.

היה קבוצה A של n איברים, נניח כי $|A \cap B| = k$.
 א. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.
 ב. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.

$$|N_{A_1}(x) \cap N_{A_2}(x)| \geq |N_{A_1}(x) \cap N_{A_2}(x)|$$

לפיכך, יש מקסימום של $n - k$ קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.
 א. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.
 ב. קבעו את המספר המקסימלי של קבוצות C המקיימות את התנאי $|C \cap A| = k$ ו- $|C \cap B| = k$.

d fino a due

$\Delta \text{H}^\circ_{\text{f}} = -90.7 \text{ kJ/mol}$

החלטות 17/3 נעו 8 יולי 1971 חזר 01/32 R_A

העני"ה 2137 משה סג"ל ישיבת תלמידי חכמים 2137

$R_2 > R_1$ 1" für

מסמך K-1000 מיום 10/10/1998 מר 13/12/1998 קיבלתי ~~מסמך~~ מסמך 155555

20' בקוטר מניח את זה 14 מטר במרכז באמצע קוטר

ישראל.

החלטת הוועדה להקדמת חוקי המבחן

$\Rightarrow f_{k=2} = \dots$

השטח שבו נמצא המבנה הוא שטח חקלאי.

NYRW 1701 2A31A

c fy 0 3 1/10

7120 7586

נסים שלחמן 3216 יר 8 ב'ר מספיר 3' 11/16 י' 3251 Minpts=2

$$x_1=0, x_2=0.1, x_3=10, x_4=11 \quad \rho \approx 0.60-0.64 \approx 0.62$$
$$x_1 = 1.5, x_2 = 0.5 \rightarrow 1.312, 1.0127$$

זא אבאט פארוואס מ'האט דאס געטאן, און ער האט דאס געטאן

1. $\Gamma_{\text{H}} \approx 10^{-10}$ s

סכך המעצב איננה יכולה.

4 fuso 3 ora

$$\min_{\text{new}} P_{\text{ts}} > \min_{\text{old}} P_{\text{ts}} \Rightarrow \min_{\text{old}} P_{\text{ts}} < \min_{\text{new}} P_{\text{ts}} \quad \text{if } \Delta P_{\text{ts}} > 0 \text{ is the case}$$

$|N_{\epsilon}(x)| \geq \min_{new} \dots$

$|N(x)| \geq \min P \int_{\Omega} \dots$

קבוצת הקורס היא חצי המעגל הקטן וקבוצת הקורס היא חצי המעגל הגדול.

כאומר, C_{new} יציג דגן חדש חלק מ- C_{old}

17. ב. כשהוא חתם קיבל מוסדות ~~ממ~~ גמל על