



(KEMNA0302) Alkalmazott lineáris algebra

Dr. Facskó Gábor, PhD
tudományos főmunkatárs
facskog@gamma.ttk.pte.hu

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Matematikai és Informatikai Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Wigner Fizikai Kutatóközpont, Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
<https://facsko.ttk.pte.hu>

2025. április 17.

Ütemterv

- ▶ **Hátralévő órák: 2025. április 17, 30, május 7.**
- ▶ Szinguláris érték, szinguláris vektor, SVD, PCA.
- ▶ ~~Mátrixok összehasonlítása, pozitív mátrixok, nemnegatív mátrixok, irreducibilis mátrixok, SMRC, NMF.~~
- ▶ Reakcióegyenletek sztöchiometrikus rendezése.
- ▶ ~~Lineáris programozási feladatok mátrixaritmetikai megoldhatósága.~~
- ▶ ~~Power of matrices. Applications: linear recursions, power of incidence matrixes.~~
- ▶ ~~Gram-Schmidt orthogonalization.~~
- ▶ ~~Further applications.~~

Szinguláris érték, szinguláris vektor, SVD I

- ▶ (Szinguláris érték) A szimmetrikus mátrix ortogonális diagonalizálásának általánosítása tetszőleges mátrixra, egy helyett két ortonormált bázis megkeresésével.
- ▶ Információtömörítésre, egyenletrendszerek megoldására használják.
- ▶ Az ortogonális diagonalizáció általánosítása, A sajátértékek szerepét a szinguláris értékek veszik át, a sajátfelbontását a szinguláris érték szerinti felbontás (SVD).
- ▶ Egy $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrixhoz tartozó mátrixleképezés kölcsönösen egyértelmű a sortér és az oszloptér között.
- ▶ Ebben a két altérben keresünk ortonormált bázisokat, melyek közt a leképezés mátrixa diagonális alakot ölt.
- ▶ Ezeket kiegészítjük az \mathbb{R}^n és az \mathbb{R}^m ortonormált bázisává.
- ▶ A komplex terekben mindez hasonlóképpen megvalósítható.

Szinguláris érték, szinguláris vektor, SVD II

- ▶ Az $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrixhoz olyan ortonormált $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} \subset \mathbb{R}^n$ és $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\} \subset \mathbb{R}^m$ bázisokat keresünk, melyekben \mathbf{A} mátrixa diagonálissá válik. Azaz, léteznek olyan σ_i valós értékek, hogy $\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \sigma_i\mathbf{u}_i$, ahol $1 \leq i \leq \min(m, n)$. Azaz, olyan egymásra merőleges vektorokat keresünk, melyek képei is merőlegesek egymásra.
- ▶ Állítás: Ha az egymásra merőleges $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ vektorok legalább egyike az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ sajátvektora, akkor az $\mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{A}\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ vektorok is merőlegesek egymásra.
Bizonyítás: A Wettl jegyzetben.
- ▶ Az $A : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$ leképezés kölcsönösen egyértelmű a sortér és az oszloptér között. Így először csak e két altérben keressünk megfelelő bázist. Közös dimenziójuk a ranggal egyenlő, jelölje ezt r .

Szinguláris érték, szinguláris vektor, SVD III

- ▶ Mivel $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ szimmetrikus és pozitív szemidefinit, ezért ortogonálisan diagonalizálható és a sajátértékei nem negatívak. A sajátvektorokból kiválasztható \mathbb{R}^n egy ortonormált bázisa, melyek közül a pozitív sajátértékekhez tartozók kifeszítik a nulltér, azaz az $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A})$ tér merőleges kiegészítő alterét, tehát a sorteret.
- ▶ Jelölje a sortér e bázisát $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$. E vektorok egyike sincs a nulltérben, és \mathbf{A} általi képek páronként merőlegesek egymásra, így az $\mathbf{A}\mathbf{v}_i$ vektorok ortogonális bázist alkotnak az oszloptérben. Ha \mathbf{v}_i az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix $\lambda_i > 0$ sajátértékéhez tartozó egységnyi sajátvektora, akkor $|\mathbf{A}\mathbf{v}_i| = \lambda_i$, ugyanis

$$|\mathbf{A}\mathbf{v}_i|^2 = \mathbf{v}_i^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \lambda_i |\mathbf{v}_i|^2 = \lambda_i.$$

Legyen $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ és $\mathbf{u}_i = \mathbf{A}\mathbf{v}_i/\sigma_i$. Ekkor az $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$ ortonormált bázist alkotnak az oszloptérben.

Szinguláris érték, szinguláris vektor, SVD IV

- ▶ Definíció: (Szinguláris érték). Az r rangú $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrix szinguláris értékeinek nevezzük az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix pozitív sajátértékeinek négyzetgyökeit, melyeket $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$ jelöl. Az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix valamely σ^2 sajátértékéhez tartozó egységnyi \mathbf{v} sajátvektorát az \mathbf{A} jobb szinguláris vektorának, az $\mathbf{u} = \frac{1}{\sigma} \mathbf{A} \mathbf{v}$ egységvektort pedig a \mathbf{v} -hez tartozó bal szinguláris vektorának nevezzük.
- ▶ A szinguláris érték különösen akkor hasznos eszköz például az egyenletrendszerek megoldásában, amikor az együtthatómátrix szinguláris.
- ▶ E definíció egyik fontos következménye, hogy mivel $|\mathbf{u}_i| = 1$, ahol $(i = 1, 2, \dots, r)$, ezért $|\mathbf{A} \mathbf{v}_i| = \sigma_i$.
- ▶ Ha σ t -szeres multiplicitású szinguláris értéke \mathbf{A} -nak, akkor σ^2 az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ -nak t -szeres algebrai (és t -szeres geometriai) multiplicitású sajátértéke, így a σ -hoz tartozó jobb szinguláris vektorok a sortérben, a hozzá tartozó bal szinguláris vektorok pedig az oszloptérben t -dimenziós alteret feszítenek ki.

Szinguláris érték, szinguláris vektor, SVD V

- ▶ Ha $\mathbf{A}\mathbf{v} = \sigma\mathbf{u}$, akkor $\mathbf{A}^T\mathbf{u} = \frac{1}{\sigma}\mathbf{A}^T\mathbf{A}\mathbf{v} = \frac{1}{\sigma}\sigma^2\mathbf{v} = \sigma\mathbf{v}$, tehát az

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \sigma\mathbf{u}, \quad \mathbf{A}^T\mathbf{u} = \sigma\mathbf{v}$$

összefüggések párba állítják a jobb és bal szinguláris vektorokat.

- ▶ Ha $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, akkor a sortér helyett a sortér konjugáltjával, azaz az $\mathcal{O}(\mathbf{A}^H)$ altérrel, transzponálás helyett adjungálással, tehát $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ helyett az $\mathbf{A}^H\mathbf{A}$ mátrixszal igazak maradnak a fentiek.
- ▶ Wettle jegyzet 10.3-as példa.
- ▶ (Szinguláris felbontás) Egy mátrix szinguláris értékei és vektorai egy mátrixfelbontást adnak, ezt fogjuk szinguláris érték szerinti felbontásnak nevezni.

Szinguláris érték, szinguláris vektor, SVD VI

- Képezzük a szinguláris értékekből a diagonális

$$\Sigma_1 = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \sigma_r \end{pmatrix}$$

mátrixot, valamint a szinguláris vektorokból az $\mathbf{U}_1 = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$ és a $\mathbf{V}_1 = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ mátrixokat. Ekkor az $\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \sigma\mathbf{u}_i$ egyenlőségek az

$$\mathbf{A}\mathbf{V}_1 = \mathbf{U}_1\mathbf{\Sigma}_1,$$

azaz az

Szinguláris érték, szinguláris vektor, SVD VII

$$\mathbf{A}(\mathbf{v}_1 \mathbf{v}_2 \dots \mathbf{v}_r) = (\mathbf{u}_1 \mathbf{u}_2 \dots \mathbf{u}_r) \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \sigma_r \end{pmatrix}$$

alakot öltik. Mivel \mathbf{V}_1 szemiortogonális, és oszlopvektorai a sortér ONB-át alkotják, ezért $\mathbf{V}_1 \mathbf{V}_1^T$ a sortérre való merőleges vetítés mátrixa, így $\mathbf{A} \mathbf{V}_1 \mathbf{V}_1^T = \mathbf{A}$, ezért jobbról szorozva a fenti egyenletet \mathbf{V}_1^T -tal kapjuk, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{U}_1 \Sigma_1 \mathbf{V}_1^T$.

- Definíció: (Redukált szinguláris felbontás és diadikus alakja). A valós (komplex) \mathbf{A} mátrix

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_1 \Sigma_1 \mathbf{V}_1^T \quad (\mathbf{A} = \mathbf{U}_1 \Sigma_1 \mathbf{V}_1^H)$$

felbontását redukált szinguláris felbontásnak nevezzük, ha Σ_1 négyzetes,

Szinguláris érték, szinguláris vektor, SVD VIII

diagonális mátrix, főátlójában monoton csökkenően rendezett pozitív valós számokkal, \mathbf{U}_1 és \mathbf{V}_1 szemiortogonálisak (komplex esetben $\mathbf{U}_1^H \mathbf{U}_1 = \mathbf{V}_1^H \mathbf{V}_1 = \mathbf{E}_r$). Ha ezt a szorzatot az \mathbf{U}_1 oszlopvektorokra és a \mathbf{V}_1^T sorvektorokra blokkosított alakjára írjuk fel, akkor az \mathbf{A} mátrix egy diadikus felbontását kapjuk, melyet szinguláris érték szerinti diadikus felbontásnak nevezünk:

$$\mathbf{A} = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^T + \sigma_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2^T + \cdots + \sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^T.$$

(komplex esetben transzponált helyett adjungálttal).

:

Szinguláris érték, szinguláris vektor, SVD IX

- ▶ Definíció: (Szinguláris felbontás). A valós (komplex) \mathbf{A} mátrix

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T \quad (\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H)$$

alakú felbontását \mathbf{A} szinguláris érték szerinti felbontásának, vagy röviden szinguláris felbontásának nevezzük, ha \mathbf{U} és \mathbf{V} ortogonális (unitér) és $\mathbf{\Sigma}$ diagonális, főátlójában monoton csökkenően rendezett nem negatív valós számokkal.

- ▶ Wettl jegyzet: 10.6-os példa.
- ▶ Tétel: (Az SVD létezése és $\mathbf{\Sigma}$ egyértelműsége). Minden valós vagy komplex mátrixnak létezik szinguláris érték szerinti felbontása. A szinguláris értékek monoton csökkenő sorozata egyértelmű, de a felbontás nem.

Bizonyítás: Wettl jegyzet.

Szinguláris érték, szinguláris vektor, SVD X

- ▶ Szinguláris felbontás geometriai interpretációja
- ▶ Egységgömb képe
- ▶ Polárfelbontás
- ▶ Pszeudo inverz

Principal Component Analysis I

- ▶ Principal Component Analysis (PCA), avagy főkomponens-analízis vagy főkomponens-elemzés egy többváltozós statisztikai eljárás, mely az adatredukációs módszerek közé sorolható.
- ▶ Lényege, hogy egy nagy adathalmaz - melynek változói kölcsönös kapcsolatban állnak egymással - dimenzióit lecsökkentse, miközben a jelen lévő varianciát a lehető legjobban megtartsa.
- ▶ Ezt úgy hajtja végre, hogy egy ortogonális (merőleges) transzformáció segítségével az adathalmaz lehetségesen korreláltatható változóit lineárisan korrelálatlan változók értékkészletévé alakítja át, melyeket főkomponenseknek nevezünk.
- ▶ A főkomponensek száma kisebb vagy egyenlő az eredeti változók számával.

Principal Component Analysis II

- ▶ A transzformáció oly módon meghatározott, hogy az első főkomponens rendelkezik a lehető legnagyobb varianciával, majd minden utána következő komponens a fennmaradó legnagyobb varianciával fog rendelkezni, ha megfelel annak a feltételnek, hogy merőleges (azaz korrelálatlan) az azt megelőző komponensekre.
- ▶ A főkomponensek merőlegesek, mivel a kovarianciamátrix - ami szimmetrikus - sajátvektorai.
- ▶ A főkomponens-analízis érzékeny az eredeti változók relatív skálázására.
- ▶ A főkomponens-analízis felfogható úgy is, mint ha egy n dimenziós ellipszoidot próbálnánk az adatokra illeszteni, ahol az ellipszoid mindegyik tengelye egy főkomponens lenne. Ha az ellipszoid valamelyik tengelye kicsi, akkor a tengely menti variancia is kicsi lesz, és ha elhagyjuk ezt a tengelyt és a hozzá tartozó főkomponenst az adathalmaz reprezentációjából, akkor csak egy ezzel arányosan kis adatmennyiséget veszítünk el.

Principal Component Analysis III

- ▶ Ahhoz, hogy megtaláljuk az ellipszoid tengelyeit, elsőként ki kell vonnunk minden változó átlagát az adathalmazból, hogy az adatokat az origó köré igazítsuk. Ezután kiszámítjuk az adatok kovarianciamátrixát és a sajátértékeket, illetve a kovarianciamátrixhoz tartozó sajátvektorokat. Utána merőlegesítjük (ortogonalizáljuk) és normalizáljuk a sajátvektor halmazt (ONB) hogy egységvektorokat kapjunk. Ezt követően a kapott, kölcsönösen merőleges egységvektorokra úgy tekinthetünk, mint az ellipszoid adatra illesztett tengelyeire. A varianciák azon hányada, melyet az egyes sajátvektorok képviselnek kiszámítható úgy, hogy a sajátvektorhoz tartozó sajátértéket elosztjuk az összes sajátérték összegével.
- ▶ Ez az eljárás érzékeny az adatok skálázására, s nem létezik konszenzus arra vonatkozólag, hogy hogyan kell az adatokat skálázni az optimális eredmények eléréséhez.

Principal Component Analysis IV

► A főkomponens-analízis menete:

1. Bevezetjük az adatokat és létrehozuk az adathalmazt. Legyenek x és y .
2. Kivonjuk az átlagokat minden adat dimenzióból, vagyis minden x értékből kivonjuk a hozzá tartozó \bar{X} átlagot, illetve minden y értékből a hozzá tartozó \bar{Y} átlagot.
3. Kiszámoljuk a kovariáns mátrixot a fenti képlet alapján. Ez esetben a kovariáns mátrix 2×2 -es lesz.
4. Kiszámoljuk a kovarianciamátrixhoz tartozó sajátvektorokat és sajátértékeket. A főkomponens-analízis esetében fontos, hogy a sajátvektorok egységvektorok legyenek (hosszuk 1). A sajátvektoroknak egymásra merőlegeseknek kell lenniük.
5. Kiválasztjuk a komponenseket és kialakítjuk a vonás vektort. A sajátvektorokat sajátérték szerint sorrendbe állítjuk, legnagyobbtól a legkisebbig, megkapva így a komponenseket szignifikanciájuk szerint. Ha a sajátértékek kellően kicsit, akkor az adatmennyiség amit elveszítünk ezzel arányos mértékben szintén kicsi lesz. Ezt követően létrehozuk a vonásvektort a megtartott sajátvektorokból.

Principal Component Analysis V

6. Leszármaztatjuk az új adathalmazt. Ez úgy történik, hogy az előző lépésben kapott vonás vektort, ami oszlopvektor, transzponáljuk, vagyis átalakítjuk sorvektorra úgy, hogy a legszignifikánsabb sajátvektor lesz az első érték. Az így kapott vektort megszorozzuk jobbról az eredeti adathalmaz transzponáltjával.
- ▶ Kovariancia: két változó közötti kapcsolatot adja meg.
 - ▶ Kovariancia mátrix: 3D-s vektornál 3×3 -as mátrix.

Vége

Köszönöm a figyelmüket!