
[1, 2, 3, -2, 5]
No of subarrays = n(n+1)/2
BF = O(n^2)
[1, 2, 3, -2, 5]
TC: O(n^2)
AS = O(1)
i: 0 → n-1
sum=0
j: i → n-1
sum = sum+a[j]
maxSum
s=1+2+3+4
ms=1+2+3+4
[1, 2, 3, -2, 5]
s = -10
ms = -10
[-10, 2, 3, -2, 5]
[1, 2, 3, -2, 5]
1 3 6 4 9
overall max
[-10, 2, 3, -2, 5]
[TC: O(n) AS: O(n)]
[-10 2 5 3 8]
maxTillIndex
overall max
[-10, 2, 3, -2, 5]
if mTI < 0:
mTI = arr[i]
else:
mTI += arr[i]
AS = O(1)
mTI = max(arr[i], mTI + arr[i])
(1, 2, 3, 4, 5)
5 x 6 / 2 = 10
(1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5) = 20
(1, 2, -3, -4, 5)
case-1: Non-circular subarray
case-2: Circular subarray
max.
[1, 2, -1, 5, -6, -7, 8]
case-2: [Array Sum - minSubarray Sum]
apply all the elements