



Sede Legale: Via Castiglione, 29
40124 Bologna
C.F. e P.IVA 02406911202
www.ausl.bologna.it

Direttore: Dr. Pio. L.

Equipe Medica: Dr. Pinco D.,
Dr.ssa Palla S., Dr.ssa. Forte S.,
Dr. Grigio A.

LETTERA DI DIMISSIONE

Gentile Collega,
si dimette in data odierna il Sig./Sig.ra **DEDALUS
GIANNI**

Nato/a il **01/01/1957**

Codice Fiscale **DDLGNN57A01A944E**

Data Accettazione

11/03/2023 08:06

Data Dimissione

12/03/2023

Nosologico

02623005498

Provenienza

03-Inviato all'istituto con proposta di un medico

DIAGNOSI

SOSPETTA BPCO

DATI ANAMNESTICI

Paziente affetto da: -broncopneumopatia cronica ostruttiva da anni e sindrome delle apnee notturne in ventilazione non invasiva notturna domiciliare. -cardiopatia ischemica cronica in pregressa ischemia miocardica. -Fibrillazione atriale parossistica recidivante. -pregresso intervento di plastica per rottura di corda LPM. -pregresso del 2015 ictus cerebri. -ipertensione arteriosa.

DECORSO CLINICO

Paziente sottoposto ad bullectomia in data 11/03/2023. Decorso post operatorio regolare. Al momento delle dimissioni, il Paziente ? apiretico, in buone condizioni cliniche generali, l'obiettivit? polmonare ? nei limiti di norma. La ferita chirurgica ? in ordine sotto medicazione, i punti di sutura ancora in sede.

ESAME ECOCARDIOGRAFICO

Segni indiretti di disfunzione diastolica del ventricolo sinistro.

ESAMI EMATOCHIMICI

Vedi referto allegato.

TERAPIA CONSIGLIATA

-BISOPROLOLO ES CARDICOR 2,5 MG UNA C ORE 8. -FUROSEMIDE ES LASIX 25 MG UNA C ALLE ORE 8. -FINASTERIDE 5 MG UNA C ALLE ORE 20. - IDROSSICARBAMIDE ES ONCOCARBIDE 500 MG 2 C ALLE ORE 8 IL VENERDI,SABATO,DOMENICA,3 C ORE 8 IL LUNEDI,MARTWEDI,MERCOLEDI,GIOVEDI. -RAMIPRIL ES TRIATEC 5 MG UNA C ALLE ORE 8. -RIVAROXABAN ES XARELTO 20 MG UNA C ALLE ORE 12. - PREDNISONE 25 MG UNA C ALLE ORE 8 SUBITO DOPO COLAZIONE PER 5 GIORNI,SUCCESSIVAMENTE PROSEGUIRE CON MEZZA C DOPO COLAZIONE PER ALTRI 5 GIORNI,SUCCESSIVAMENTE SOSPENDERE.

In data 11/3 eseguita Tc torace HRCT. Non versamenti pleurici. Linfonodi ilo-mediastinici delle dimensioni massime di 12 x 7 mm circa. Regolare calibro dell'aorta addominale in presenza di placche calcifiche parietali. Sottile falda fluida periaortica alla radice. Non evidenti lesioni focali dei segmenti addominali compresi nello studio. Con algoritmo di ricostruzione per osso non evidenti lesioni evolutive.