

1 Movimiento

2 Movimiento bi y tridimensional

El desplazamiento será un vector con más de una componente distinta de cero:

$$\Delta\vec{r} = (\Delta x)\hat{x} + (\Delta y)\hat{y} + (\Delta z)\hat{z}. \quad (1)$$

Si el movimiento se restringe a un movimiento bidimensional una de las componentes del vector desplazamiento se anula. Por simplicidad, supondremos que $\Delta z = 0$. En esta situación la partícula se mueve a lo largo de una curva en el plano- xy .

Consideraremos que el desplazamiento del objeto en el intervalo Δt es $\Delta\vec{r}$. Si el intervalo de tiempo es finito, entonces es posible definir la **velocidad promedio** del movimiento en el plano- xy como:

$$\langle\vec{v}\rangle := \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\hat{x} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\hat{y} = \bar{v}_x\hat{x} + \bar{v}_y\hat{y}. \quad (2)$$

La magnitud del vector $\Delta\vec{r}$ es siempre la distancia entre los puntos P y Q , independiente de la trayectoria real efectuada por el móvil.

Si consideramos el límite en que el intervalo de tiempo tiende a cero podremos definir la **velocidad instantánea** como:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}\hat{x} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t}\hat{y} = v_x\hat{x} + v_y\hat{y}. \quad (3)$$

De esta forma la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria de la partícula en el plano- xy , en cada punto de la trayectoria.

2.1 Alcance horizontal y altura máxima en el lanzamiento de un proyectil con MUA en eje \hat{y}

En el lanzamiento de un proyectil la aceleración es (aproximadamente) constante e igual a la aceleración de gravedad, \vec{g} , que está dada por:

$$\vec{g} = -g\hat{y}. \quad (4)$$

Con $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$. Por lo tanto, tenemos que

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{g}t^2. \quad (5)$$

En este caso particular las expresiones para las componentes de la velocidad y posición se reducen a:

$$v_x = v_0 \cos \theta, \quad (6)$$

$$v_y = v_0 \sin \theta - gt, \quad (7)$$

$$x = x_0 + (v_0 \cos \theta) t, \quad (8)$$

$$y = y_0 + (v_0 \sin \theta) t - \frac{g}{2} t^2, \quad (9)$$

donde, por simplicidad, hemos supuesto que $t_0 = 0$.

La altura máxima se obtiene cuando la velocidad en el eje \hat{y} se anula, es decir, en el tiempo

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}. \quad (10)$$

Evaluamos la ecuación para y en este tiempo, el resultado es:

$$y = y_0 + \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g}. \quad (11)$$

El alcance, R , es la distancia que recorre la partícula hasta que alcanza el suelo, es decir, $y = 0$, lo que determina una ecuación cuadrática para el tiempo, cuyas soluciones son:

$$t = \frac{1}{g} \left[v_0 \sin \theta \pm \sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta + 2gy_0} \right]. \quad (12)$$

Sólo la solución positiva nos da el alcance máximo. Reemplazando este tiempo en la ecuación para x se obtiene:

$$R = x - x_0 = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{2g} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{2gy_0}{v_0^2 \sin^2 \theta}} \right]. \quad (13)$$