



1. SDSS & WISE-2MASS mélysége

A galaxis és csillag minták megalkotásakor használt feltételeket használtam, hogy biztosan csak galaxisokat vegyünk ki. Ennek az SQL lekérési paramétereit a galaxis-csillag szeparációnál olvashatjuk.



1. ábra. SDSS és a WISEx2MASS katalógusok galaxisai $z < 0.025$




2. ábra. SDSS és a WISEx2MASS katalógusok galaxisai

2. Galaxis-csillag szeparáció

Ákosék cikke szerint amennyiben a 2MASS és WISE katalógusokat párosítjuk, akkor egyszerűen eldönthető, hogy az adott objektum galaxis vagy csillag-e. A $W1-J$ érték ha kisebb, mint -1.7 , akkor galaxis. Eredményként azt kapták, hogy $X\%$ a csillagszennyezés és $X\%$ -a lett a galaxisoknak helyesen klasszifikálva. (Ők mély katalógust akartak, ezért a GAMA égboltfelmérést is összepárosították az előzőekkel és abból határozták meg a távolságot.)

A módszer tesztelése végett szükség volt egy galaxis és egy csillag mintára. Ezek megalkotásában nehézséget okozott, hogy a DR12-es klasszifikációk nem voltak elég pontosak. Ezért a következő megszorításokat tettük:

- $\text{snMedian_r} > 2$
- $\text{psfmagerr_r} \leq 0.2$
- $\text{g.petroRad_z} > 3$ minden hullámhosszon
- not SATURATED
- not NOPROFILE
- not PEAKCENTER



3. ábra. Szapudi István és Kovács Ákos cikkében alkalmazott vágások

- not NOTCHECKED
- BINNED1
- high S/N
- not DEBLEND_NOPEAK


Továbbá azért, hogy a szétválogatás működjön, a következő szigorításokat tettük:

- $\text{ABS}(g.b) > 10$
- $w.w1mag \geq 12$
- $\text{moon_lev1} < 3$ minden hullámhosszra

A csillagokra feltettük, hogy $z < 0.0001$ és spektroszkópiai osztályuk STAR. Galaxisokra pedig. Galaxisokra alkalmaztuk a $s.z < 0.025$ kivágást.

Megnéztem, hogy az így létrehozott mintákban, azok az objektumok, ami galaxisként lettek klasszifikálva, pedig csillag mintában volt, azok tényleg galaxisok és fordítva. Azt találtam, hogy a fenti feltételek mellett a minták helyesek voltak.

Így a -1.7-es vágást alkalmazva a csillagszennyezés 5 % volt a helyesen klasszifikált galaxisok száma pedig 84 %.



4. ábra. Az általunk kapott eredmény a W1-J vágásra

3. Függelék

3.1. Lekérések

3.1.1. Galaxis-csillag szeparáció

Csillagminta lekérése:

```
--SELECT COUNT(*)
SELECT TOP 3000 g.ra, g.dec--, w.j_m_2mass, w.w1mag--, g.r, g.petroRad_u, g.petroRad_v
FROM WISE_xmatch x
  INNER JOIN Star g ON g.objID = x.sdss_objid
  INNER JOIN wise_allsky w ON w.cntr = x.wise_cntr
  INNER JOIN SpecObj s ON s.bestObjID = g.objID
INTO finalstarsall11
WHERE
  ABS(g.b) > 10 AND
  s.z < 0.0001 AND s.snMedian_r > 2
  AND s.class = 'STAR'
AND (flags_r & 0x10000000) != 0 --/ BINNED1
AND (flags_r & 0x40000) = 0 --/ not SATURATED
```

```

    AND (flags_r & 0x80) = 0 --/ not NOPROFILE
    AND (flags_r & 0x20) = 0 --/ not PEAKCENTER
    AND (flags_r & 0x80000) = 0 --/ not NOTCHECKED
    AND ((flags_r & 0x400000000000) = 0 OR psfmagerr_r <= 0.2) --/ high S/N or not DEBL
--    AND g.petroRad_u > 3 AND g.petroRad_z > 3 AND g.petroRad_r > 3 AND g.petroRad_g >
    AND moon_lev1 < 3 AND moon_lev2 < 3 AND moon_lev3 < 3 AND moon_lev4 < 3
    AND w.w1mag >= 12 AND w.j_m_2mass < 9999
ORDER BY g.r DESC

```

Galaxismint:

```

--SELECT COUNT(*)
SELECT TOP 1000 g.ra, g.dec, w.j_m_2mass, w.w1mag--,g.r, g.petroRad_u, g.petroRad_z
FROM WISE_xmatch x
    INNER JOIN Galaxy g ON g.objID = x.sdss_objid
    INNER JOIN wise_allsky w ON w.cntr = x.wise_cntr
    INNER JOIN SpecObj s ON s.bestObjID = g.objID
--WHERE g.ra BETWEEN 327.5 AND 338.5 AND g.dec BETWEEN -1.25 AND 1.25
--    AND
WHERE
    ABS(g.b) > 10 AND
    --    s.z BETWEEN 0.02 AND 0.025
    s.z < 0.025 AND s.snMedian_r > 2
    AND s.class = 'GALAXY'
AND (flags_r & 0x10000000) != 0 --/ BINNED1
AND (flags_r & 0x40000) = 0 --/ not SATURATED
    AND (flags_r & 0x80) = 0 --/ not NOPROFILE
AND (flags_r & 0x20) = 0 --/ not PEAKCENTER
AND (flags_r & 0x80000) = 0 --/ not NOTCHECKED
    AND ((flags_r & 0x400000000000) = 0 OR psfmagerr_r <= 0.2) --/ high S/N or not DEBL
    AND g.petroRad_u > 3 AND g.petroRad_z > 3 AND g.petroRad_r > 3 AND g.petroRad_g > 3
    AND moon_lev1 < 3 AND moon_lev2 < 3 AND moon_lev3 < 3 AND moon_lev4 < 3
    AND w.w1mag >= 12 AND w.j_m_2mass < 9999
ORDER BY g.r DESC

```

3.1.2. SDSS és WISE-2MASS katalógusok mélysége

Az SDSS galaxisok g és r mag-jainak lekérése:

```

SELECT TOP 10000 g.r, g.g
FROM Galaxy g
    INNER JOIN SpecObj s ON s.bestObjID = g.objID
    INTO Wise2MassGalaxiesGandRzless0_025
WHERE
    ABS(g.b) > 10 AND
    s.z < 0.025

```

```

AND
  s.snMedian_r > 2
AND s.class = 'GALAXY'
AND (flags_r & 0x100000000) != 0
AND (flags_r & 0x40000) = 0
  AND (flags_r & 0x80) = 0
AND (flags_r & 0x20) = 0
AND (flags_r & 0x80000) = 0
AND ((flags_r & 0x4000000000000) = 0 OR psfmagerr_r <= 0.2)
AND g.petroRad_u > 3 AND g.petroRad_z > 3 AND g.petroRad_r > 3 AND g.petroRad_g > 3 AND g.petroRad_i > 3
ORDER BY g.r DESC

```

A WISE-2MASS-ben azonosított galaxisok g és r mag-jainak lekérése.

```

SELECT TOP 100000 g.r, g.g
FROM WISE_xmatch x
  INNER JOIN Galaxy g ON g.objID = x.sdss_objid
  INNER JOIN wise_allsky w ON w.cntr = x.wise_cntr
  INNER JOIN SpecObj s ON s.bestObjID = g.objID
  INTO Wand2MassGxGandRmagzless0_025
WHERE
  ABS(g.b) > 10 AND
  s.z < 0.025 AND s.snMedian_r > 2
  AND s.class = 'GALAXY'
  AND (flags_r & 0x100000000) != 0
  AND (flags_r & 0x40000) = 0
    AND (flags_r & 0x80) = 0
  AND (flags_r & 0x20) = 0
  AND (flags_r & 0x80000) = 0
  AND ((flags_r & 0x4000000000000) = 0 OR psfmagerr_r <= 0.2)
  AND g.petroRad_u > 3 AND g.petroRad_z > 3 AND g.petroRad_r > 3 AND g.petroRad_g > 3 AND g.petroRad_i > 3
  AND w.w1mag >= 12 AND w.j_m_2mass < 9999
ORDER BY g.r DESC

```

Távolságvágás nélkül:

Az SDSS galaxisok g és r mag-jainak lekérése.

```

SELECT TOP 1000000 g.r, g.g
FROM Galaxy g
  INNER JOIN SpecObj s ON s.bestObjID = g.objID
  INTO Wise2MassGalaxiesGandR
WHERE
  ABS(g.b) > 10 AND
  s.snMedian_r > 2
  AND s.class = 'GALAXY'
  AND (flags_r & 0x100000000) != 0
  AND (flags_r & 0x40000) = 0
    AND (flags_r & 0x80) = 0

```

```

AND (flags_r & 0x20) = 0
AND (flags_r & 0x80000) = 0
AND ((flags_r & 0x400000000000) = 0 OR psfmagerr_r <= 0.2)
AND g.petroRad_u > 3 AND g.petroRad_z > 3 AND g.petroRad_r > 3 AND g.petroRad_g > 3 AND
ORDER BY g.r DESC

```

A WISE-2MASS-ben azonosított galaxusok g és r mag-jainak lekérése.

```

SELECT TOP 100000 g.r, g.g
FROM WISE_xmatch x
  INNER JOIN Galaxy g ON g.objID = x.sdss_objid
  INNER JOIN wise_allsky w ON w.cntr = x.wise_cntr
  INNER JOIN SpecObj s ON s.bestObjID = g.objID
  INTO Wand2MassGxGandRmag
WHERE
  ABS(g.b) > 10 AND
  s.snMedian_r > 2
  AND s.class = 'GALAXY'
AND (flags_r & 0x100000000) != 0
AND (flags_r & 0x40000) = 0
  AND (flags_r & 0x80) = 0
AND (flags_r & 0x20) = 0
AND (flags_r & 0x80000) = 0
  AND ((flags_r & 0x400000000000) = 0 OR psfmagerr_r <= 0.2)
  AND g.petroRad_u > 3 AND g.petroRad_z > 3 AND g.petroRad_r > 3 AND g.petroRad_g > 3
  AND w.w1mag >= 12 AND w.j_m_2mass < 9999
ORDER BY g.r DESC

```