
Elbow/UCL separation across lead time
0 cells have joint 95% bands excluding zero; color magnitude alone is not evidence of separation.
Appearance alignment — 62 balanced pairs
Calendar alignment — 32 balanced pairs
D = departure; C = combined profile + departure
All validation-retained PLS axes
D1 +0.29 -0.32 +0.16 +0.04 +0.41
D2 +0.20 +0.12 +0.23 +0.04 +0.18
C1 +0.23 -0.12 +0.17 +0.09 +0.32
C2 +0.06 -0.16 +0.01 -0.05 +0.09
C3 +0.05 +0.08 +0.06 +0.04 +0.02
C4 -0.01 +0.13 +0.04 +0.07 -0.02
C5 +0.17 +0.15 +0.17 +0.16 +0.20
−5 −4 −3 −2 −1
Outings before event
+0.32 +0.05 -0.28 +0.11
-0.28 +0.18 +0.05 -0.05
+0.36 +0.21 +0.02 +0.26
+0.12 +0.12 -0.01 +0.09
-0.28 +0.01 +0.01 -0.09
-0.00 +0.12 +0.24 +0.12
-0.02 +0.35 +0.25 +0.23
31–60 15–30 8–14 1–7
Days before event
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
Case − control (training component SD)
Zero-centered scale. Joint uncertainty covers all components × times within each alignment. Broad elbow/UCL proxy.
The two panels use different balanced cohorts; calendar bins do not equal outing positions. Color is not predictive importance.