

Python      R

gg\_hatano

2020-08-24



# Contents

<b>1</b>		<b>5</b>
1.1	.....	5
1.2	.....	5
<b>2</b>		<b>7</b>
2.1	.....	7
2.2	.....	14



# Chapter 1

## 1.1

Python      pandas      R  
    GitHub

## 1.2

R



# Chapter 2

1

## 2.1

### 2.1.1

IPSS

```
library(readr)
library(dplyr)
url = 'http://www.ipss.go.jp/p-toukei/JMD/00/STATS/Births.txt'
dat = read.table(url, skip=2, header = TRUE)
dat %>% head
```

##	Year	Female	Male	Total
## 1	1947	1301806	1376986	2678792
## 2	1948	1303060	1378564	2681624
## 3	1949	1316630	1380008	2696638
## 4	1950	1134396	1203111	2337507
## 5	1951	1043048	1094641	2137689
## 6	1952	977101	1028061	2005162

Female Male

```
library(tidyr)
library(magrittr)
dat %>%
  pivot_longer(cols = c("Male", "Female"), names_to = "Sex", values_to = "Life")
  mutate(Sex = if_else(Sex == "Female", "F", "M")) -> dat
dat
```

```
## # A tibble: 140 x 4
##   Year   Total Sex   Life
##   <int>   <int> <chr>   <int>
## 1  1947 2678792 M     1376986
## 2  1947 2678792 F     1301806
## 3  1948 2681624 M     1378564
## 4  1948 2681624 F     1303060
## 5  1949 2696638 M     1380008
## 6  1949 2696638 F     1316630
## 7  1950 2337507 M     1203111
## 8  1950 2337507 F     1134396
## 9  1951 2137689 M     1094641
## 10 1951 2137689 F     1043048
## # ... with 130 more rows
```

```
dat %<>%
  arrange(Sex, Year)
dat %<>%
  mutate(ratio = Life / sum(Life)) %>%
  mutate(cum_sum = cumsum(ratio))

dat %>% head
```

```
## # A tibble: 6 x 6
##   Year   Total Sex   Life   ratio cum_sum
##   <int>   <int> <chr>   <int>   <dbl>   <dbl>
## 1  1947 2678792 F     1301806 0.0121   0.0121
## 2  1948 2681624 F     1303060 0.0122   0.0243
## 3  1949 2696638 F     1316630 0.0123   0.0366
## 4  1950 2337507 F     1134396 0.0106   0.0472
## 5  1951 2137689 F     1043048 0.00973  0.0569
## 6  1952 2005162 F     977101  0.00912  0.0660
```



```

dat %>%
  select(-Total) %>%
  write.csv("./data/ipss_birth.csv", row.names=FALSE, quote = FALSE)

```

(y :0-1) ( , )

```

library(ggplot2)
dat = read_csv("./data/ipss_birth.csv")

```

```


## Parsed with column specification:
## cols(
##   Year = col_double(),
##   Sex = col_character(),
##   Life = col_double(),
##   ratio = col_double(),
##   cum_sum = col_double()
## )

```

```

dat %>%
  mutate(x_axis = paste(Year, Sex, sep="")) %>%
  mutate(row_num = 1:nrow(.)) %>%
  ggplot() +
  geom_line(aes(x = row_num, y = cum_sum), stat = "identity") +
  annotate("segment", x=1, xend=90, y=0.7, yend=0.7, colour="blue",
    size=1, arrow=arrow()) +
  annotate("segment", x=92, xend=92, y=0.65, yend=0.0, colour="blue",
    size=1, arrow=arrow()) +
  annotate("text", x=20, y=0.75, parse=TRUE, label="'Random Number 0.7'") +
  annotate("text", x=120, y=0.2, parse=TRUE, label="'Rownum: 95 -> 1969-Female'") +
  ggtitle("Cumulative ratio of Population Birth")

```



### 2.1.2

```
url_death_rate = "http://www.ipss.go.jp/p-toukei/JMD/00/STATS/Mx_1x1.txt"
dat = read.table(url_death_rate, skip=2, header = TRUE)
dat %>% str
```

```
## 'data.frame': 7770 obs. of 5 variables:
## $ Year : int 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 ...
## $ Age : chr "0" "1" "2" "3" ...
## $ Female: chr "0.087401" "0.033723" "0.016994" "0.011412" ...
## $ Male : chr "0.099181" "0.034697" "0.016804" "0.011461" ...
## $ Total : chr "0.093432" "0.034220" "0.016897" "0.011437" ...
```

```
Year X 1 ( )
2016
```

```
dat %<>%
  filter(Year == 2016) %>%
  select(-Year) %>%
  select(-Total)
```

Age char

```
dat$Age %>% table
```

```
## .
##    0    1   10  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109   11  110+   12
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
##   13   14   15   16   17   18   19    2   20   21   22   23   24   25   26   27
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
##   28   29    3   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39    4   40   41
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
##   42   43   44   45   46   47   48   49    5   50   51   52   53   54   55   56
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
##   57   58   59    6   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69    7   70
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
##   71   72   73   74   75   76   77   78   79    8   80   81   82   83   84   85
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
##   86   87   88   89    9   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
```

110+            111

```
dat %<>%
  mutate(Age = if_else(Age == "110+", "111", Age)) %>%
  mutate(Age = as.integer(Age))
```

```
dat %<>%
  mutate(Anb = Age) %>%
  select(-Age)
```

```
dat %>% head
```

```
##      Female      Male  Anb
## 1 0.002028 0.001995    0
## 2 0.000313 0.000340    1
## 3 0.000174 0.000178    2
## 4 0.000098 0.000133    3
## 5 0.000087 0.000095    4
## 6 0.000084 0.000101    5
```

Anb Alb            Anb    Alb

$x$    Anb    $q_x$     Alb     $\frac{q_x + q_{x+1}}{2}$

```

dat %<>%
  mutate(Female = as.numeric(Female)) %>%
  mutate(Male = as.numeric(Male)) %>%
  mutate(lead_Female = lead(Female)) %>%
  mutate(lead_Male = lead(Male)) %>%
  mutate(F = (Female + lead_Female)/2) %>%
  mutate(M = (Male + lead_Male)/2) %>%
  mutate(Alb = Anb) %>%
  select(Alb,F,M)

dat %>% head

```

```

##   Alb      F      M
## 1  0 0.0011705 0.0011675
## 2  1 0.0002435 0.0002590
## 3  2 0.0001360 0.0001555
## 4  3 0.0000925 0.0001140
## 5  4 0.0000855 0.0000980
## 6  5 0.0000815 0.0001060

```


1

```

dat %>%
  pivot_longer(cols=c("F","M"), names_to = "Sex", values_to = "Mortality") %>%
  ggplot(aes(x = Alb, y = Mortality, group = Sex, color = Sex)) +
  geom_line() +
  geom_hline(yintercept = 1.0, linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = 10, y = 1.05, label = 'Mortality: 1.0') +
  ggtitle("Mortality")

```

```
## Warning: Removed 2 row(s) containing missing values (geom_path).
```



$$y = 1 - (1 - x)^{12} \quad x = 1 - (1 - y)^{0.08...}$$

```
dat %<>%
  filter(Alb < 100)

dat %<>%
  mutate(F = 1 - (1-F)**(1/12)) %>%
  mutate(M = 1 - (1-M)**(1/12))

dat %>% write.csv("./data/ipss_mortality.csv", quote=F, row.names = F)
dat %>% head
```

```
##   Alb          F          M
## 1    0 9.759403e-05 9.734377e-05
## 2    1 2.029393e-05 2.158590e-05
## 3    2 1.133404e-05 1.295926e-05
## 4    3 7.708660e-06 9.500496e-06
## 5    4 7.125279e-06 8.167034e-06
## 6    5 6.791920e-06 8.833763e-06
```

**2.1.3**

•  
•  
•

**2.1.4**

... - -

**2.2****2.2.1****2.2.2****2.2.3**