

## **Generalised Anxiety Disorder Scale (GADS-7)**

# مقياس اضطرابات القلق

(Originates from Spitzer et al, 2006) ترجمة وتقنين عيادة الغصن الأخضر للتقييم والعلاج النفسي ببريطانيا

www.gbclinic.com

مقياس اضطرابات القلق يستخدم لفحص اضطرابات وأعراض القلق ، وهو مكون من 7 عبارات ، ولكل عبارة أربع اختيارات كما هو موضح أدناه وهي كما يلي:

في الأسبوعين الماضيين ، ما مقدار تعرضك للأعراض و المشاكل التالية:

### تتوزع درجات المقياس كالتالي:

- Not at all لا يوجد ال
- Several days (% 50 من 50 أقل من 20 أيام عديدة (أقل من 50 أيام عديدة (أيام عديدة (
- (2) = أكثر من نصف الأيام (أعلى من 50 %) More than half the days
  - Nearly every day (%100 تحدث بنسبة على يوم (تحدث بنسبة على يوم (تحدث بنسبة العدد)

#### في الأسبوعين الماضيين ، ما مقدار تعرضك للأعراض و المشاكل التالية:

الخيارات				العبارة	الرقم	
3	2	1	0	أشعر بالتوتر والعصبية وأنني على حافة الهاوية ؟	1	
3	2	1	0	أنا غير قادر على منع أو التحكم في قلقي وتوتري ؟	2	
3	2	1	0	قلقي كبير جدا بخصوص أشياء مختلفة ؟	3	
3	2	1	0	لدي صعوبة في الاسترخاء والشعور بالراحة؟		
3	2	1	0	أشعر بعدم الراحة و تواجهني صعوبات في الجلوس بدون حركة ؟		
3	2	1	0	من السهل أن أتوتر وأتضايق وأغضب بسرعة ؟		
3	2	1	0	أنا أشعر بالخوف من شيء سيء ممكن أن يحدث ؟	7	
	مجموع درجات الحالة : ( 21 /					

#### Evaluation: التقييم

الدرجة من 15 - 21	الدرجة من 10 - 14	الدرجة من 5 ـ 9	الدرجة من 0 -4
Severe anxiety	Moderate anxiety	Mild anxiety	Normal
قلق شدید	قلق متوسط	قلق خفيف	عادي

#### Notes:

Scores of 5, 10, and 15 are taken as the cut-off points for mild, moderate and severe anxiety, respectively. When used as a screening tool, further evaluation is recommended when the score is 10 or greater.

Using the threshold score of 10, the GAD-7 has a sensitivity of 89% and a specificity of 82% for GAD. It is moderately good at screening three other common anxiety disorders - panic disorder (sensitivity 74%, specificity 81%), social anxiety disorder (sensitivity 72%, specificity 80%) and post-traumatic stress disorder (sensitivity 66%, specificity 81%).