

Chương 3: Không gian vector (tiếp)

1. Cơ sở và số chiều của KGV

a, Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính(ĐLTT và PTTT)

- Hệ $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ĐLTT nếu $\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \theta \Leftrightarrow \lambda_i = 0, \forall i = \overline{1, n}$
- Hệ $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ PTTT nếu $\exists \lambda_i, i = \overline{1, n}$ không đồng thời bằng 0 mà $\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \theta$

Chú ý:

- +, Hệ PTTT $\Leftrightarrow \exists 1$ vector là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại.
- +, Hệ quả: Hệ chứa vector θ luôn PTTT.

b, Cơ sở, số chiều của KGV

- Hệ sinh: hệ $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ gọi là hệ sinh của KGV V nếu $\forall v \in V$, v đều là tổ hợp tuyến tính của các vector trong hệ.
- Cơ sở: KGV V trên trường K , hệ vector B được gọi là cơ sở của V nếu B là hệ sinh và B ĐLTT.
- Nếu KGV V có cơ sở B gồm n vector thì số chiều của V bằng n . Kí hiệu $\dim V = n$ (Nếu $V = \{\theta\}$ thì $\dim V = 0$)

Chú ý:

$B = \{(1, 0, \dots, 0); (0, 1, \dots, 0); \dots; (0, 0, \dots, 1)\}$ (n vector) là hệ cơ sở chính tắc của R^n

Định lý: V là KGV n chiều, khi đó:

- +, Hệ $n+1$ vector bất kì đều PTTT.
- +, Hệ n vector ĐLTT bất kì đều lập thành cơ sở của V .
- +, Hệ n vector bất kì là hệ sinh đều lập thành cơ sở của V .

2. Tọa độ của 1 vector đối với 1 cơ sở

Không gian vector n chiều có cơ sở $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$

Khi đó $\forall v \in V$ có biểu diễn duy nhất $v = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

Khi đó $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ là tọa độ của vector v đối với cơ sở B ,

kí hiệu $[v]_B = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

Ma trận tọa độ của hệ vector S theo cơ sở B :

- $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
- $A = [S]_B = ([v_1]_B, [v_2]_B, \dots, [v_n]_B)$ là m trận tọa độ cột của hệ vector S đối với cơ sở B.
- A^T là ma trận tọa độ hàng của hệ S đối với B.

3. Công thức đổi cơ sở

KGVT V có 2 cơ sở $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, $B' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$. Khi đó $P = [B']_B$ là ma trận tọa độ cột của B' đối với B cũng gọi là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B' .

Định lý: P khả nghịch và P^{-1} là ma trận chuyển cơ sở từ B' sang B. Với $v \in V$:

$$\begin{aligned} + [v]_B &= P \cdot [v]_{B'} \\ + [v]_{B'} &= P^{-1} \cdot [v]_B \end{aligned}$$

4. Hạng của hệ vector

- Là số vector của một bộ phận độc lập tuyến tính tối đa là tập con của hệ B. Kí hiệu $\text{rank} B, r(B)$.
- **Định lý:** KGVT v có cơ sở $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, hệ vector S có ma trận P là ma trận tọa độ đối với cơ sở B. Khi đó $r(B) = r(P)$.

Chú ý: Để tìm hạng của P ta chỉ thực hiện biến đổi sơ cấp trên hàng để đưa về ma trận bậc thang.

Hệ quả: Hệ vector S gồm n vector có ma trận tọa độ hàng đối với B là p. Khi đó n vector của S độc lập tuyến tính $\Leftrightarrow r(S) = n \Leftrightarrow r(P) = n \Leftrightarrow \det P \neq 0$.

* Một số ví dụ

1, xét xem hệ vector sau là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính:

a, $A = \{(1; 0; 1), (1; -1; 2), (-2; 3; 5)\}$

b, $B = \{(2; 4; -1)\}$

Giải

a, ta có, $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ là ma trận tọa độ hàng của hệ A đối với cơ sở chính tắc của R^3 . Mà $\det P = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -10 \neq 0$ nên hệ A là độc lập tuyến tính.

b, ta có $P = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ là ma trận tọa độ hàng của hệ B đối với cơ sở chính tắc của R^3 .

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow r(P) = 2 \Rightarrow \text{hệ B là độc lập tuyến tính.}$$

2, Cho hệ vector $B = \{(1; 1; 1), (1; 1; 2), (1; 2; 3)\}$

a, Chứng minh B là cơ sở của R^3 .

b, Tìm tọa độ của $D = (6; 9; 14)$ đối với cơ B.

Giải

a, Xét $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ là ma trận tọa độ hàng của B đối với cơ sở chính tắc của

$$R^3. \text{ Mà } \det P = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \text{ nên hệ B độc lập tuyến tính.}$$

Hệ B gồm 3 vector nên là cơ sở của R^3 .

$$\text{b, } - C_1 \quad v_1 = x_1(1; 1; 1) + x_2(1; 1; 2) + x_3(1; 2; 3) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14 \end{cases} \Leftrightarrow (x_1, x_2, x_3) = (1; 2; 3)$$

- C_2 Gọi E là cơ sở chính tắc của R^3

$$[v]_B = S^{-1}[v]_E, \text{ trong đó } S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ là ma trận chuyển cơ sở từ E sang}$$

$$B \Rightarrow [v]_B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$