

# Appunti di Probabilità e Statisticas

Giacomo Zanatta

February 21, 2018

## Indice

<b>1</b>	<b>Probabilità elementare</b>	<b>2</b>
1.1	Contare le probabilità . . . . .	2
1.2	Disposizioni . . . . .	2
1.3	Permutazioni . . . . .	3
1.4	Combinazioni . . . . .	3
1.5	Fenomeni aleatori . . . . .	4
1.5.1	Spazio campionario, risultati, eventi . . . . .	4
1.5.2	Operazioni logiche sugli eventi . . . . .	5
1.6	Definizione di Probabilità . . . . .	5
1.6.1	Proprietà della probabilità . . . . .	6
1.6.2	Spazi campionari finiti . . . . .	6
1.6.3	Eventi elementari equiprobabili . . . . .	6
1.7	Popolazioni e sottopopolazioni . . . . .	7
<b>2</b>	<b>Probabilità condizionata e composta</b>	<b>8</b>
2.1	Probabilità condizionata . . . . .	8
2.2	Probabilità composta . . . . .	8
2.3	Eventi indipendenti . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Legge della probabilità totale</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>La formula di Bayes</b>	<b>9</b>

# 1 Probabilità elementare

## 1.1 Contare le probabilità

Se abbiamo un esperimento con  $n_1$  possibili scelte, e per ogni scelta dell'esperimento 1 ci sono  $n_2$  possibili scelte, allora in totale ci saranno  $n_1 * n_2$  possibili scelte.

In generale, se abbiamo  $i$  esperimenti, ciascuno con  $n_i$  possibili scelte, allora esistono in totale

$$\prod_{i=1}^n m_i \quad (1)$$

possibili scelte.

*Esempio: una commissione parlamentare deve essere composta da un membro del partito A, che conta 10 rappresentanti, da un membro del partito B, che conta 15 rappresentanti, e da un membro del partito C, che conta 2 rappresentanti. In totale quindi ci sono  $10 * 15 * 2 = 300$  possibili commissioni parlamentari.*

## 1.2 Disposizioni

Una disposizione di  $r$  elementi di un insieme composta da  $n$  elementi è una scelta ordinata di  $r$  elementi tra quegli  $n$ .

Possiamo distinguere le disposizioni in:

1. Disposizioni con ripetizione: in questo caso, ogni elemento può essere scelto più di una volta.

Le disposizioni con ripetizione di  $n$  elementi presi  $r$  alla volta sono

$$\prod_{i=1}^n n = n^r. \quad (2)$$

2. Disposizioni semplici (senza ripetizione): le disposizioni semplici di  $n$  elementi presi  $r$  alla volta sono

$$n * (n - 1) * \dots * (n - r + 1) = \frac{n!}{(n - r)!} \quad (3)$$

*ESEMPI:*

1. Quante parole di 2 lettere possiamo comporre con le lettere I, L, A ? Siamo nel caso delle disposizioni con ripetizione, perchè una lettera può essere ripetuta. Quindi, in totale, abbiamo  $3^2 = 9$  possibili parole: II, IL, IA, LI, LL, LA, AI, AL, AA.

Se invece le parole devono avere tutte lettere diverse, siamo nel caso delle disposizioni semplici, quindi avremo  $3 * 2 = 6$  possibili parole: IL, IA, LI, LA, AI, AL.

2. *Un bit può assumere i valori 0 o 1. Un byte è una sequenza di 8 bit. Quanti byte ci sono?  $2^8$  possibili byte, in quanto in questo caso dobbiamo usare le disposizioni con ripetizione.*

Le disposizioni vengono normalmente usate quando bisogna effettuare un campionamento casuale da un'urna (ossia estrazione di palle da un'urna).

Se un'urna contiene  $n$  palle distinguibili e dobbiamo estrarre  $r$  palle con reintroduzione, le estrazioni possibili sono  $n^r$  (disposizioni con ripetizione).

Se invece le palle vengono estratte senza reintroduzione, allora le estrazioni possibili sono  $n * (n - 1) * \dots * (n - r + 1)$  (disposizioni semplici).

### 1.3 Permutazioni

Una permutazione è una disposizione semplice di  $n$  elementi presi  $n$  alla volta, e sono

$$n * (n - 1) * \dots * 2 * 1 = n! \quad (4)$$

Le permutazioni vengono usate ad esempio per trovare il numero di anagrammi di una parola. Se abbiamo  $m$  elementi che si ripetono, rispettivamente,  $k_1, k_2, \dots, k_m$  volte (ad esempio, se dobbiamo trovare gli anagrammi della parola CASA, abbiamo l'elemento A ripetuto 2 volte) allora è necessario usare la formula

$$\frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_n!} \quad (5)$$

*ESEMPI:*

1. *Trovare il numero di anagrammi della parola CIAO: la parola in questione è composta da 4 lettere, e gli anagrammi possibili saranno  $4! = 4*3*2*1 = 24$*
2. *Trovare il numero di anagrammi della parola GATTO: notare che, sebbene questa parola ha lo stesso numero di lettere della parola precedente, ha la lettera T ripetuta 2 volte. Quindi i possibili anagrammi non saranno 24, ma  $\frac{4!}{2} = 12$*

### 1.4 Combinazioni

Un sottoinsieme di numerosità  $r$  scelto da un insieme con  $n$  elementi si chiama combinazione di  $n$  elementi presi  $r$  alla volta. Il numero di combinazioni di  $n$  elementi presi  $r$  alla volta (con  $r \leq n$ ) è

$$\frac{n(n - 1)\dots(n - r + 1)}{r!} = \binom{n}{r} \quad (6)$$

Le combinazioni vengono utilizzate quando non è importante l'ordine (un insieme infatti non è ordinato).

### Coefficiente binomiale

$\binom{n}{r}$  si chiama coefficiente binomiale, e si calcola mediante la formula

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (7)$$

La formula scritta precedentemente è riferita alle combinazioni semplici (senza ripetizione).

Se vogliamo contare il numero di sottoinsiemi tenendo conto anche di elementi ripetuti (quindi nel caso in cui ogni sottoinsieme, composto da  $r$  elementi, può contenere  $r$  volte lo stesso elemento), usiamo la formula

$$\binom{n+r-1}{r} = \frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!} \quad (8)$$

In questo caso,  $r$  può essere anche maggiore di  $n$ .

## 1.5 Fenomeni aleatori

Il calcolo delle probabilità è la logica dell'incerto.

La probabilità viene usata per ragionare sui possibili risultati di un fenomeno aleatorio.

Di un fenomeno aleatorio non si può prevedere con certezza l'esito. Alcuni esempi di fenomeni aleatori sono:

1. Lancio di un dado
2. Lancio di una moneta 4 volte
3. L'estrazione di una mano di poker.

### 1.5.1 Spazio campionario, risultati, eventi

1. Lo spazio campionario ( $\Omega$ ) è un insieme che rappresenta i possibili risultati di un fenomeno aleatorio.
2. Un evento è un sottoinsieme dello spazio campionario  $A \subset \Omega$ .
3. I risultati  $\omega$  sono detti eventi elementari.
4.  $\Omega$  è chiamato evento certo, in quanto si verifica sicuramente.

Ad esempio, per il lancio di un dado, lo spazio campionario  $\Omega$  è dato dall'insieme di tutti i possibili risultati, ossia  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , mentre un possibile evento può essere  $A = \{5, 6\}$  (evento risultato superiore a 4), oppure  $B = \{2, 4, 6\}$  (evento risultato pari).

### 1.5.2 Operazioni logiche sugli eventi

#### Negazione (Complemento)

Il complementare di un evento  $A$ ,  $\bar{A}$ , è l'evento che è vero quando  $A$  è falso ed è falso quando  $A$  è vero. L'evento impossibile è la negazione dell'evento certo:  $\bar{\Omega} = \emptyset$

#### Intersezione

L'intersezione di due eventi  $A$  e  $B$ ,  $A \cap B$ , è l'evento che è vero quando sia  $A$  che  $B$  sono veri.

#### Unione

L'unione di  $A$  e  $B$ ,  $A \cup B$ , è l'evento che è vero quando  $A$  oppure  $B$  (oppure entrambi) sono veri.

#### Inclusione

L'evento  $A$  è incluso nell'evento  $B$  se  $A$  è un sottoinsieme di  $B$ ,  $A \subset B$ . In questo caso se  $A$  si verifica vuol dire che si è verificato anche  $B$ .

#### Incompatibilità

Due eventi  $A$  e  $B$  si dicono incompatibili se  $A \cap B = \emptyset$ , ossia se non è possibile che entrambi siano veri.

#### Partizione

Una partizione dello spazio campionario è una famiglia di eventi tale che ogni coppia di insiemi della famiglia ha intersezione vuota e l'unione di tutti i componenti della famiglia è lo spazio campionario  $\Omega$ .

## 1.6 Definizione di Probabilità

La probabilità una funzione degli eventi di uno spazio campionario, a valori in  $R^+$ , definita dai seguenti assiomi:

1.  $0 \leq P(A) \leq 1$
2.  $P(\Omega) = 1$
3. Se  $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$  (sequenza di eventi incompatibili), allora

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \quad (9)$$

La probabilità di un evento  $A$ , definita come  $P(A)$ , è un numero tra 0 e 1 che indica il grado di fiducia del ricercatore nell'avverarsi dell'evento  $A$ . Se  $P(A) = 1$ , allora l'evento si è avverato. Più  $P(A)$  si avvicina ad 1, più ci aspettiamo che l'evento  $A$  si avveri.

### 1.6.1 Proprietà della probabilità

#### Complementare

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) \quad (10)$$

#### Evento impossibile

$$P(\emptyset) = P(\overline{\Omega}) = 1 - P(\Omega) = 0 \quad (11)$$

#### Unione

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (12)$$

#### Partizione

se  $C_1, C_2, \dots$  sono partizioni, allora

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i\right) = P(\Omega) = 1 \quad (13)$$

### 1.6.2 Spazi campionari finiti

Se lo spazio campionario è un insieme finito ( $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ ), allora una assegnazione di probabilità è data da  $n$  valori  $p_1, \dots, p_n$  tali che:

1.  $p_i \in [0, 1] \forall i = 1, \dots, n$
2.  $\bigcup_{i=1}^n p_i = 1$
3.  $p_i = P(\{\omega_i\}) \forall i = 1, \dots, n$

### 1.6.3 Eventi elementari equiprobabili

Se tutti gli eventi elementari hanno la stessa probabilità, allora

$$p_i = P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}, \forall i = 1, \dots, n \quad (14)$$

Quindi, per ogni evento  $A$  (che ricordiamo è un'unione di eventi complementari,  $A = \{\omega_{i1}, \dots, \omega_{ir}\}$ )

$$P(A) = \frac{r}{n} = \frac{\#A}{\#\Omega} \quad (15)$$

ossia il numero di casi favorevoli fratto il numero di casi possibili.

## 1.7 Popolazioni e sottopopolazioni

Consideriamo ora una popolazione con  $N$  elementi suddivisi, a seconda che possiedono o meno una certa caratteristica, in due sottopopolazioni rispettivamente di  $K$  e  $N-K$  elementi. La probabilità che su  $n$  elementi estratti casualmente esattamente  $k$  hanno la caratteristica è:

1. Con reinserimento:

$$P(A_k) = \binom{n}{k} \left(\frac{K}{N}\right)^k \left(\frac{N-K}{N}\right)^{n-k} \quad (16)$$

2. Senza reinserimento ( $n < N$ ):

$$P(A_k) = \frac{\binom{n}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}} \quad (17)$$

## 2 Probabilità condizionata e composta

### 2.1 Probabilità condizionata

La probabilità condizionata dell'evento  $A$  dato l'evento  $B$  è

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0 \quad (18)$$

La probabilità condizionata rappresenta la probabilità che si verifichi  $A$ , sapendo che  $B$  è si è verificato.

Il campo delle possibilità quindi si restringe ad un sottoinsieme di  $\Omega$  (l'insieme  $B \subset \Omega$ )

### 2.2 Probabilità composta

Per ottenere la probabilità di un'intersezione è possibile usare la probabilità condizionata:

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) \quad (19)$$

Questa formula viene chiamata formula delle probabilità composte e si può generalizzare a qualsiasi numero di eventi  $A_1, \dots, A_n$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \dots P(A_3|A_1 \cap A_2)P(A_1) \quad (20)$$

### 2.3 Eventi indipendenti

Se

$$P(A|B) = P(A) \quad (21)$$

allora gli eventi  $A$  e  $B$  sono indipendenti. Si ha quindi:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad (22)$$

Più in generale: gli eventi  $A_1, \dots, A_n$  si dicono indipendenti se, comunque si prendono  $k > 1$  di essi, si ha:

$$P(A_{i1} \cap A_{i2} \cap \dots \cap A_{ik}) = P(A_{i1})P(A_{ik}) \quad (23)$$

Notare che eventi indipendenti ed eventi disgiunti non è la stessa cosa!



### 3 Legge della probabilità totale

Se  $C_1, C_2, \dots$  sono una partizione dell'evento certo, la probabilità di un qualsiasi evento  $A$  può essere scritta come (legge della probabilità totale):

$$P(A) = \sum_i P(A \cap C_i) = \sum_i P(C_i)P(A|C_i) \quad (24)$$

### 4 La formula di Bayes

Sia data la partizione  $C_1, C_2, \dots$  e tutti i suoi elementi abbiamo probabilità positiva. Sia  $A$  un ulteriore evento, anch'esso con probabilità positiva. Allora

$$P(C_m|A) = \frac{P(C_m \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A|C_m)P(C_m)}{\sum_i P(A|C_i)P(C_i)} \quad (25)$$

Il teorema di Bayes permette di aggiornare l'assegnazione di probabilità data a priori di certi eventi  $C_m$ , quando l'evento  $A$  si è verificato.

Il risultato sono le nuove probabilità  $P(C_m|A)$ , dette a posteriori.