
Main-selected macro contexts (exploratory raw p<0.20 in CN-AD and CN-MCI)
marginal intervals, not post-selection corrected
RAW157 D023@KD3
RAW157 A002@KD3
RAW157 A003@KD3
RAW157 D023@KD2
RAW157 D036@KD3
RAW157 D023@READING
RAW157 A003@KD2
RAW157 A046@READING
RAW157 D029@KD3
RAW157 A027@KD3
RAW157 A021@KD2
RAW157 A021@KD3
RAW157 D030@KD3
RAW157 D023@KD1
RAW157 A003@KD1
RAW157 D040@KD2
RAW157 A002@KD2
RAW157 D031@KD2
RAW157 A046@KD3
RAW157 A046@KD2
RAW157 A023@KD3
RAW157 A030@KD1
RAW157 D034@READING
RAW157 A030@READING
RAW157 A035@READING
RAW157 A023@READING
RAW157 D025@KD1
RAW157 A023@KD2
RAW157 D029@KD1
RAW157 A046@KD1
RAW157 A029@KD1
RAW157 A028@READING
RAW157 D031@KD3
RAW157 D022@KD3
RAW157 A027@READING
RAW157 A021@KD1
RAW157 D038@KD3
RAW157 D039@READING
RAW157 D026@KD1
RAW157 A035@KD2
ROI64_T1235 D007@KD1
ROI64_T1235 D010@KD3
ROI64_T1235 D007@KD2
ROI64_T1235 D011@KD1
ROI64_T1235 D009@KD3
ROI64_T1235 D012@KD2
ROI64_T1235 D013@KD1
CN vs AD
CN vs MCI
MCI vs AD
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
Cliff's delta (positive = second-named group higher), 95% participant-bootstrap interval