

Prüfungsfragen Fachapothekerprüfung Offizinpharmazie

Datum: 24.04.2021

Total: 97 Fragen, ca. 70 A-Fragen, ca. 27 Kprim-Fragen

Zeit: 08:30 – 12:00 Uhr

Umfang: Lernziele der Rolle 1

A-Fragen (hatte unterschiedlich viele Antwortmöglichkeiten, zwischen 3 bis 5)

1. Ein Kunde fährt mit dem Fahrrad zur Apotheke. Er kommt 1x wöchentlich vorbei zur Blutdruckkontrolle. Er betritt keuchend und ausser Atem die Apotheke. Wie lange muss gewartet werden, bis der Blutdruck gemessen werden kann?
 - Überhaupt nicht
 - 2min
 - 5min
 - 30min
2. Sie stellen in der Apotheke jeweils Nifedipin Crème als Formula magistralis her. Was muss bei der Herstellung dieses Präparats besonders beachtet werden?
 - Im Dunkeln arbeiten, da Wirkstoff lichtempfindlich
 - ...
 - ...
 - ...
3. Ein Kunde kommt in die Apotheke mit diversen Insektenstichen auf Hand und Arm. Die Stiche erscheinen rot-blau, sind aber kalt. Kunde möchte gerne etwas aus der Alternativmedizin. Was kommt aufgrund der Symptome am ehesten in Frage?
 - Apis
 - Ledum
 - ...
 - ...
4. Ein Kunde löst ein Rezept ein für Clarithromycin. Er nimmt aufgrund erhöhter Cholesterinwerte zudem Atorvastatin. Was machen Sie?
 - Antibiotikum abgeben, mit dem Hinweis, sich bei Muskelschmerzen beim Arzt zu melden
 - Tel. an Arzt und Wechsel auf Ciprofloxacin vorschlagen
 - Kunde anweisen, Atorvastatin während der Behandlung mit Clarithromycin nicht zu nehmen
 - Tel. an Arzt und Wechsel auf anderes Statin (Simva, Rosuva?) vorschlagen
 - ...
5. Frau kommt in die Apotheke, ihr Kind hat sich im Supermarkt das Spülmittel aus dem Einkaufswagen geschnappt und daraus getrunken. Was tun Sie?
 - Mutter beruhigen und nach Hause schicken
 - Aktivkohle geben, um die Toxine zu binden
 - Simeticon geben, um der Schaumbildung vorzubeugen
 - ...

6. 56 jährige Kundin löst folgendes Rezept ein:
Prolia 60mg/ml alle 6 Monate s.c.
...
... (noch 2 weitere Medikamente)
Was vermissen Sie auf dem Rezept?
 - Letrozol
 - Calcium und Vitamin D
 - Vitamin B12
 - ...
 - ...
7. Was zählt in der Schweiz gemäss aktuellem Impfplan nicht zu den Basisimpfungen für Kinder?
 - Varizella-Zoster-Virus
 - Hepatitis B
 - Pneumokokken
 - Meningokokken
 - Haemophilus influenzae Typ B
8. 65 jährige Kundin hat Impfausweis verloren, MMR Impfstatus unbekannt. Was ist zu tun?
 - Nachholimpfung aufgrund ihres Alters nicht empfohlen
 - Braucht 1 Nachholimpfung
 - Braucht 2 Nachholimpfungen im Abstand von 1 Monat
 - Serologie machen und dann entscheiden
9. 28 jähriger Mann hat bei der Rekrutierung vor 10 Jahren 1 Impfdosis FSME erhalten. Er möchte so schnell wie möglich geschützt sein, da er in ein Risikogebiet umzieht. Sie haben den Impfstoff in der Apotheke vorrätig. Nebst der Impfdosis heute, in welchem Abstand kann die nächste Impfung frühestmöglich stattfinden?
 - 14 Tage
 - 1 Monat
 - 5 Monate
 - 10 Jahre
10. Kundin hat den Nuvaring, letzte Nacht hatte sie Geschlechtsverkehr, wobei der Ring versehentlich ausgestossen wurde. Sie hat es erst heute Morgen bemerkt, den Ring aber dann sofort wieder eingesetzt. Was stimmt?
 - Der Ring kann ohne Beeinträchtigung der Wirkung während max. 12 Stunden entfernt werden
 - Der Ring darf während der gesamten Zyklusdauer von 21 Tagen nie entfernt werden
 - Der Ring darf während max. 3 Stunden entfernt werden, die empfängnisverhütende Wirkung kann beeinträchtigt sein, Kundin Pille danach empfehlen
 - ...
11. 8 jähriges Kind, Mutter bringt ein Rezept für eine Herstellung. Das Kind hat schwere atopische Dermatitis auf den Augenlidern, die bisherige Kortisonsalbe hat zu wenig genützt.
Elidel cr. 60g nach Anweisung des Arztes
 - Ist ok, wird so gemacht
 - Umstellen nach Rücksprache mit dem Arzt auf anderes Mittel, da Anwendung um Auge heikel

- Ausführung verweigern
 - Herstellung machen, da Arzt sich der off-label Anwendung bewusst ist (8 jähriges Kind)
 - ...
12. Eine 67 jährige Kundin klagt über Husten und war vor ca. 2 Wochen beim Arzt, welcher ihr Acetylcystein gegeben hat. Die Symptome sind jedoch nicht besser geworden, gestern wurde in der Apotheke der CRP-Wert gemessen, welcher bei 97mg/l lag. Heute ist der CRP-Wert 126mg/l. Was machen Sie?
- Kundin für morgen nochmals eine CRP-Messung anbieten
 - Auf Notfall schicken
 - ...
 - ...
13. 34 jähriger Kunde möchte einen HIV-Test kaufen. Sie erfahren, dass er vor 14h ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer männlichen Gelegenheitsbekanntschaft hatte. Was machen Sie?
- HIV Test zeigt jetzt noch nicht an, er soll in 3 Monaten einen Test machen
 - Der HIV Test zeigt bereits jetzt verlässlich an, HIV Test verkaufen und zu Hause machen lassen
 - Dem Kunden keinen Test verkaufen, da dieser jetzt noch nicht anzeigen würde und zur Beratung an eine Teststelle (es stand wirklich Teststelle) weiterleiten
 - ...
14. Kunde kommt mit einem neuen Rezept:
 Clarithromycin 500mg 1-0-1
 Amoxicillin 1000mg 1-0-1
 Pantoprazol 40mg 1-0-1
 An einer Infektion mit welchem Krankheitserreger leidet der Kunde vermutlich?
- H. pylori
 - C. difficile
 - ...
 - ...
15. Kundin kommt mit einem Rezept (Stärke und Dosierung waren angegeben):
 Flagyl, inkl. Partnerbehandlung 3xtgl. 500mg
 Fluomizin Vaginaltabletten
 Gynoflor Vaginaltabletten, im Anschluss an Fluomizin
 Was hat Kundin am ehesten?
- Gardnerella vaginalis-Vaginitis
 - Trichomoniasis
 - Amöbiasis
 - Lambliasis
16. Ein Kunde wurde aufgrund einer COPD-Exazerbation im Spital während 5 Tagen mit Prednison 40mg täglich behandelt. Klinisch geht es ihm nun wieder besser. Was im Bezug auf die Steroid-Therapie ist zu unternehmen?
- Das Prednison 40mg kann gestoppt werden
 - 5 Tage mit Prednison 20mg, dann stoppen
 - 3 Tage mit Prednison 20mg, dann 3 Tage mit 10mg, dann stoppen
 - Noch 3 Tage mit 40mg weiter therapieren, dann stoppen

17. Welches Gliptin kann bei Niereninsuffizienz ohne Dosisanpassung gegeben werden?
- Sitagliptin
 - Linagliptin
 - ...
 - ...
18. 36 jährige Kundin löst folgendes Rezept ein:
Sifrol 0.125mg 0-0-0-1
Woran leidet die Kundin vermutlich?
- Parkinson
 - Restless Legs Syndrom
 - ...
 - ...
19. Ein Kunde hat Depakine Chrono 500mg 2-0-2, welches zurzeit nicht lieferbar ist. Welches ist die beste Alternative?
- Depakine Chrono 300mg
 - Valproat Chrono Sanofi 500mg
 - Valproat Chrono Desitin 500mg
 - Valproat Sandoz 500mg
20. Gemäss aktuellem Schweizer Impfplan ist die Pertussis Impfung für Schwangere besonders wichtig. Zu welchem Zeitpunkt sollte die (Auffrisch-)Impfung verabreicht werden?
- Noch vor der Schwangerschaft
 - 1. Trimester
 - 2. Trimester
 - 3. Trimester
 - Direkt nach der Geburt
21. Ein Kunde kommt in die Apotheke und erzählt, dass er seit einiger Zeit ständig so müde sei und zudem bereits nach 3 Treppenstufen ausser Atem gerät. Weiter stören ihn seine geschwellenen Beine. Woran leidet der Kunde vermutlich?
- Herzinfarkt
 - Hypertonie
 - Hirninfarkt
 - Herzinsuffizienz
 - ...
22. Eine Kundin kommt in die Apotheke und verlangt ein Schmerzmittel gegen Kopfschmerzen. Sie erfahren zudem, dass sie in der 30. Woche schwanger ist. Welcher Wirkstoff ist in diesem Fall am besten geeignet?
- Paracetamol
 - Ibuprofen
 - Acetylsalicylsäure
 - ...

23. Es ist 30 Grad warm und sonnig. Ein Kunde betritt die Apotheke, er schwitzt stark und klagt über Kopfschmerzen und Schwindel. Es fällt ihm schwer, die Symptome zu schildern. Zudem hängt sein rechter Mundwinkel nach unten. Was hat der Kunde am ehesten?
- Herzinfarkt
 - Hirninfarkt
 - Hitzschlag
 - ...
24. Ein Kunde erzählt ihnen, dass er Mühe hat, einzuschlafen. Sie werfen einen Blick auf die aktuelle Medikamentenliste des Kunden:
Escitalopram 0-0-0-1
... (weitere aufgeführt)
Was könnte am ehesten für dieses Symptom verantwortlich sein?
- Abendliche Einnahme von Escitalopram
25. Eine Kundin möchte eine pflanzliche Alternative zu Effortil Tropfen. Von diesen bekomme sie immer so Herzklopfen. Was empfehlen Sie der Kundin?
- Ginseng
 - Viscum album
 - Keine pflanzliche Alternative
 - Rosmarin
 - Ginkgo
26. Ein Kunde mit Vorhofflimmern erleidet einen Myokardinfarkt. Welche Blutverdünnung ist indiziert?
- ASS
 - ASS + Clopidogrel
 - Clopidogrel + DOAK
 - ASS + Clopidogrel + DOAK
27. Es ist Samstag. Ein Kunde kommt in die Apotheke und legt ein leeres Ventolin Dosieraerosol auf den Tresen. Er fragt, ob er so eins kaufen kann, da dieses leer sei und sein Hausarzt aufgrund des Wochenendes nicht erreichbar. Der Kunde ist im System zwar erfasst, jedoch ohne History. Was tun Sie?
- Abgabe verweigern
 - Ventolin ohne Dokumentation verkaufen
 - Abgabe Dokumentieren und Ventolin verkaufen
 - Abgabe als Vorbezug erfassen und ein Rezept nachfordern
 - ...
28. Ein Kind kommt in Begleitung einer Pfadi-Leiterin in die Apotheke und erzählt, dass er an Asthma Symptomen leidet. Er habe jedoch seinen Ventolin Spray nicht dabei. Er hat das Medikament jedoch schon lange und weiss, wie anwenden. Was machen Sie?
- Abgabe ohne Rezept, dokumentieren und Anwendung erklären
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...

29. Ein 35 jähriger sehr sportlicher Kunde kommt in die Apotheke zur Lipidprofil-Messung. Folgende Werte werden dabei gemessen:
Gesamtcholesterin: 6.5 mmol/l
LDL-Cholesterin: 2.8 mmol/l
HDL: 1 mmol/l
TG: 4 mmol/l
Was empfehlen Sie?
- Lifestyle Beratung durchführen
 - Den Kunden nach 3 Monaten wieder zu einer Messung aufbieten
 - Den Kunden zum Hausarzt schicken
 - ...
30. Ein Kunde nimmt aufgrund von Vorhofflimmern Xarelto ein. Nun löst er bei Ihnen ein Rezept für Rifampicin ein. Was ist zu unternehmen?
- Xarelto durch Eliquis ersetzen
 - Xarelto durch Lixiana ersetzen
 - Xarelto durch einen Vitamin K Antagonisten ersetzen
 - Xarelto Dosis erhöhen
31. Ein mit Ritonavir behandelter HIV-Patient nimmt Pravastatin. Die Cholesterin-Werte sind jedoch trotz der Statin-Therapie nicht im Zielbereich. Was schlagen Sie vor?
- Fluvastatin anstatt Pravastatin
 - Simvastatin anstatt Pravastatin
 - Rosuvastatin anstatt Pravastatin
 - Ezetimib anstatt Pravastatin
 - ...
32. Eine Kundin wurde von einem Hund gebissen. Sie möchte Pflaster und Desinfektionsmittel kaufen, die Wunde sei nicht so tief, was ist zu tun?
- Impfstatus prüfen und Wundversorgung machen
 - Desinfektionsmittel und Pflaster verkaufen und sagen, sie soll Verband regelmässig wechseln
 - Impfstatus prüfen und Kundin an Arzt weiterleiten
 - ...
33. Ein Kunde hat sich beim Schweissen verbrannt. Die Wunde ist ca. 2cm gross. Der Wundgrund ist weiss und ledrig. Der Kunde hat keine Schmerzen. Was machen Sie?
- Wundversorgung machen
 - Verbandsmaterial verkaufen und sagen, täglich wechseln
 - Wunde abdecken und Kunden zum Arzt schicken
 - ...
34. Eine Kundin hat von ihrem Ophthalmologen vor kurzem Diamox (Acetazolamid) verschrieben bekommen. Nun erzählt sie, dass sie seit gestern Abend starke Schmerzen im Rücken in der Nierengegend hat. Was empfehlen Sie der Kundin?
- Die Kundin soll Diamox weiternehmen
 - Die Kundin soll Diamox absetzen
 - Sie rufen den Arzt an und fragen, was Sie tun sollen
 - ...

35. Eine Frau kommt mit ihrem 3-jährigen Kind in die Apotheke. Aufgrund der beschriebenen Symptome denken Sie an eine akute Mittelohrentzündung. Die Beschwerden hat er seit gestern, gestern Abend und in der Nacht hat die Mutter bereits mit Otalgan Tropfen versucht, die Symptome zu lindern. Diese haben jedoch kaum geholfen. Was empfehlen Sie der Kundin?
- Otalgan stoppen und Dafalgan Zäpfchen geben
 - Otalgan stoppen und Triofan Nasenspray geben
 - Mit Otalgan weiterfahren
 - Kundin mit dem Kind zum Arzt schicken, da es Amoxicillin braucht
36. Ein Kunde hat eine akute Verletzung (Unfall) und er möchte Arnica Globuli C200. Wie muss er diese in dieser Situation einnehmen?
- Einmalig 4-5 Globuli vor oder nach dem Essen
 - Einmalig 4-5 Globuli mit dem Essen
 - Während 1 Woche 3x täglich 4-5 Globuli vor oder nach dem Essen
 - Während 1 Woche 3x täglich 4-5 Globuli mit dem Essen
37. Selbsttests sollten immer eine gute Sensitivität und Spezifität aufweisen. Was ist in diesem Zusammenhang korrekt? (genauer Wortlaut der möglichen Antworten nicht mehr auf dem Schirm, in etwa so)
- Die Spezifität gibt Auskunft darüber, wie häufig Gesunde als negativ erkannt werden
 - Eine hohe Sensitivität führt dazu, dass oft auch Kranke ein negatives Resultat erhalten
 - ...
 - ...
38. Ein Kunde hat Mühe mit Schlafen und möchte etwas Anthroposophisches. Was empfehlen Sie ihm?
- Ceres Valeriana
 - Valeriana C30 (oder so)
 - Wala levico (?)
 - Weleda Bryophyllum 50% Kautabletten
 - ...
39. Eine schwangere Kundin verlangt 4 Packungen Influenzinum, da ja die Grippeimpfung in der Schwangerschaft nicht gehe. Was machen Sie?
- Influenzinum verkaufen
 - Erklären, dass die Grippeimpfung im 2. und 3. Trimenon nicht kontraindiziert ist
 - Erklären, dass die Grippeimpfung während der ganzen Schwangerschaft empfohlen und nicht kontraindiziert ist
 - ...
40. Ein Kunde kommt am Morgen früh nüchtern zur Blutzucker- und HbA1C-Messung. Er hat einen Glucosewert von 5.4mmol/l und einen HbA1C von 9.5%, was stimmt?
- Der Glucosewert ist zu niedrig
 - Der HbA1C ist zu hoch, der Glucosewert in Ordnung, der Kunde hat sich kurz vor dem Termin an die Therapie/Lebensstilveränderungen gehalten

- Der HbA1C ist zu tief
 - Sie loben den Kunden für seine guten Werte
41. Ein Kunde hat von seinem Arzt neu ein Statin verschrieben bekommen. Seine Tante (oder sonst eine Verwandte), welche TCM Ärztin ist, empfiehlt ihm, stattdessen rote Reishefe zu nehmen. Was im Zusammenhang mit roter Reishefe stimmt?
- Er kann rote Reishefe in der Schweiz auch im Supermarkt als Nahrungsergänzungsmittel kaufen
 - Sie verkaufen ihm die rote Reishefe
 - Dem Kunden erklären, dass rote Reishefe kein Ersatz für ein Statin ist, da sie keinen Inhaltsstoff mit cholesterinsenkenden Eigenschaften enthält und es zudem keine Studien dazu gibt
 - Die Vermarktung von roter Reishefe ist in der Schweiz verboten
42. Ein Kunde löst ein Rezept ein für (unter anderem):
 Rifaximin (Xifaxan)
 Konakion
 Duphalac (Lactulose) 3xtgl. 50ml
 Indikation?
- Verstopfung
 - Hepatische Enzephalopathie
 - ...
 - ...
 - ...
43. Ein Kunde löst ein Rezept ein für (waren tatsächlich 2 verschiedene Fragen zu Lactulose):
 Duphalac (Lactulose) 3xtgl. 20ml
- Die Dosierung ist korrekt bei Obstipation
 - Die Dosierung ist korrekt bei hepatischer Enzephalopathie/Leberzirrhose
 - Die Dosierung ist zu hoch bei Obstipation
 - ...
44. Eine Kundin fühlt sich nach der FSME-Impfung plötzlich unwohl und atmet schwerer.
 Was tun sie als **Erstes**?
- Notfallset geben
 - Epipen geben
 - Korrekt lagern
 - 144 anrufen
 - Traubenzucker geben
45. Wie bzw. wo melden Sie den Verdacht auf eine unerwünschte Arzneimittelwirkung im Rahmen der Pharmakovigilanz?
- Sie schreiben dem Kantonsapotheker eine E-Mail, mit Nennung des betroffenen Medikaments und ausführlicher Fallbeschreibung (aufgetretene unerwünschte Wirkung)
 - Sie benutzen das Kontaktformular auf der Homepage von swissmedic

- Sie nutzen das Onlineformular von EIViS (Elektronisches Vigilance-System)
 - Sie nehmen das Formular vom Hersteller des Medikaments, welches sie vom Aussendienst erhalten haben
46. Eine **nicht** schwerwiegende unerwünschte Arzneimittelwirkung ist eine, die:
- Tödlich verläuft
 - Zur Hospitalisierung oder deren Verlängerung führt
 - Schwere oder bleibende Schäden verursacht
 - Zu einer reversiblen Behinderung führt
 - Sonst als medizinisch wichtig einzustufen ist
47. Eine Frau kommt in die Apotheke und sagt ganz aufgeregt, dass draussen eine bewusstlose Person liegt. Was machen Sie als **Erstes**, als sie draussen bei der Person angekommen sind (nachdem Sie die Umgebung geprüft haben und keine Gefahr für Sie selbst besteht)?
- Stabile Seitenlage
 - Atmung prüfen
 - AED holen und Elektroden aufkleben
 - Puls prüfen
 - 144 anrufen
48. Wo finden sich die verbindlichen Vorschriften zur GMP?
- In der PhEur
 - In der Ph.Helv.
 - Bei Swissmedic
 - Positionspapier vom Kantonsapothekeramt
 - PharManuel Artikel
49. Eine Kundin möchte Magnesiumchlorid kaufen, aber kein Fertigpräparat, wegen den Zusatzstoffen. Sie bestellen von Häseler die Beutel, als diese da sind fällt Ihnen auf, dass diese kein GID-Label haben. Was stimmt?
- Identitätsprüfung machen und abgeben
 - Ohne Identitätsprüfung abgeben
 - Kann nicht abgegeben werden zu medizinischen Zwecken
50. Eine Kundin löst ein Rezept für Fucidin Creme für ihr Kind ein, welches Impetigo hat. Da das Kind in eine Kita geht, fragt sie bei Ihnen nach, wann sie das Kind wieder in die Kita geben darf:
- Eine Info an die Kita reicht
 - Das Kind muss eine Woche zu Hause bleiben
 - Das Kind darf 24h (oder 12h?) nach dem Start der Antibiotika-Therapie wieder zur Kita
 - Das Kind sollte zu Hause bleiben, bis sich keine neuen Krusten mehr bilden
 - Das Kind sollte zu Hause bleiben, bis alle Krusten vollständig abgeheilt sind

51. Sie führen für eine neue Herstellung in Ihrer Apotheke die Risikoprüfung durch und errechnen einen Wert von 90. Was stimmt?
- Es bedarf einer Herstellungsbewilligung von swissmedic
 - Die kantonale Herstellungsbewilligung reicht aus
 - ...
 - ...
52. Welches Arzneimittel darf auf keinen Fall gemörsert werden?
- Cetallerg
 - Ibuprofen
 - Zolpidem
 - Pantoprazol
 - ...
53. Ein Kunde nimmt aufgrund von Diabetes 2x täglich Metformin 1000mg. Trotzdem sind seine Werte nicht im Zielbereich. Neu erhält er deshalb von seinem Arzt Ozempic Fixdose 1mg verschrieben. Was stimmt?
- Die Metformin-Dosis sollte aufgrund der Kombination mit Ozempic gesenkt werden
 - Die Ozempic Dosierung ist korrekt
 - Ozempic sollte eingeschlichen werden
 - ...
54. Eine schwangere Kundin kommt in die Apotheke mit einem Rezept:
Methyldopa 250mg 2-0-2
Magnesiocard 10mmol 1-0-1
Es ist Samstag und der Gynäkologe der Kundin ist nicht erreichbar. Sie haben Methyldopa nicht an Lager und müssten es bestellen. Magnesiocard haben Sie vorrätig. Was machen Sie?
- Da es sich nicht um eine dringende Angelegenheit handelt, bestellen Sie das Methyldopa auf Montag, dann kann sie es zusammen mit dem Magnesium abholen
 - Sie geben noch nichts ab, da die Magnesium-Dosierung zu hoch ist, Sie werden dies am Montag mit dem Gynäkologen abklären
 - Sie geben das Magnesium nicht ab und schicken die Kundin auf den Notfall, da Sie das Methyldopa nicht an Lager haben und die Magnesium-Dosierung zu hoch ist
 - Da es sich um eine dringende Angelegenheit handelt, organisieren Sie der Kundin das Methyldopa schnellstmöglich und liefern es ihr zusammen mit dem Magnesiocard gleichentags nach Hause
55. Ein Kunde mit Niereninsuffizienz erleidet einen akuten Gichtanfall. Was ist in diesem Fall die beste Therapieoption?
- Allopurinol
 - Ibuprofen
 - Prednison
 - Colchicin
 - Febuxostat

56. Eine Ärztin ruft bei Ihnen an. Ein HIV-Patient nimmt aufgrund zu hoher Cholesterin-Werte Pravastatin. Trotzdem sind die Werte nicht im Zielbereich. Was empfehlen Sie der Ärztin, was sie dem Patienten anstelle des Pravastatins verschreiben soll?
- Fluvastatin
 - Simvastatin
 - Rosuvastatin
 - Ezetimib
57. Ein Kunde nimmt Xarelto ein. Er erzählt Ihnen, dass er eine Einnahme vergessen hat. Was raten Sie ihm?
- Vergessene Dosis sofort nachholen und die nächste Tablette zur gewohnten Zeit nehmen
 - Falls mehr als 12 Stunden seit der planmässigen Einnahme vergangen sind, soll er am nächsten Tag 2 Tabletten nehmen
 - Die Dosis sollte nie nachgeholt werden, unabhängig davon, wie lange die Einnahme vergessen wurde
 - Bis 12 Stunden nach der planmässigen Einnahme soll die halbe Dosis nachgenommen werden, dann wieder zum üblichen Zeitpunkt weiterfahren
58. Eine Kundin nimmt die Pille und möchte ein Johanniskraut-Präparat kaufen. Was machen Sie?
- Alles unter 1mg Hyperforin pro Tag geht
 - Es gibt keine relevante Interaktion, Remotiv 250 kann abgegeben werden
 - ...
 - ...
59. Eine Kundin möchte einen Schwangerschaftstest kaufen. Sie erfahren, dass sie vor 4 Tagen ein „One-Night-Stand“ ohne Verhütung hatte. Was stimmt?
- Sie verkaufen den Schwangerschaftstest und lassen ihn die Kundin zu Hause machen
 - Da der ungeschützte Verkehr erst vor 4 Tagen war, bieten Sie ihr die Dienstleistung „Pille danach“ an
 - ...
 - ...
60. Ein älterer Kunde löst ein Rezept ein für:
- Tamsulosin 400mcg 1-0-0
Solifenacin (Vesicare) 1-0-0
Alendronat 70mg 1-0-0 nur montags
Calcimagon D3 500/800 0-1-0
- Welches Problem sehen Sie?
- Interaktion
 - Kontraindikation
 - Verdoppelung
 - Potenziell inadäquate Medikation (PIM)

61. Ein Kunde klagt über akute Rückenschmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich, welche seit einer falschen Bewegung bei der Gartenarbeit da sind. Es strahlt nicht aus. Der Kunde hat eine Niereninsuffizienz und nimmt seit Jahren Prednison ein.

Was empfehlen Sie ihm?

- Wärmepflaster, wenn es nach 2 bis 3 Tagen nicht besser ist, soll er zum Arzt
- Wärmepflaster und Ibuprofen 400mg (oder Diclofenac 25mg?) 3x täglich während 3 Tagen
- ...
- ...

62. Ein Kunde hat eine Leberinsuffizienz. Welches Schmerzmittel empfehlen Sie ihm?

- Paracetamol 2x1g pro Tag
- Paracetamol 4x1g pro Tag
- Ibuprofen 400mg 3x pro Tag
- Ibuprofen 600mg 3x pro Tag

63. Ein Patient mit Gicht hat einen Blutdruck von 146/91mmHg. Welche Blutdruckmedikamente sind indiziert als Standardtherapie?

- RAAS-Blocker
- RAAS-Blocker + Diuretika
- RAAS-Blocker + Calciumantagonisten
- RAAS + Diuretika + Betablocker

64. Ein Kunde mit Psoriasis möchte gerne eine pflanzliche Kortisonalternative. Was empfehlen Sie ihm? (Cardiospermum war leider nicht aufgeführt)

- Oenothera biennis (Nachtkerze)
- Weihrauch?
- ...
- ...

65. Welches Opioid ist bei Niereninsuffizienz die Therapie der Wahl?

- Hydromorphon
- Fentanyl
- Methadon
- Buprenorphin

Kprim-Fragen (jeweils 4 Aussagen beurteilen)

1. Kunde (männlich) 16j. hat Isotretinoin auf Rezept. Die verschriebene Menge reicht nur für 1 Monat. Weshalb möchte der Arzt ihn dann schon wieder sehen?

- Messung Lipidwerte
- Messung Leberwerte
- Überwachung der Dosierung
- Blutdruck überprüfen

2. Eine Kundin möchte Probase von Burgerstein kaufen (Calcium, Kalium, Magnesium, Zink, Mangan). Sie fragen, was sie sonst noch für Medikamente einnimmt (unten aufgeführt). Welche davon sind problematisch, falls sie zusammen mit Probase angewendet würden?
 - Euthyrox
 - Renagel
 - ...
 - ...
3. Welche Faktoren können das Ergebnis einer Pulsoxymetrie-Messung beeinflussen?
 - Tiefer Blutdruck
 - Künstliche Nägel
 - Kalte Hände
 - Unregelmässiger Puls
4. Sie führen einen Polymedikations-Check bei einem Kunden durch. Welche Einnahmezeitpunkte der Medikamente sind nicht optimal gewählt?
 - Trittico 1-0-0-0
 - Irgendwas-HCT 0-0-0-1
 - ...
 - ...
5. Ein Kinderarzt möchte gerne für ein 3 jähriges Kind etwas gegen die trockene Haut verordnen. Salbengrundlage alleine habe zu wenig geholfen. Welche Zusätze zur Salbengrundlage sind möglich?
 - Glycerin 5%
 - Urea 5%
 - Nachtkerzenöl ?%
 - Menthol ?%
6. Rezept für Isotretionin: Sie schauen in die History der Kundin. Bei der gleichzeitigen Einnahme welcher Medikamente ist eine Intervention des Apothekers notwendig?
 - Minocyclin
 - Ibuprofen
 - ...
 - ...
7. Welche Medikamente werden typischerweise nach einem Myokardinfarkt verordnet?
 - Thiazid
 - Betablocker
 - ACE-Hemmer
 - Statin
8. Was stimmt im Bezug auf die Anwendung von Nitroglycerin Kapseln?
 - Die Kapseln werden mit einem Glas Wasser geschluckt
 - Die Kapseln werden aufgebissen und der Inhalt möglichst lange im Mund behalten, dann geschluckt
 - ...
 - ...

9. Was ist im Zusammenhang mit dem Epipen korrekt?
- Es sollten immer 2 Pens abgegeben bzw. bei sich getragen werden
 - Eine Vorerkrankung, welche mit Inderal (Propranolol) behandelt wird, ist ein Problem
 - Es gibt keine absolute Kontraindikation für die Anwendung eines Epipens bei einer anaphylaktischen Reaktion
 - ...
10. Was gehört zur Plausibilitätsprüfung einer Herstellung, was nicht?
- Mögliche Inkompatibilitäten
 - Bedenkliche Inhaltsstoffe
 - Stabilität
 - Rezeptur sinnvoll und Dosierung korrekt
11. Eine Pflegefachfrau des Altersheims, welches Sie betreuen, ruft an und schildert, dass der Arzt für eine Heimkundin neu das Antibiotikum Bactrim in Tablettenform verschrieben hat. Die Heimkundin leidet jedoch an Schluckbeschwerden und kann die Tabletten daher nicht schlucken. Was machen Sie?
- Schlucktechnik überprüfen und Hilfe anbieten
 - Nach alternativer galenischer Form suchen oder nach einer Herstellvorschrift für eine Magistralrezeptur in flüssiger Form
 - Mit dem Arzt ein alternatives Antibiotikum in besser schluckbarer Form besprechen
 - Teilbarkeit bzw. Mörserbarkeit der Bactrim Tabletten nachschauen
12. Welche Präparate dürfen geteilt werden?
- Madopar LIQ
 - Cellcept
 - ...
 - ...
13. In der Apotheke werden Ausgangssubstanzen nicht nur zur Herstellung verwendet, sondern teilweise auch direkt an die Kundschaft verkauft. Bei welchen der folgenden Substanzen handelt es sich um Vorläuferstoffe, die nicht in grösseren Mengen und nur unter Angabe eines plausiblen Verwendungszwecks an Privatkunden verkauft werden sollten?
- Aceton
 - Schwefelsäure
 - Ammoniumnitrat
 - Wasserstoffperoxid 3%
14. Welche der folgenden Phytotherapeutika kann den INR-Wert beeinflussen?
- Pelargonium
 - ...
 - ...
 - ...

15. Welche Medikamente darf ein Patient mit einer Allergie auf Bactrim einnehmen, welche nicht?

- Co-Amoxicillin
- Diamox
- Diamicron
- Hydrochlorothiazid

16. Ein Patient mit Niereinsuffizienz hat einen GFR-Wert von 30ml/min/1.73 m². Was geht?

- Metformin
- ...
- ...
- ...

17. Ein Patient mit Niereinsuffizienz hat einen GFR-Wert von 28ml/min/1.73 m². Was geht?

- Metformin
- ...
- ...
- ...