

Prüfung Fachapotheker in Offizinpharmazie (April 2033)

Hallo zusammen, kurz Infos zu den folgenden Fragen: An der Prüfung waren es 61 A Fragen und 49 Kprim Fragen. Hier sind die meisten Kprim auch als solche gekennzeichnet, aber es gibt auch Fragen, welche nicht als Kprim gekennzeichnet sind, da wir es beim Zusammenstellen auch nicht mehr wussten;). Und die Reihenfolge nach Thema ist auch nur grob korrekt und war in der Prüfung nicht so. Es half einfach beim Zusammenstellen der Fragen, die Übersicht etwas zu halten. Zudem hat es im Dokument 102 Fragen, also sind irgendwo 2 Fragen doppelt. Wir wünschen euch viel Erfolg an eurer FPH Prüfung!!

1 Rx Validierung

1. Atropin 0.01% 1x täglich abends – Indikation
 - Therapie Glaukom
 - Therapie Katarakt
 - Therapie Stabismus
 - Prophylaxe Myopie
2. Herstellung Riboflavin 2x 200mg: Indikation
 - a. ADHS
 - b. Migräne
 - c. Vit. B-Supplementierung
3. MTX 10mg täglich 1-0-0 bei Rheuma. Was ist falsch
 - a. Dosierungsstärke
 - b. Dosierungsfrequenz
 - c. Dosierungsintervall
 - d. Indikation
4. Kprim Ein Kunde bringt folgendes Rezept in die Apotheke: MTX 15mg 1-0-0 Folsäure 5mg 1-0-0 ASS cardio 100mg 1-0-0 Brufen 400mg 1-1-1 Pantoprazol 20mg 1-0-0 Folgende Punkte müssen mit dem Patienten besprochen werden?
 - Brufen ist keine gute Wahl, es sollte besser Dafalgan verwendet werden
 - MTX und Folsäure dürfen zusammen eingenommen werden
 - MTX darf nur einmal pro Woche eingenommen werden
 - Pantoprazol ist das einzige Medikament welches 30 Minuten vor dem Essen eingenommen werden sollte
5. Kprim Welches kann problemlos mit Buscopan kombiniert werden?
 - a. Saroten
 - b. Irfen
 - c. Novalgin
 - d. Benocten
6. 80jährige Frau Dalgan 1g 1-1-1-0. Dosierung ok?
 - a. entspricht Maximaldosierung Dafalgan
 - b. entspricht altersangepasste Dosierung Dafalgan
 - c. ist unterdosiert
 - d. sollte alterentsprechend angepasst werden

7. Ein Kunde bringt seinen Medikationsplan mit, da er in letzter Zeit sehr schlecht schläft:
Escitalopram 0-0-1, Aspirin cardio 1-0-0 und ... → was für eine Optimierung könnten Sie vornehmen, damit die Schlafprobleme verringert werden?
- Escitalopram morgens einnehmen
 - Aspirin cardio abends einnehmen
 - xx
8. Medikamente: Thyroxin, Antihypertensiva... was hat der Kunde
9. Medikationsplan
- a. bei Kreuzschmerzen lieber von Ibu auf Paracetamol wechseln
 - b. Pantoprazol absetzen
 - c. Statine
10. Medikamente einschleichen
- a. Metformin
 - b. Allopurinol
 - c. Cordarone
 - d. Marcoumar
11. kprim Auf was muss bei der Verschreibung von Allopurinol geachtet werden?
- Stoppen bei Auftreten von einem Hautausschlag
 - Vorsicht bei Kombination mit CYP3A4-Hemmern
 - Dosis reduzieren bei Niereninsuffizienz
12. Welche Medi muss man nüchtern einnehmen
- ciproxin (ciprofloxacin)
 - glucophage (metformin)
 - rybelsus (semaglutid)
 - Malarone
13. Welches ist teilbar
- Cellcept
 - MST retard
 - Madopar Liq
 - Pradaxa Kapseln

14. Migel Blutzuckerstreifen

Position	L	Bezeichnung	Menge	HVB	Gültig ab
21.03.01.01.1	L	Reagenzträger für Blutzuckerbestimmung zur Auswertung und Wertanzeige mittels Gerät. Ohne Mengenbeschränkung bei insulin-pflichtigen Diabetikern und bei Patientinnen mit Diabetes in der Schwangerschaft. Limitation: Bei nicht insulinpflichtigen Diabetikern maximal 200 Reagenzträger pro Jahr. In speziellen medizinischen Fällen kann bei folgenden Indikationen bis maximal die doppelte der genannten Reagenzträger pro Jahr vergütet werden. (mindestens eine der folgenden Indikationen muss erfüllt sein): Einstellungsphasen (höhere Anzahl Reagenzträger während 6 Monaten) HbA_{1c} > 7.5% bei Personen mit wenigen koexistierenden chronischen Krankheiten und intakter	1 Stück	0.62	1.4.2021

15. Zeckenstich, Doxycyclin Rx

- geht über Unfallversicherung
- geht über Grundversicherung
- geht über Zusatzversicherung

16. KPrim: Timolol Gel Topisch angewendet

- Indikation Hämangiom
- Falls topische Therapie versagt, Orale Propranololtherapie
- UAW: Pulssenkung auch wenn lokal
- Muss abgedeckt werden

17. Rezept mit Xarelto, ASS, Clarithromycin, PPI. Was wird erwartet?

- Hyperkaliämie
- Blutung
- ..
- ..

18. KPrim: Wann sind KCL retard Tabletten kontraindiziert?

- Chronischer Durchfall
- Niereninsuffizienz
- Magen-Darm-Ulzera
- Kombination mit Aldactone

19. Kunde bringt folgendes Rezept: Aspirin cardio 1-0-0, Sortis 40mg 1-0-0, Isoptin RR 240mg 1-0-0, Pantozol 40mg 1-0-0 und Stilnox 0-0-0-1 → welches Medikament ist für eine Arzneimittelinteraktion verantwortlich, welche eine Rücksprache mit dem Arzt erfordert?

- Aspirin cardio
- Isoptin RR
- Pantoprazol
- Stilnox

20. Welches Medi soll mit Mahlzeit eingenommen werden?
- ☐ Fosamax
 - ☐ Euthyrox
 - ☐ Tuberkulosemedi
 - ☐ Malarone → mit dem Essen/Milch
 - ☐ Rybelsus
21. KPrim Welche Medikamente muss man aufdosieren?
- ☐ Memantin
 - ☐ Amiodaron
 - ☐ Marcoumar
 - ☐ Metformin
22. Ein herztransplantierte Kunde bringt folgendes Rezept: Augmentin 625mg 1-1-1, Codein knoll 0-0-0-1 und Perenterol 250mg 1-0-1 → was für ein Problem sehen Sie, welches eine Rücksprache mit dem Arzt erfordert?
- ☐ Das Rezept kann so ausgeführt werden
 - ☐ Problem aufgrund Interaktion
 - ☐ Problem aufgrund Kontraindikation
 - ☐ Problem aufgrund Überdosierung
23. Einnahme von Ciproxin und welchem Produkt zeigt IA kann man aber durch 2h Abstand bei Einnahme umgehen?
- ☐ Sirdalud
 - ☐ Magnesiocard
 - ☐ Domperidon
 - ☐ Xx
24. KPrim: Welche Wirkstoffe machen Lichtempfindlichkeit
- ☐ Allopurinol
 - ☐ Doxycyclin
 - ☐ Amiodaron
 - ☐ Hypericin
25. IA verapamil - statin erkennen
26. Nifedipin Creme, f. magistralis, was ist die Indikation?
- ☐ Analfissuren
 - ☐ Hämorrhoiden
 - ☐ xx
27. Wie häufig müssen dermale Kortikosteroide in der akuten entzündlichen Phase angewendet werden?
- ☐ a. 1x täglich
 - ☐ b. 2x täglich
 - ☐ c. 3x täglich
 - ☐ d. 4x täglich
28. Eine Kundin kommt mit einem Rezept für Azithromycin (1-0-0 für 3 Tage, Otitis media) in die Apotheke. Als Dauermedikation nimmt sie noch Citalopram → was ist zu tun?
- ☐ Keine relevante additive Wirkung zu erwarten, kann bedenkenlos abgegeben werden
 - ☐ Azithromycin ist nur für 3 Tage und kann deshalb abgegeben werden
 - ☐ Arzt informieren und Ciprofloxacin empfehlen
 - ☐ Azithromycin nicht abgeben

29. Eine Kundin hat folgendes Rezept in der Apotheke hinterlegt: Pantoprazol 1-0-0 Brufen 1-1-1 Surmontil 0-0-0-1 Xarelto 1-0-0 ASS cardio 1-0-0 Was könnte man an der Therapie optimieren?
- PPI stoppen
 - Anderes Schmerzmittel wählen
 - Anderes Antidepressivum wählen
 - xx

2 Phyto

30. Pflanzliche Alternative für Desinfektionsmittel
- a. Hirtenatäschel
 - b. Kamille
 - c. Ringelblume
 - d. Echinacea
31. BPH. Welches pflanzliche Arzneimittel
- Kürbiskerne
 - Sägepalme
 - Urtica
 - Cranberry
32. Kunde lässt sich leicht ablenken, unruhig, nervös, gestresst. Welches phytotherapeutikum passt nicht?
- Lavendel
 - Johanniskraut
 - Gingko
 - Rosenwurz

3 Komplementär

33. KPrim: Frau hat Gynaedron als Standardtherapie, will was Natürliches. Hat Juckreiz, Brennen.
- Wala Majorana/Thuja comp
 - WELEDA Aurum/Lavandula aeth. Rosa comp Ungt
 - Vaginalglobuli
 - Xxx

4 Klinische

34. Inkubation vor 2w, Hautausschlag Papula, Makula, Bläschen und Krusten. Allgemein Zustand gut, leichtes Fieber. Was?
- Windpocken
35. Otoskopie (Bild ohne sichtbares Trommelfell (schwarz), keine Härchen, etwas weissliche Pappeln auf Schleimhaut des Hörkanals), Kunde hat geringer Hörverlust einseitig, kein Ausfluss, kein Schwindel, guter Allgemeinzustand, geht oft Tauchen
- Otitis externa
 - Trommelfellperforation
 - Mittelohrentzündung
 - Ohrenpfropf

36. Sildenafil

- Abgab von Sildenafil 50mg 4 Tablette kann unter Liste B+ erfolgen
- muss eine kardiovaskuläre Triage erfolgen
- kann nach Dokumentation an Dritte abgegeben werden
- ist bei starker Leberinsuffizienz kontraindiziert
- sollte mit einer Mahlzeit eingenommen werden

37. Kundin möchte ein Triptan, welches sie auch schon mal hatte

- a. Xxx ist ein neurologischer Notfall -> Arzt
- b. Abgeben und sofort einnehmen.
- c. Abgeben und nach Aura einnehmen
- d. Ibuprofen einnehmen zum Überbrücken Arztbesuch

38. Opioid anagletische Potenz. Was ist oral stärker?

- a. Morphin
- b. Tapentadol
- c. Oxycodon
- d. Hydromorphon

39. Patient hat als fixe Basistherapie 2x täglich 8mg Palladon. Der verschreibende Arzt möchte nun in Reserve noch Hydromorphon Tropfen 1mg/ml verschreiben und fragt nach der geeigneten Reservedosis → was empfehlen sie dem Arzt als Reservedosis?

- 0.8mg
- 2.6mg
- 5.4mg
- 7.6mg

40. Opioid: Reservemedikation

- a. Sollte der gleiche Wirkstoff als die Fixmedikation gewählt werden
- b. sollte retardiert sein
- c. entspricht $\frac{1}{6}$ bis $\frac{1}{10}$ der Tagesdosis
- d. sollte die Prämedikation angepasst werden sobald $>1x/Tag$ eingenommen wird

41. Obstipation bei Opioid, Kunde nimmt schon 2x Transipeg forte, was tun?

- a. Opioiddosis reduzieren
- b. Transipeg erhöhen
- c. zusätzlich Natriumpicosulfat
- d. Zusätzlich Flohsamen
- e. Zusätzlich Lactulose

42. Welches Antihypertensivum bei Gicht

- ☐ a. Losartan
- ☐ b. Amlodipin
- ☐ c. ACEI
- ☐ d. Torasemid

43. Welches Inhalationsgerät ergibt die beste pulmonalen Wirkstofffreisetzung:

- ☐ a. Respimat
- ☐ b. Turbuhaler
- ☐ c. Dosieraerosol (ohne Vorschaltkammer)
- ☐ d. Handihaler

44. Blutdruckmessen durch Patient, was muss am Kunde gesagt werden

- ☐ Hinsetzen und 5 min ruhig lesen -> ist falsch
- ☐ Oberarm-Manschette auf Herzhöhe anlegen -> ist falsch
- ☐ 2 Messungen im Abstand von 1-2 min -> ist falsch
- ☐ alles wird richtig gemacht

45. Kunde nimmt Rifampicin, braucht nun aber noch Paxlovid

- ☐ sollte Paxlovid-Dosis halbiert werden
- ☐ sollte Rifampicin pausiert werden
- ☐ ist hier kontraindiziert
- ☐ sollte Rifampicin-Dosis erhöht werden

46. Photosensitivität

- a. Doxycyclin
- b. Allopurinol
- c. Johanniskraut
- d. Amiodaron

47. Welche Medikamente toleriert am wenigsten eine Vergessene Einnahme?

- a. Xarelto
- b. Prograf
- c. Aspirin cardio
- d. Eltroxin

48. Säugling (7 Wochen) hat Dreimonatskoliken, sehr unruhig, was geben, Flatulex reicht nicht aus?

- ☐ a. Wala Carum Carvi zäpfchen
- ☐ b. Fencheltee für stillende Mutter
- ☐ c. Bigaia Tropfen
- ☐ d. Viburcol

49. Pharyngitis

- a. Antibiotikum der 1. Wahl wäre Amoxicillin
- b. SSI Guidelines Therapie 6 Tage lang
- c. Kann 72 bis 90h Abgewartet werden
- d. sollte schnell mit Antibiotika behandelt werden wegen Ansteckungsgefahr des Umfeldes

50. Unfall mit Zahnverletzung. Zahn ist ausgefallen was machen?

- ☐ Zahn wegwerfen
- ☐ In Milch bis zum Zahnarzttermin
- ☐ Trocken lagern bis zum Zaharzttermin
- ☐ Zahn säubern und desinfizieren

51. Ultrametabolizer CYP2D6 haben bei welchem Medikament verstärkte UAW?

- ☐ Codein

52. KPrim: UAW Tramadol

- ☐ Schwindel
- ☐ Farbsehen gestört
- ☐ Obstipation
- ☐ Krämpfe

53. KPrim: Welche Antidepressiva sind sedierend


- ☐ Escitalopram
- ☐ Surmontil
- ☐ Trazdon
- ☐ Remeron

54. KPrim: Gewichtszunahme

- ☐ Remeron
- ☐ Quetiapin
- ☐ Liraglutid
- ☐ Wellbutrin

55. Diabetiker mit eGFR 20 ml/min. Welches Antidiabetikum muss gewählt werden? Bild war dabei

Abbildung 1: Flow Chart aktualisierte Empfehlungen 2019 auf einen Blick



- ☐ XX
- ☐ Gliclazid
- ☐ Semaglutid
- ☐ Dapagliflozin

56. Welches schmerzmittel hat bei Kreuzschmerzen keine med evidenz?
- metamizol
 - dafalgan → Gem Medix guidelines Rückenbeschwerden
 - celecoxib
 - ibuprofen
57. Ein Mann hat seit wenigen Tagen weissen Belag auf seiner Eichel. Welches Medi könnte das verursacht haben
- GLP1-Agonist,
 - SGLT2-Hemmer
 - Metformin
58. Frau hat folgende Beschwerden: Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Kältegefühl. Was hat sie?
- Vitamin B12 Mangel
 - Hyperthyreose
 - Hypothyreose
 - Xx
59. welches medi erhöht mortalität bei HI mit reduziertem Auswurf nicht oder so..
60. Welche Aussagen zu Streptokokken-Angina bei Erwachsenen sind korrekt?
- Antibiotika ist immer indiziert, um Folgeschäden zu vermeiden
 - Amoxicillin ist Antibiotika 1. Wahl
 - Gemäss schweizerischen Guidelines dauert eine Antibiotikatherapie bei der Streptokokken-Angina 6 Tage
 - Es kann 72-96 Stunden zugewartet werden, bevor Antibiotika verschrieben werden
61. Ursachen Hypomagnesie?
62. Motilium, was gilt?
- Nicht unter 6 Jahren
 - Nicht länger als 1 Woche ununterbrochen
 - Macht QT Verlängerung
 - Macht änderung auf EKG
63. Welches Medikament ist bei einer Niereninsuffizienz mit GRF 20ml/min kontraindiziert?
- Allopurinol
 - Brufen
 - xx
64. Kprim Welche Aussagen sind betreffend topischer Aknetherapie korrekt?
- Die Antibabypille ist bei jungen Frauen die wirkungsvollste Aknetherapie
 - Zur besseren Verträglichkeit kann die Anwendungsfrequenz verlängert werden
 - xx
65. Kprim Ein Mann (80kg) kommt mit einem Rezept für Co-Diovan 80/12.5mg, Lixiana 30mg, Tamsulosin 0.4mg und ... in die Apotheke → was hat der Patient für Krankheiten?
- Hypertonie
 - Niereninsuffizienz
 - Herzinsuffizienz
 - xx
66. Kprim Welchen Effekt hat Semaglutid (Ozempic)?
- Verringertes Risiko für Hyperglykämien
 - Verringertes Risiko für Nephropathie
 - Verringertes Risiko für koronare Herzkrankheiten
 - Verringertes Risiko für Herzinsuffizienz

67. Kprim Welche Aussagen zu einer Ekzemtherapie mit topischen Kortikosteroiden sind korrekt?
- ☐ Morgens und abends anwenden
 - ☐ Nicht okkludieren
 - ☐ Nach Langzeittherapie immer ausschleichen •
 - ☐ Müssen in der Initialtherapie mindestens 1 Monat angewendet werden

5 Anamnese zur Therapie

68. Herpes Zoster. Was tun
- ☐ a. Zum Arzt
 - ☐ b. Valaciclovir 1000mg 3x täglich
 - ☐ c. Fenistil gegen Juckreiz
 - ☐ d. Fucidin gegen Superinfektion
69. KPrim: Kundin braucht Pille danach, ist das 2. Mal im gleichen Zyklus (hatte Levonorgestrel)
- ☐ nur unter medizinischer Überwachung Abgabe der Pille danach möglich
 - ☐ Pille danach kann als Verhütungsmittel verwendet werden
 - ☐ Mehrfache Einnahme im gleichen Zyklus kann das Risiko für ektope Schwangerschaft erhöhen
 - ☐ Pille danach kann nochmals abgegeben werden, aber nur nochmals Levonorgestrel
70. Notfallkontrazeption
- ☐ ist bei BMI>26 Levonorgestrel empfohlen
 - ☐ ist eine sichere Verhütung
71. Kunde hat sich mit Schweissgerät an Hand verbrannt. Er fühlt keinen Schmerz und die Wunde hat einen weisslichen Grund, ca 2 cm Durchmesser, wie gehen sie vor?
- ☐ Arzt schnellst möglich
 - ☐ Ialugen plus etc.
 - ☐ Hydrokolloid
 - ☐ Abdecken und warten in 3 tagen vorbeikommen

6 Herstellungen

72. Wer ist verantwortlich für Endfreigabe bei einer Lohnherstellung?
- ☐ Auftragnehmer
 - ☐ Auftraggeber (→ Apotheker!)
 - ☐ Verschreiber
 - ☐ keine Freigabe nötig
 - ☐
73. Kprim Welche Aussagen betreffend Lohnherstellungen sind korrekt?
- ☐ Die Endfreigabe erfolgt immer durch den Auftraggeber
 - ☐ Ein Arzt darf Lohnherstellungen bei der Apotheke in Auftrag geben
 - ☐ Bei einem Fehler im Herstellungsprozess (z.B. falsche Einwaage) haftet grösstenteils der Auftraggeber
 - ☐ xx
74. Was muss auf Etikette deklariert sein
- ☐ a. Quantitative Menge Hilfsstoffe
 - ☐ b. Qualitative Menge gewisse Zusatzstoffe gem. xxx
 - ☐ c. Quantitative Menge Wirkstoff
 - ☐ d. Formula

75. Kprim Kapseln

- Bei einem Wirkstoffgehalt < 10mg ist gemäss Pharmakopöe eine Gehaltsbestimmung notwendig
- Eine Waage mit d=0.01 darf für die Bestimmung der Gleichförmigkeit der Masse verwendet werden
- Mannitol ist bei Frühgeborenen/Säuglingen nur mit Vorsicht anzuwenden
- Ist die Pulvermenge des Wirkstoffes < 50% der Gesamtpulvermenge, so muss zuerst mind. 50% Mannitol im Messzylinder vorgelegt werden, dann kommt der Wirkstoff dazu und zum Schluss wird noch mit Mannitol aufgefüllt

76. KPrim: Was sind mögliche Inprozesskontrollen?

- Gleichförmigkeit der Masse → EPC, da Freigabeprüfung nach PhEur
- Massenbilanz
- homogene Anreibung
- klare Lösung

77. Risikoprüfung. Was ist falsch?

- Wert möglichst tief falls man ausschliesslich für Apo herstellt und nicht im Lohnauftrag.
- Bei wert unter 100 bedarf es keine Swissmedic bewilligung
- Risiko WS wird anhand Abgabekategorie eines Medikamentes das von Swissmedic bewilligt ist ausgewählt. A+, A, B, D
- Xx

78. Was ist unbedenklich für eine Herstellung

- Napahzolin
- Naphtalin
- Borsäure
- Xxx

79. Welche Aussage ist korrekt zur Abrechnung von Formula-Herstellungen in der Apotheke?

- Für die Herstellung gebrauchte Originalpräparate dürfen der OKP verrechnet werden
- Allfällig anfallendes Porto bei Herstellungen im Lohnherstellungsvertrag dürfen an die OKP weiterverrechnet werden
- Verwendete Wirkstoffe, welche sich auf der Arzneimittelliste mit Tarif befinden, dürfen an die OKP verrechnet werden
- Melatonin-Suspension darf an die OKP verrechnet werden

7 Laborresultate

80. Was hat unser Kunde bei normale ALAT, ASAT, stark erhöhtes Troponin, erhöhte CK

- a. TIA
- b. Leberzirrhose
- c. Tiefe Venenthrombose
- d. Myokardinfarkt

81. 52J Kunde, Sportler und ernährungsbewusst macht einen Herzcheck. Es resultieren folgende Werte:

Gesamt Cholesterin 7.8 mmol/l

LDL: 4.5 mmol/l

HDL: 1.0 mmol/l

Triglyceride: 2.3 mmol/l

- Wir empfehlen eine ausreichende Bewegung um Triglyceridwerte zu Senken.
- hochdosierte Omega-3-FS einnehmen. Bevorzugt aus Algenextrakt
- Patient sollte einen Arzttermin vereinbaren.
- in 3 Monate in Apo nochmals messen

82. Eine Kundin ist im Ausland und meldet sich aufgrund von HWI-Beschwerden (Harndrang und Brennen beim Wasserlösen). Sie kenne das Problem (hatte es vor 3 Jahren bereits) und wollte deshalb im Spital Medikamente holen. Dort wurde ihr gesagt sie benötigt eine stationäre i.v.-Antibiose, sie möchte nun unsere Meinung wissen. Die Kundin sendet uns folgende Blutwerte zu: CRP 7mg/l, Leukozyten +++, Protein neg., Blut neg. und Nitrit neg. → was empfehlen Sie der Kundin?
- i.v.-Antibiose im Spital notwendig
 - orale Antibiose im Spital notwendig
 - orale Antibiose ausserhalb des Spitalsettings notwendig
 - keine Antibiose notwendig
83. KPrim: Kunde mit Grippesymptome hatte kürzlich UGV und will HIV-Test
- PEP muss innert 72 h begonnen werden → falsch wäre 48h
 - Test Zeigt schon nach 7d an
 - Primoinfektionssymptome sind Grippe ähnlich
 - Infektiosität ist am Anfang am höchsten
84. KPrim: Was sagt CRP aus?
- Bei Werten über 20 mg/L Antibiotika indiziert (nicht unbedingt, da nicht nur unter Infektionen ist CRP-Wert erhöht)
 - sinkt sehr schnell unter Antibiotikagabe
 - sagt aus, ob viraler oder bakterieller Infekt
 - steigt nur bei bakteriellen Infekten schnell an
85. Welche Werte können postprandial gemessen werden ohne dass die Werte davon beeinflusst werden?
- Blutdruck
 - HbA1c
 - LDL-Cholesterin
 - Triglyceride

8 Notfälle

86. Gesetz: Weiterleitung Information über Kundenmedikation ohne Patientenerlaubnis
- a. Ehefrau
 - b. Eltern eines 16j. Kind
 - c. bei Notfallsituation wo der Patient sich momentan befindet
 - d. Kantonsamt wegen Missbrauchsmeldung
 - e. Hausarzt
87. Allergie: Kunde mit bekannter Bienenstichallergie, Dyspnoe und leichte Tachykardie kommt in Apo hat aber kein Epipen oder Notfallset dabei.
- a. Notfallset geben
 - b. Epipen geben
 - c. Hausarzt kontaktieren
 - d. 144 anrufen

88. KPrim: Häufige Symptome von Schlaganfall?

- ☐ Erbrechen
- ☐ Sprachstörung
- ☐ Geruchsverlust
- ☐ Gesichtslähmung

89. Was gehört nicht auf die Antidot-Liste in der Apotheke

- ☐ a. N-Acetylcystein
- ☐ b. Biperiden
- ☐ c. Aktivkohle
- ☐ d. Simeticon

90. Symptome einer Hypokaliämie

- ☐ Muskelschwäche
- ☐ Heller Stuhl
- ☐ Durchfall
- ☐ Xxx

91. Notfall in der Apo: Geschwollene Lippe. Gemäss Kunde keinen Stich. Hat folgende Medis: Statin, Antidiabetikum, Lisinopril. Was könnte die Ursache sein? Es ist keine Allergie, das weiss er.

- ☐ Rhabdomyolyse
- ☐ Angioödem

92. Kunde hat BD von 209/xx mmHg. Beklagt über Kopfschmerzen und leichte Sehstörung. Was machen?

- ☐ Hausarzt
- ☐ 144 → Da Sehstörung = Endorganschaden
 - Endorganschäden sind Marker einer subklinischen, kardiovaskulären Erkrankung, und einige von ihnen sind bei guter Blutdruckkontrolle reversibel. Endorganschäden sind strukturelle oder funktionelle Alterationen in Arterien oder Endorganen wie dem Herz, der Nieren, dem Hirn oder den Augen.
- ☐ Antihypertonikum geben
- ☐ BD nachmessen

93. KPrim: Symptome eine Hyperglykämie

- ☐ Durst
- ☐ Erbrechen
- ☐ Verwirrtheit
- ☐ Müdigkeit

94. Diabetiker hat zu viel Insulin gespritzt. Hat wert von 2.9 mmol/l Kommt in Apo und ist ansprechbar. Was machen?

- ☐ 144
- ☐ Basqimi spritzen
- ☐ 10 g schnell resorbierbare KH geben und nach 15 min nochmals BZ messen
- ☐ Xx

9 Impfen

95. KPrim: Grippeimpfung wann ist es Basisimpfung

- ☐ Immunsupprimierter 55J
- ☐ Gesunder 68J Herr
- ☐ Vater eines 2mt Säugling
- ☐ 21J Rekrut

96. Venöse Blutentnahme

- muss immer die Armbeugevene gewählt werden
- wird das Blut gestaut bis der Radialispuls nicht mehr spürbar ist
- wird mit dem Schliff der Nadel nach oben im 45° Winkel in die Vene gestochen

97. Impfen: wie am wenigsten schmerzhaft/kein Brennen

- a. Nadel langsam einstechen
- b. Alkohol gut verdunsten lassen
- c. Wirkstoff schnell injizieren

98. Corona Impfung

- mRNA lagert sich ins Erbgut
- Adjuvans Aluminium
- KI Bei Immunsupprimierten
- Bei der mRNA-Impfung handelt es sich nicht um einen Lebendimpfstoff

99. Kunde Fragt ob FSME und MMR Impfung zusammen geimpft werden darf?

- Nein
- Ja aber mit 4 W Abstand
- Ja sofort
- Ja kann aber UAW Verstärken

100. Kundin hat Exanthem und Rötung (nicht juckend) im Gesicht. Hatte vor 8 Tagen letzte MMR Impfung

- Impfmasern, normal und nicht ansteckend
- Impfmasern, sofort melden und in Isolation
- Ist Rosacea abgabe von Soolantra
- Abgabe etwas anderes

101. Impfbüchli rekrut mit 2 FSME

- Grundimmunisierung noch nicht abgeschlossen 3. Impfung nachholen
- Direkt Booster
- Grundimmunsierung wieder von anfang beginnen
- Xx

102. Frau 63J will MMR Nachimpfen was machen

- Nicht nötig, wegen alter
- 1 MMR Impfung reicht
- 2 MMR Impfungen
- Xxx