

PRÁCTICA 1: CARDINALIDAD

“Llamaremos número cardinal de M al concepto general que, por medio de nuestra activa capacidad de pensar, surge del conjunto M cuando hacemos abstracción de la naturaleza y el orden de sus elementos. Denotamos el resultado de este doble acto de abstracción por \overline{M} ”
 GEORG CANTOR, 1895.

A. Propiedades básicas de los Conjuntos

Ejercicio 1. Demostrar las siguientes igualdades de conjuntos:

$$\text{i) } B \setminus \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (B \setminus A_i).$$

$$\text{ii) } B \setminus \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (B \setminus A_i).$$

$$\text{iii) } \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B) = B \cap \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right).$$

Ejercicio 2. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una familia de conjuntos y sea $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Hallar una familia de conjuntos $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que verifique simultáneamente:

1. $B_n \subseteq A_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$;
2. $B_k \cap B_j = \emptyset$ si $k \neq j$;
3. $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$.

Ejercicio 3. Sea $f : X \longrightarrow Y$ una función y sean A y B subconjuntos de X .

i) Demostrar que:

$$a) f(A \cup B) = f(A) \cup f(B).$$

$$b) f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

ii) Generalizar al caso de uniones e intersecciones infinitas.

iii) Exhibir un ejemplo donde la inclusión en (i)(b) sea estricta.

Ejercicio 4. Sean $f : X \longrightarrow Y$ una función, $A \subseteq X$ y $B, B_1, B_2 \subseteq Y$. Demostrar que:

$$\text{i) } A \subseteq f^{-1}(f(A)).$$

$$\text{ii) } f(f^{-1}(B)) \subseteq B.$$

- iii) $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$.
- iv) $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.
- v) $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.

Generalizar iv) y v) al caso de uniones e intersecciones infinitas.

Ejercicio 5. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Probar que $f(f^{-1}(B)) = B$ para cada $B \subseteq Y$ si y sólo si f es suryectiva.

Ejercicio 6. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Probar que las siguientes propiedades son equivalentes:

1. f es inyectiva;
2. $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ para todo $A, B \subseteq X$;
3. $f^{-1}(f(A)) = A$ para todo $A \subseteq X$;
4. $f(A) \cap f(B) = \emptyset$ para todo par de subconjuntos A, B tales que $A \cap B = \emptyset$;
5. $f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$ para todo $B \subseteq A \subseteq X$.

Ejercicio 7. Para cada subconjunto S de un conjunto A dado se define la *función característica de S* , $\mathcal{X}_S : A \rightarrow \{0, 1\}$, por

$$\mathcal{X}_S(a) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \in S, \\ 0 & \text{si } a \notin S. \end{cases}$$

Probar que:

- i) $\mathcal{X}_{S \cap T} = \mathcal{X}_S \cdot \mathcal{X}_T$ para todo par de subconjuntos $S, T \subseteq A$.
- ii) $\mathcal{X}_{A \setminus S} = 1 - \mathcal{X}_S$ para todo $S \subseteq A$.
- iii) $\mathcal{X}_S + \mathcal{X}_T = \mathcal{X}_{S \cup T} + \mathcal{X}_{S \cap T}$ para todo $S, T \subseteq A$.

Ejercicio 8. Sea A un cadena (o sea, un conjunto con un orden total) y sea B un conjunto parcialmente ordenado. Sea $f : A \rightarrow B$ una función inyectiva para la cual si $a, b \in A$ y $a \leq b$, entonces $f(a) \leq f(b)$. Probar que $f(a) \leq f(b)$ implica $a \leq b$.

Ejercicio 9. Sea \sim una relación de equivalencia sobre un conjunto A . Para cada $a \in A$ se define el conjunto $S_a = \{b \in A : a \sim b\}$. Probar que:

- i) Para todo par de elementos $a_1, a_2 \in A$ vale: $S_{a_1} = S_{a_2}$ o $S_{a_1} \cap S_{a_2} = \emptyset$.
- ii) $A = \bigcup_{a \in A} S_a$.

B. Cardinalidad

“Lo peligroso, equívoco de la idea ‘los números reales no pueden ordenarse en una serie’ reside en que hace que lo que es una determinación conceptual, una formación conceptual, aparezca como un hecho natural”

LUDVIG WITTGENSTEIN, *Observaciones sobre los fundamentos de la matemática*.

“Je le vois, mais je ne le crois pas!”

Carta de CANTOR a DEDEKIND sobre la biyección entre los puntos del segmento unitario y el espacio n -dimensional.

Ejercicio 10. Demostrar que si A es un conjunto de n elementos, entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.

Ejercicio 11. Sea A un conjunto. Probar que son equivalentes:

1. A es infinito (*i.e.* tiene un subconjunto en biyección con \mathbb{N});
2. para todo $x \in A$, existe una función $f_x : A \rightarrow A \setminus \{x\}$ biyectiva;
3. para todo $\{x_1, \dots, x_n\} \subset A$, existe una función $f_{\{x_1, \dots, x_n\}} : A \rightarrow A \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$ biyectiva.

Ejercicio 12. Sea A un conjunto numerable. Supongamos que existe una función sobreyectiva de A en un conjunto B . Probar que B es a lo sumo numerable.

Ejercicio 13. Probar que los siguientes conjuntos son numerables (es decir, tienen cardinal \aleph_0):

$$\mathbb{Z}_{\leq -1} \quad ; \quad \mathbb{Z}_{\geq -3} \quad ; \quad 3\mathbb{N} \quad ; \quad \mathbb{Z} \quad ; \quad \mathbb{N}^2 \quad ; \quad \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \quad ; \quad \mathbb{Q} \quad ; \quad \mathbb{N}^m \quad (m \in \mathbb{N}).$$

Ejercicio 14.

- i) Sean A y B conjuntos contables. Probar que $A \cup B$ es contable.
- ii) Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una familia de conjuntos contables. Probar que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ es contable.
- iii) Sea \mathcal{A} un conjunto finito y $\mathcal{S} = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \mathcal{A}^m$. Probar que $\sharp(\mathcal{S}) = \aleph_0$.

Deducir que, cualquiera sea el alfabeto utilizado, hay más números reales que palabras para nombrarlos. ¿Cuántos subconjuntos de \mathbb{N}^2 pueden ser definidos en un lenguaje fijo? ¿Cuántos hay en total?

Ejercicio 15. Sean A y B conjuntos disjuntos, A infinito y B numerable. Probar que:

- i) Existe una biyección entre $A \cup B$ y A .
- ii) Si A no es numerable y $B \subseteq A$, entonces existe una biyección entre $A \setminus B$ y A . ¿Es numerable el conjunto $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$?

Ejercicio 16. Probar que el conjunto de todos los polinomios con coeficientes racionales es numerable.

Ejercicio 17. Se dice que un número complejo z es *algebraico* si existen enteros a_0, \dots, a_n no todos nulos, tales que

$$a_0 + a_1 z + \dots + a_{n-1} z^{n-1} + a_n z^n = 0.$$

- i) Demostrar que el conjunto de todos los números algebraicos es numerable.
- ii) Deducir que existen números reales que no son algebraicos.

NOTA: Estos números se llaman *trascendentes*.

Ejercicio 18. Sea $X \subseteq \mathbb{R}_{>0}$ un conjunto de números reales positivos. Supongamos que existe una constante positiva C tal que para cualquier subconjunto finito $\{x_1, \dots, x_n\} \subset X$ vale $\sum_{i=1}^n x_i \leq C$. Probar que X es contable.

Ejercicio 19. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función monótona. Probar que:

$$\#(\{x \in \mathbb{R} : f \text{ no es continua en } x\}) \leq \aleph_0.$$

Ejercicio 20. Probar que si A es un conjunto numerable, el conjunto de las partes finitas de A (es decir, el subconjunto de $\mathcal{P}(A)$ formado por los subconjuntos finitos de A) es numerable.

Ejercicio 21. Hallar el cardinal de los siguientes conjuntos de sucesiones:

- i) $\{(a_n) : a_n \in \mathbb{N} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$.
- ii) $\{(a_n) \subset \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$.
- iii) $\{(a_n) \subset \mathbb{N} : a_n \geq a_{n+1} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$.
- iv) $\{(q_n) \subset \mathbb{Q} : \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = 0\}$.
- v) $\{(q_n) \subset \mathbb{Q} : (q_n) \text{ es periódica}\}$.
- vi) $\{(a_n) \subset \mathbb{N} : 1 \leq a_n \leq m \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\} \quad (m \in \mathbb{N})$.

Ejercicio 22. Hallar el cardinal de los siguientes conjuntos:

- i) $\{I : I \text{ es un intervalo de extremos racionales}\}$.
- ii) $\{[a, b] : a, b \in \mathbb{R}\}$.
- iii) I , sabiendo que $\{A_i\}_{i \in I} \subset \mathbb{R}$ es una familia de intervalos disjuntos.
- iv) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x + 2y \geq 7\}$.
- v) $\mathbb{R}_{>0}$.

Ejercicio 23. Probar que la unión numerable de conjuntos de cardinal c tiene cardinal c .

Ejercicio 24. Sean a, b, c cardinales. Probar que:

- i) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.
- ii) $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$.
- iii) $(a^b)^c = a^{bc}$.
- iv) $(ab)^c = a^c \cdot b^c$.
- v) Si $b \leq c$, entonces $a^b \leq a^c$ y $b^a \leq c^a$.

Ejercicio 25. Probar que $n^{\aleph_0} = \aleph_0^{\aleph_0} = c^{\aleph_0} = c$ cualquiera sea $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$.

Ejercicio 26. Mostrar que \mathbb{R} es unión disjunta de c conjuntos de cardinal c .

Ejercicio 27. Se consideran los siguientes conjuntos de funciones:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(\mathbb{R}) &= \{f \mid f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\}; & \mathcal{F}(\mathbb{Q}) &= \{f \mid f: \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}\}; \\ \mathcal{C}(\mathbb{R}) &= \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) \mid f \text{ es continua}\}; & \mathcal{C}(\mathbb{Q}) &= \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{Q}) \mid f \text{ es continua}\}.\end{aligned}$$

- i) Probar que $\#(\mathcal{F}(\mathbb{R})) > c$.
- ii) Calcular $\#(\mathcal{F}(\mathbb{Q}))$.
- iii) Calcular $\#(\mathcal{C}(\mathbb{Q}))$.
- iv) Probar que la función $\phi: \mathcal{C}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}(\mathbb{Q})$ dada por $\phi(f) = f|_{\mathbb{Q}}$ es inyectiva. ¿Qué significa esto?
- v) Calcular $\#(\mathcal{C}(\mathbb{R}))$.

Ejercicio 28. Probar que el conjunto de partes numerables de \mathbb{R} (es decir, el subconjunto de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ formado por todos los subconjuntos numerables de \mathbb{R}) tiene cardinal c .

C. Lema de Zorn y Axioma de Elección

“Una de las implicancias del proyecto de Kronecker era que él consideraba una definición aceptable solo si podía ser chequeado en un número finito de pasos si un número dado la cumplía o no. Este punto de vista lo llevó a una crítica de las demostraciones de existencia “puras”(no constructivas). El sostenía que una prueba de existencia de un número solo podía considerarse correcta si daba un método para encontrarlo.”
TROESTRA Y VAN DALEN.

“Das ist nicht Mathematik. Das ist Theologie.”
P.GORDAN sobre el la demostración de D.HILBERT de su teorema de la base.

Ejercicio 29. Sean $A, B \neq \emptyset$. Probar que o bien existe $f : A \rightarrow B$ inyectiva, o bien existe $g : B \rightarrow A$ inyectiva (es decir $\#A \leq \#B$ o $\#B \leq \#A$).

Ejercicio 30. Sean V un \mathbb{R} -espacio vectorial y $S \subseteq V$ un subespacio. Sea $T: S \rightarrow \mathbb{R}$ una transformación lineal. Probar que T se puede extender a todo el espacio, es decir, que existe $\tilde{T}: V \rightarrow \mathbb{R}$ lineal tal que $\tilde{T}|_S \equiv T$.

Ejercicio 31. Probar que todo conjunto linealmente independiente se puede extender a una base.

Ejercicio 32. Probar que de todo sistema de generadores se puede extraer una base.

Ejercicio 33. Probar que existe una aplicación suryectiva $f : X \rightarrow Y$ si y sólo si existe $g : Y \rightarrow X$ inyectiva (es decir que $\#X \geq \#Y$ si y sólo si $\#Y \leq \#X$).