

1 - Categoria de usuário ☐ HIV/AIDS - Adulto ☐ HIV/AIDS - Adolescente ☐ HIV/AIDS - Gestante IG: _____ Semanas Dt desfecho da gestação: ____/____/____2 - Serviço de atendimento* ☐ Serviço Especializado ☐ CTA ☐ Atenção Primária ☐ Internação Hospitalar3 - Origem do acompanhamento médico:* ☐ Público ☐ Privado

4 - CPF* _____

5 - Nome Completo do Usuário - Civil*

6 - Nome Social

7 - Último exame de Carga Viral em cópias/mL

☐ <50 ☐ 50 - 199 ☐ 200 - 499 ☐ 500 - 1000 ☐ >1000

Data do exame ____/____/____

8 - Exame realizado na rede:

☐ Pública ☐ Privada

9 - Início de tratamento?*

☐ Sim ☐ Não

10 - Manter TARV anterior?

☐ Sim ☐ Não

11 - Paciente coinfectado?

☐ TB ☐ Hepatite B ☐ Hepatite C

12 - Motivo para mudança na terapia antirretroviral (TARV)

☐ Falha virológica☐ Resistência a inibidor da integrase☐ Reação(ões) adversa(s) a(os) ARV _____☐ Falta de medicamento ☐ Coinfecção HIV-TB☐ Terapia dupla - Falha prévia ☐ Sim ☐ Não☐ Gestação☐ Reintrodução após interrupção de tratamento☐ Outro – especificar: _____13 - Contraindicação ao uso de esquema com Dolutegravir: ☐ Toxicidade

14 - Contraindicação à dose fixa combinada com TDF e/ou necessidade de ajuste da dose do 3TC devido à:

☐ Alteração na função renal ☐ Osteopenia/osteoporose15 - Indicação de DRV/r 600/100 mg: ☐ Gestante ☐ Apresenta mutação ao DRV ☐ Falha prévia com IP sem RTV16 - Indicação de TAF (Coinfecção HIV-HBV): ☐ Alteração na função renal ☐ Osteopenia/osteoporose

17 - Indicação de esquema com Dolutegravir dose dobrada:

☐ Rifampicina☐ Fenitoína☐ Etravirina sem Inibidor da Protease☐ Oxicarbazepina☐ Carbamazepina☐ Fenobarbital☐ Resistência a Inibidor da Integrase

18 - ARV de uso restrito

☐ Autorizado pela Câmara Técnica

19 - Medicamentos ARV (Preencher no quadrículo a QUANTIDADE de comp/caps/mL que deve ser usada diariamente)

Esquema inicial preferencial (1ª linha adulto)

☐ Tenofovir 300mg (TDF) / Lamivudina 300mg (3TC) "2 em 1" + Dolutegravir 50mg (DTG)

Inibidores da Transcriptase Reversa Análogos de Nucleosídeos/ Nucleotídeos (ITRN/ITRNT)	Tenofovir/Lamivudina	comp. de 300mg + 300mg/dia	
	Zidovudina/Lamivudina	comp. de 300mg + 150mg/dia	
	Abacavir - ABC	comp. de 300mg/dia	
	Lamivudina - 3TC	comp. de 150mg/dia	mL de sol. oral 10mg/mL /dia
	Tenofovir - TDF	comp. de 300mg/dia	
	Tenofovir Alafenamida(TAF)	comp. de 25mg/dia	Uso exclusivo para paciente coinfectado HIV/HBV
	Zidovudina - AZT	caps. de 100mg/dia	solução injetável 10 mg/mL/dia
Inibidores da Transcriptase Reversa Não Análogos de Nucleosídeos (ITRNN)	Efavirenz - EFV	comp. de 600mg/dia	
	Nevirapina - NVP	comp. de 200mg/dia	
Inibidores da Protease (IP)	Darunavir - DRV	comp. de 800mg/dia	comp. de 600mg/dia
	Atazanavir - ATV	caps. de 300mg/dia	
	Ritonavir - RTV	comp. de 100mg/dia	envelope/dia
Inibidores da integrase (INI)	Dolutegravir - DTG	comp. de 50mg/dia	
	Raltegravir - RAL	comp. de 400mg/dia	
DFC – Dolutegravir/ Lamivudina		comp. de 50mg + 300mg/dia	
DFC "3 em 1" - Tenofovir/Lamivudina/Efavirenz		comp. de 300mg + 300mg + 600mg/dia	

Medicamentos de uso restrito

Enfuvirtida - T-20	Frasco-amp. de 90mg/mL/dia	Etravirina - ETR	comp. de 200mg/dia	Fostemsavir - FTR	comp. de 600mg/dia	Maraviroque - MVQ	comp. de 150mg/dia
--------------------	----------------------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

20 - Prescritor

UF: _____ CRM: _____

Data: ____/____/____

RMS: _____

(Carimbo e assinatura)

21 - Recibo (para preenchimento exclusivo da UDM)

Este formulário tem a validade de 180 dias

1ª dispensação	4ª dispensação
Data: ____/____/____	Data: ____/____/____
Dispensação para ____ dias	Dispensação para ____ dias
(Assinatura do farmacêutico)	(Assinatura do farmacêutico)
(Assinatura do usuário)	(Assinatura do usuário)
2ª dispensação	5ª dispensação
Data: ____/____/____	Data: ____/____/____
Dispensação para ____ dias	Dispensação para ____ dias
(Assinatura do farmacêutico)	(Assinatura do farmacêutico)
(Assinatura do usuário)	(Assinatura do usuário)
3ª dispensação	6ª dispensação
Data: ____/____/____	Data: ____/____/____
Dispensação para ____ dias	Dispensação para ____ dias
(Assinatura do farmacêutico)	(Assinatura do farmacêutico)
(Assinatura do usuário)	(Assinatura do usuário)

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Os campos com * são de preenchimento obrigatório.
- As alternativas com ícone ☐ indicam que uma única resposta é possível.
- As alternativas com ícone ☐ indicam que mais de uma resposta é possível (múltipla escolha)

Janeiro 2025

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

- 01. Categoria de Usuário:** HIV/AIDS Adulto, Adolescentes (>e igual 12 anos) e Gestante HIV+ (mulheres grávidas no momento da dispensação). No caso de Gestante HIV+, informar a idade gestacional (IG: número de semanas de gestação) e posterior data do desfecho da gestação (parto ou aborto). Alterar a categoria de usuário após o desfecho.
- 02. Serviço de atendimento:** Serviço especializado (serviços de referência, SAE, CRT), CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento); Atenção Primária (unidades básicas, unidades de atenção primária públicas ou privadas, clínicas da família); Internação Hospitalar (usuário internado ou prescrição de alta). **(preenchimento obrigatório).**
- 03. Origem do acompanhamento médico:** Especificar se o receituário é de origem de estabelecimentos privados/planos de saúde ou do SUS. **(preenchimento obrigatório).**
- 04. CPF:** O preenchimento do CPF corretamente é obrigatório, salvo situações como: estrangeiros, pessoa em situação de rua no momento, pessoa privada de liberdade no momento, indígena. **(preenchimento obrigatório).**
- 05. Nome Completo do(a) Usuário(a) – Civil:** Nome completo do(a) usuário(a) SUS, sem qualquer abreviação, conforme documento de identidade oficial. **(preenchimento obrigatório).**
- 06. Nome social:** De acordo com o Decreto 8.727/2016, é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Preencher apenas para os(as) usuários(as) que possuírem nome social divergente do nome de registro.
- 07. Último exame de carga viral:** Informar o valor do último exame de carga viral, a data de realização e o local onde foi realizado.
- 08. Exame realizado na rede:** Se o exame de carga viral foi realizado na rede pública ou privada.
- 09. Início de tratamento?** Situação em que o Usuário SUS iniciará tratamento antirretroviral (ARV) no referido mês. **(preenchimento obrigatório).**
- 10. Manter esquema ARV anterior:** Caso seja marcada a opção sim, os campos de 12 ao 19 não precisarão ser preenchidos.
- 11. Paciente Coinfectado:** Informar se a PVHA apresenta coinfeção HIV com TB, Hepatite B ou Hepatite C.

Recomendação de esquema e dose de Dolutegravir na coinfeção TB-HIV	
Durante o uso de rifampicina para tratamento da tuberculose	Tratamento Preferencial
	TDF+3TC (300mg/300mg) - 01 cp ao dia DTG (50mg) – 01 cp de 12/12h Manter a dosagem de DTG 12/12h até 15 dias após a conclusão do tratamento tuberculostático.
	Tratamento Alternativo
	TDF + 3TC+EFV (300/300/600mg) -01cp ao dia Coletar exame de genotipagem e iniciar o esquema imediatamente após a coleta.

- 12. Motivo para mudança no tratamento antirretroviral:** Toda mudança de tratamento deverá ser justificada por: Falha virológica, Falta de Medicamento, Resistência ao inibidor da integrase, Coinfeção com tuberculose, Gestação, Terapia dupla, Reintrodução após interrupção de tratamento, Reação(ões) adversa(s) a(os) ARV (informar sigla do ARV) ou outro (especificar o motivo).
- 13. Contraindicação ao uso de esquema com Dolutegravir:** Marcar a opção que contraindica Dolutegravir 50 mg/dia..

Situação	Esquema antirretroviral
Esquema preferencial	TDF/3TC + DTG
Intolerância ou contraindicação a DTG 50 mg/dia	Substituir DTG por DRV/r ou EFV
Intolerância ou contraindicação a TDF	Substituir TDF por ABC (em caso de teste HLA-B*5701 negativo) ou por AZT

- 14. Contraindicação à dose fixa combinada com TDF e/ou necessidade de ajuste da dose do 3TC devido à:** Informar o motivo: alteração da função renal ou osteopenia/osteoporose.
- 15. Indicação de DRV/r 600mg + 100mg (12/12 horas):** Apenas para pessoas com mutações que confirmam resistência para o Darunavir: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, T74P, L76V, I84V ou L89V. Gestante ou PVHIV com histórico de falha previa a IP sem reforço do Ritonavir.
- 16. Indicação de TAF:** marcar esse campo se PVHA com coinfeção HIV-HBV e contraindicação ao TDF.
- 17. Indicação de esquema com Dolutegravir dose dobrada:** Marcar a opção que justifica a dose dobrada do Dolutegravir.
- 18. ARV de uso restrito:** marcar caso o esquema tenha sido aprovado pela câmara técnica.
- 19. Medicamentos ARV:** Lista dos ARV oferecidos pelo SUS. O prescriptor deverá assinalar um “x” no esquema preferencial ou para os demais ARV, informar a quantidade prescrita ao Usuário.
- 20. Prescritor:** Assinatura, data e CRM ou RMS do médico responsável. Para assinatura digital ver anexo 1 do Ofício Circular nº 13/20/CGAHV/DCCI/SVS/MS.
- 21. Recibo:** Assinatura do usuário e data acusando o recebimento do medicamento naquela dispensação. Informar o número de dias da dispensação atual para realizar o cálculo do saldo de dias para a próxima retirada de medicamento.

ESTE FORMULÁRIO TEM A VALIDADE DE 180 DIAS

Esquemas ou ARV com necessidade de aprovação por CT:	
Medicamentos de uso restrito	ARV para esquemas de 3ª linha
Início de tratamento com esquemas que não incluam 2 ITRN	DRV/r 600mg + 100mg para adultos, não gestantes e sem presença de mutações para o Darunavir
Esquema com DRV/r + DTG para pessoas com carga viral suprimida	