

Chương I

Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Mở đầu. Xét bài toán cổ sau:

Quýt, cam mười bảy quả tươi

Đem chia cho một trăm người cùng vui.

Chia ba mỗi quả quýt rồi,

Còn cam, mỗi quả chia mười vừa xinh.

Trăm người, trăm miếng ngọt lành.

Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?

Trong bài toán này có hai đại lượng chưa biết (số cam và số quýt). Vậy ta có thể giải bài toán đó tương tự “giải bài toán bằng cách lập phương trình” được hay không? Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

I. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Gọi x là số cam, y là số quýt (với x, y nguyên dương).

Hoạt động 1. Câu “Quýt, cam mười bảy quả tươi” có nghĩa là tổng số cam và số quýt là 17. Hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết này.

Hoạt động 2. Tương tự, hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết cho bởi các câu thơ thứ ba, thứ tư và thứ năm.

Các hệ thức nhận được trong HĐ1, HĐ2 là những ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn.

Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng

$$ax + by = c \quad (1)$$

trong đó a , b và c là các số đã biết ($a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$).

Nếu tại $x = x_0$ và $y = y_0$ ta có $ax_0 + by_0 = c$ là một khẳng định đúng thì cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một nghiệm của phương trình (1).

Luyện tập 1. Hãy viết một phương trình bậc nhất hai ẩn và chỉ ra một nghiệm của nó.

Mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn đều có vô số nghiệm.

Luyện tập 2. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

- a) $2x - 3y = 5$;
- b) $0x + y = -3$;
- c) $x + 0y = -2$.

II. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Trong HD1 và HD2, bài toán mở đầu dẫn đến hai phương trình bậc nhất hai ẩn là $x + y = 17$ và $10x + 3y = 100$. Để giải bài toán, ta cần tìm các giá trị của x và y đồng thời thỏa mãn cả hai phương trình này.

Một cặp gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ và $a'x + b'y = c'$ được gọi là một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Ta thường viết hệ phương trình đó dưới dạng

$$\begin{cases} ax + by = c, \\ a'x + b'y = c'. \end{cases} \quad (*)$$

Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một nghiệm của hệ (*) nếu nó đồng thời là nghiệm của cả hai phương trình của hệ (*).

Mỗi nghiệm của hệ (*) chính là một nghiệm chung của hai phương trình của hệ (*).

Luyện tập 3. Trong hai cặp số $(0; -2)$ và $(2; -1)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x - 2y = 4, \\ 4x + 3y = 5 \end{cases} ?$$

Vận dụng. Xét bài toán cổ trong Tình huống mở đầu. Gọi x là số cam, y là số quýt cần tính ($x, y \in \mathbb{N}^*$), ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

$$\begin{cases} x + y = 17, \\ 10x + 3y = 100. \end{cases}$$

Trong hai cặp số $(10; 7)$ và $(7; 10)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình trên? Từ đó cho biết một phương án về số cam và số quýt thỏa mãn yêu cầu của bài toán cổ.

BÀI TẬP

1.1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn, vì sao?

- a) $5x - 8y = 0$;
- b) $4x + 0y = -2$;
- c) $0x + 0y = 1$;
- d) $0x - 3y = 9$.

1.2. a) Tìm giá trị thích hợp thay cho dấu “?” trong bảng sau rồi cho biết 6 nghiệm của phương trình $2x - y = 1$:

x	-1	-0,5	0	0,5	1	2
$y = 2x - 1$	?	?	?	?	?	?

b) Viết nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.

1.3. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

- a) $2x - y = 3$;
- b) $0x + 2y = -4$;
- c) $3x + 0y = 5$.

1.4. a) Hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x = -6, \\ 5x + 4y = 1 \end{cases}$$

có là một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn không, vì sao?

b) Cặp số $(-3; 4)$ có là một nghiệm của hệ phương trình đó hay không, vì sao?

1.5. Cho các cặp số $(-2; 1)$, $(0; 2)$, $(1; 0)$, $(1,5; 3)$, $(4; -3)$ và hai phương trình

$$5x + 4y = 8, \quad (1)$$

$$3x + 5y = -3. \quad (2)$$

Trong các cặp số đã cho:

a) Những cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)?

b) Cặp số nào là nghiệm của hệ hai phương trình gồm (1) và (2)?

c) Vẽ hai đường thẳng $5x + 4y = 8$ và $3x + 5y = -3$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ để minh họa kết luận ở câu b.



LUYỆN TẬP

1.1. Giả sử $(x; y)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $4x - 2y = 6$.

a) Hoàn thành bảng sau đây:

x	-2	-1	0	1	2
y	?	?	?	?	?

Từ đó suy ra 5 nghiệm của phương trình đã cho.

b) Biểu diễn y theo x . Từ đó cho biết phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm?

1.2. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $3x - 2y = 5$;

b) $0x + 2y = 4$;

c) $2x + 0y = -3$.

1.3. Cho phương trình bậc nhất hai ẩn $mx + y = -2$.

- Xác định m để cặp số $(1; -2)$ là một nghiệm của phương trình đã cho.
- Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình với m tìm được ở câu a.

1.4. Bác Hương bán hàng tạp hóa và có (dư nhiều) các tờ tiền loại 2 nghìn đồng và 5 nghìn đồng. Bác cần trả lại cho một người mua hàng 25 nghìn đồng.

- Gọi x là số tờ tiền loại 2 nghìn đồng, y là số tờ tiền loại 5 nghìn đồng mà bác Hương cần trả lại cho khách ($x, y \in \mathbb{N}$). Hãy lập phương trình bậc nhất hai ẩn đối với x và y .
- Hãy chỉ ra một nghiệm $(x; y)$ với $x, y \in \mathbb{N}$ của phương trình lập ở câu a để tìm một phương án trả lại tiền thừa cho khách giúp bác Hương.

1.5. Một đội công nhân cần phải lắp đường ống dẫn nước trên một đoạn phố thẳng dài 65 m. Có hai loại ống dài 3 m và 5 m. Hãy chỉ ra ít nhất hai phương án lắp ống để không cần phải cắt ống ra (coi rằng các mối nối là không đáng kể).

1.6. Cho các cặp số: $(-2; 2)$, $(1; 1)$, $(4; 1)$, $(8; -2)$ và hai phương trình:

$$x + 3y = 4 \quad (1)$$

$$2x - 5y = -3. \quad (2)$$

- Những cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)?
- Cặp số nào là nghiệm của hệ hai phương trình (1) và (2)?
- Vẽ hai đường thẳng $d : x + 3y = 4$ và $d' : 2x - 5y = -3$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ để minh họa kết quả câu b.

1.7. Tìm a và b để hai phương trình $ax - 2y = 1$ và $x + by = 3$ nhận cặp số $(1; -2)$ làm nghiệm chung.

1.8. Bằng cách vẽ các đường thẳng thích hợp trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy tìm nghiệm của mỗi hệ phương trình sau:

a)
$$\begin{cases} 2x = -4, \\ 3x - y = 5; \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x - 2y = 4, \\ 2y = -3. \end{cases}$$



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ

- Phương pháp thế
- Phương pháp cộng đại số

Kiến thức, kĩ năng

Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số hoặc sử dụng máy tính cầm tay.

Một mảnh vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số cây cải bắp. Hãy tính số cây cải bắp được trồng trên mảnh vườn đó, biết rằng:

- Nếu tăng thêm 8 luống, nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây cải bắp thì số cải bắp của cả vườn sẽ ít đi 108 cây;
- Nếu giảm đi 4 luống, nhưng mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây thì số cải bắp cả vườn sẽ tăng thêm 64 cây.

I. PHƯƠNG PHÁP THẾ**Làm quen với phương pháp thế**

HD1 Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - 3y = 1. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình theo hướng dẫn sau:

1. Từ phương trình thứ nhất, biểu diễn y theo x rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình với một ẩn x . Giải phương trình một ẩn đó để tìm giá trị của x .
2. Sử dụng giá trị tìm được của x để tìm giá trị của y rồi viết nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế:

- **Bước 1.** Từ một phương trình của hệ, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.
- **Bước 2.** Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho.

Ví dụ 1 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

bằng phương pháp thế.

Giải

Từ phương trình thứ nhất của hệ ta có $y = 2x - 3$. Thế vào phương trình thứ hai của hệ, ta được $x + 2(2x - 3) = 4$ hay $5x - 6 = 4$, suy ra $x = 2$.

Từ đó $y = 2 \cdot 2 - 3 = 1$. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(2; 1)$.

Luyện tập 1 Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a)
$$\begin{cases} x - 3y = 2 \\ -2x + 5y = 1; \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 4x + y = -1 \\ 7x + 2y = -3. \end{cases}$$

Tuỳ theo hệ phương trình, ta có thể lựa chọn cách biểu diễn x theo y hoặc biểu diễn y theo x .

Ví dụ 2 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y = -2 \\ 2x - 2y = 8 \end{cases}$$

bằng phương pháp thế.

Giải

Từ phương trình thứ nhất ta có $x = y - 2$. Thế vào phương trình thứ hai, ta được $2(y - 2) - 2y = 8$ hay $0y - 4 = 8$. (1)

Do không có giá trị nào của y thoả mãn hệ thức (1) nên hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Luyện tập 2 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} -2x + y = 3 \\ 4x - 2y = -4 \end{cases}$$

bằng phương pháp thế.

Ví dụ 3 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} -x + y = -2 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$$

bằng phương pháp thế.

Giải

Từ phương trình thứ nhất ta có $y = x - 2$. (2)

Thế vào phương trình thứ hai, ta được $3x - 3(x - 2) = 6$ hay $0x = 0$. (3)

Ta thấy mọi giá trị của x đều thoả mãn hệ thức (3).

Với giá trị tuỳ ý của x , giá trị tương ứng của y được tính bởi (2).

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(x; x - 2)$ với $x \in \mathbb{R}$ tuỳ ý.

Luyện tập 3 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 3y = -1 \\ 3x + 9y = -3 \end{cases}$$

bằng phương pháp thế.

Vận dụng 1 Xét bài toán trong tình huống mở đầu. Gọi x là số luống trong vườn, y là số cây cải bắp trồng ở mỗi luống ($x, y \in \mathbb{N}^*$).

- Lập hệ phương trình đối với hai ẩn x, y .
- Giải hệ phương trình nhận được ở câu a để tìm câu trả lời cho bài toán.

II. PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ**Làm quen với phương pháp cộng đại số**

HD2 Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x + 2y = 3 \\ x - 2y = 6. \end{cases}$$

Ta thấy hệ số của y trong hai phương trình là hai số đối nhau (tổng của chúng bằng 0). Từ đặc điểm đó, hãy giải hệ phương trình đã cho theo hướng dẫn sau:

- Cộng từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình một ẩn x . Giải phương trình này để tìm x .
- Sử dụng giá trị x tìm được, thay vào một trong hai phương trình của hệ để tìm giá trị của y rồi viết nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số:

Để giải một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau, ta có thể làm như sau:

- Bước 1.** Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.
- Bước 2.** Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Ví dụ 4 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} -2x + 5y = 12 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$$

bằng phương pháp cộng đại số.

Giải

Cộng từng vế hai phương trình ta được $8y = 16$, suy ra $y = 2$.

Thế $y = 2$ vào phương trình thứ hai ta được $2x + 3 \cdot 2 = 4$, hay $2x = -2$, suy ra $x = -1$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(-1; 2)$.

Ví dụ 5 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 5x - 7y = 9 \\ 5x - 3y = 1 \end{cases}$$

bằng phương pháp cộng đại số.

Giải

Trừ từng vế của hai phương trình, ta được $(5x - 5x) + (-7y + 3y) = 9 - 1$ hay $-4y = 8$, suy ra $y = -2$.

Thế $y = -2$ vào phương trình thứ nhất, ta được $5x - 7 \cdot (-2) = 9$ hay $5x + 14 = 9$, suy ra $x = -1$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(-1; -2)$.

Luyện tập 4 Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

a)
$$\begin{cases} -4x + 3y = 0 \\ 4x - 5y = -8; \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 4x + 3y = 0 \\ x + 3y = 9. \end{cases}$$

Chú ý. Trường hợp trong hệ phương trình đã cho không có hai hệ số của cùng một ẩn bằng nhau hay đối nhau, ta có thể đưa về trường hợp đã xét bằng cách nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (khác 0).

Ví dụ 6 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$$

bằng phương pháp cộng đại số.

Giải

Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3 và nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được:

$$\begin{cases} 9x + 6y = 21 \\ 4x - 6y = -8. \end{cases}$$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được $13x = 13$ hay $x = 1$.

Thế $x = 1$ vào phương trình thứ nhất của hệ đã cho, ta có $3 \cdot 1 + 2y = 7$, suy ra $y = 2$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(1; 2)$.

Luyện tập 5 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 4x + 3y = 6 \\ -5x + 2y = 4 \end{cases}$$

bằng phương pháp cộng đại số.

Ví dụ 7 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x - 5y = 2 \\ -6x + 10y = -4 \end{cases}$$

bằng phương pháp cộng đại số.

Giải

Chia hai vế của phương trình thứ hai cho 2, ta được hệ

$$\begin{cases} 3x - 5y = 2 \\ -3x + 5y = -2. \end{cases}$$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới ta có $0x + 0y = 0$. Hệ thức này luôn thoả mãn với các giá trị tùy ý của x và y .

Với giá trị tùy ý của x , giá trị của y được tính nhờ hệ thức $3x - 5y = 2$, suy ra $y = \frac{3}{5}x - \frac{2}{5}$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $\left(x; \frac{3}{5}x - \frac{2}{5}\right)$ với $x \in \mathbb{R}$.

Luyện tập 6 Bằng phương pháp cộng đại số, giải hệ phương trình

$$\begin{cases} -0,5x + 0,5y = 1 \\ -2x + 2y = 8. \end{cases}$$

III. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY ĐỂ TÌM NGHIỆM CỦA HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Cách tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay

Muốn tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay (MTCT), chúng ta cần sử dụng loại máy có chức năng này (thường có phím MODE).

Trước hết ta phải viết hệ phương trình cần tìm nghiệm dưới dạng:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Chẳng hạn để tìm nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 2x + 3y - 4 = 0 \\ 5x + 6y - 7 = 0 \end{cases}$$

ta viết nó dưới dạng

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 5x + 6y = 7. \end{cases}$$

Khi đó, ta có $a_1 = 2, b_1 = 3, c_1 = 4; a_2 = 5, b_2 = 6$ và $c_2 = 7$. Lần lượt thực hiện các bước sau (với máy tính thích hợp):

Bước 1. Vào chức năng giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách bấm các phím $\text{MODE } 5 \ 1$ (xem màn hình sau bước 1, con trỏ ở vị trí a_1).

Bước 2. Nhập các hệ số $a_1 = 2, b_1 = 3, c_1 = 4; a_2 = 5, b_2 = 6$ và $c_2 = 7$ bằng cách bấm: $2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 =$ (xem màn hình sau bước 2).

Bước 3. Đọc kết quả: Sau khi kết thúc bước 2, bấm phím $=$, màn hình cho $x = -1$; bấm tiếp phím $=$, màn hình cho $y = 2$ (xem màn hình sau bước 3). Ta hiểu nghiệm của hệ phương trình là $(-1; 2)$.

Chú ý

1. Muốn xoá số vừa mới nhập thì bấm phím AC ; muốn thay đổi số đã nhập ở một vị trí nào đó thì di chuyển con trỏ đến vị trí đó rồi nhập số mới.
2. Bấm phím $\triangle$ hay ∇ để chuyển đổi hiển thị các giá trị của x và y trong kết quả.
3. Nếu máy báo “Infinite Sol” thì hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm. Nếu máy báo “No-Solution” thì hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Thực hành Dùng MTCT thích hợp để tìm nghiệm của các hệ phương trình sau:

- a) $\begin{cases} 2x + 3y = -4 \\ -3x - 7y = 13; \end{cases}$
- b) $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ -x - 1,5y = 1; \end{cases}$
- c) $\begin{cases} 8x - 2y - 6 = 0 \\ 4x - y - 3 = 0. \end{cases}$

Vận dụng 2 Thực hiện lần lượt các yêu cầu sau để tính số mililit dung dịch acid HCl nồng độ 20% và số mililit dung dịch acid HCl nồng độ 5% cần dùng để pha chế 2 lít dung dịch acid HCl nồng độ 10%.

- a) Gọi x là số mililit dung dịch acid HCl nồng độ 20%, y là số mililit dung dịch acid HCl nồng độ 5% cần lấy. Hãy biểu thị theo x và y :
 - Thể tích của dung dịch acid HCl 10% nhận được sau khi trộn lẫn hai dung dịch acid ban đầu.

- Tổng số gam acid HCl nguyên chất có trong hai dung dịch acid này.
- b) Sử dụng kết quả ở câu a, hãy lập một hệ hai phương trình bậc nhất với hai ẩn là x, y . Giải hệ phương trình này để tính số mililit cần lấy của mỗi dung dịch acid HCl ở trên.

EM CÓ BIẾT? (Đọc thêm)

Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp hình học

1. Đường thẳng $ax + by = c$

Ta đã biết một phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm; mỗi nghiệm là một cặp số $(x_0; y_0)$; mỗi cặp số lại có thể xem là tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Vậy trên mặt phẳng tọa độ, các điểm mà tọa độ của chúng là các nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn có quan hệ với nhau như thế nào?

Người ta đã chứng minh được rằng: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp tất cả các điểm có tọa độ thỏa mãn phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ tạo nên một đường thẳng. Đường thẳng đó gọi là đường thẳng $ax + by = c$. Nếu kí hiệu đường thẳng đó là Δ thì ta viết $\Delta : ax + by = c$.

- Khi $a \neq 0$ và $b \neq 0$, đường thẳng Δ trùng với đồ thị hàm số $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$;
- Khi $a = 0$ và $b \neq 0$, phương trình $ax + by = c$ có thể đưa về dạng $y = m$ (với $m = \frac{c}{b}$); Δ là đường thẳng song song hoặc trùng với trục hoành và cắt trục tung tại điểm $(0; m)$;
- Khi $a \neq 0$ và $b = 0$, phương trình $ax + by = c$ có thể đưa về dạng $x = n$ (với $n = \frac{c}{a}$); Δ là đường thẳng song song hoặc trùng với trục tung và cắt trục hoành tại điểm $(n; 0)$.

Dưới đây là một số ví dụ (Hình 1.3a, b, c):

2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng hình học

Ta đã biết, mỗi nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases} \quad (*)$$

là một nghiệm chung của hai phương trình trong hệ (*). Nghiệm chung ấy tương ứng với điểm chung của hai đường thẳng $\Delta : ax + by = c$ và $\Delta' : a'x + b'y = c'$, tức là giao điểm của Δ và Δ' . Do đó ta có thể giải hệ (*) bằng cách vẽ hai đường thẳng Δ và Δ' rồi tìm tọa độ điểm chung của chúng.

Từ đó, ta thấy chỉ có thể xảy ra 3 trường hợp:

1. Δ và Δ' cắt nhau (có một điểm chung): Hệ (*) có một nghiệm duy nhất.
2. Δ và Δ' song song với nhau (không có điểm chung): Hệ (*) vô nghiệm.
3. Δ và Δ' trùng nhau (mỗi điểm của Δ đều là điểm chung): Hệ (*) có vô số nghiệm.

Ví dụ 1 Để giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

ta làm như sau (H.1.4):

- Vẽ đường thẳng $2x - y = 3$ qua hai điểm $A(0; -3)$ và $B(1; -1)$.
- Vẽ đường thẳng $x + 2y = 4$ qua hai điểm $C(0; 2)$ và $D(4; 0)$.

Hai đường thẳng cắt nhau tại $M(2; 1)$ nên $(2; 1)$ là nghiệm duy nhất của hệ đã cho.

Ví dụ 2 Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} -x + y = 2 \\ -2x + 2y = 8 \end{cases}$$

ta thấy đường thẳng $\Delta : -x + y = 2$ là đồ thị của hàm số $y = x + 2$; đường thẳng $\Delta' : -2x + 2y = 8$ là đồ thị của hàm số $y = x + 4$ (H.1.5).

Hai đường thẳng Δ và Δ' phân biệt và có cùng hệ số góc là 1 nên chúng song song với nhau.

Do đó, hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Ví dụ 3 Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} -x + y = 2 \\ -2x + 2y = 4 \end{cases}$$

ta thấy hai đường thẳng $-x + y = 2$ và $-2x + 2y = 4$ cùng là đồ thị của hàm số $y = x + 2$ nên chúng trùng nhau. Vậy hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm.



BÀI TẬP

1.6. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a) $\begin{cases} x - y = 3 \\ 3x - 4y = 2 \end{cases} ;$

b) $\begin{cases} 7x - 3y = 13 \\ 4x + y = 2 \end{cases} ;$

c) $\begin{cases} 0,5x - 1,5y = 1 \\ -x + 3y = 2 \end{cases} .$

1.7. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

a) $\begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ 2x - 2y = 14 \end{cases} ;$

$$b) \begin{cases} 0,3x + 0,5y = 3 \\ 1,5x - 2y = 1,5 \end{cases} ;$$

$$c) \begin{cases} -2x + 6y = 8 \\ 3x - 9y = -12 \end{cases} .$$

1.8. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x - y = -3 \\ -2m^2x + 9y = 3(m + 3), \end{cases}$$

trong đó m là số đã cho. Giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau:

a) $m = -2$;

b) $m = -3$;

c) $m = 3$.

1.9. Dùng MTCT thích hợp để tìm nghiệm của các hệ phương trình sau:

$$a) \begin{cases} 12x - 5y + 24 = 0 \\ -5x - 3y - 10 = 0 \end{cases} ;$$

$$b) \begin{cases} \frac{1}{3}x - y = \frac{2}{3} \\ x - 3y = 2 \end{cases} ;$$

$$c) \begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ -x + \frac{2}{3}y = 0 \end{cases} ;$$

$$d) \begin{cases} \frac{4}{9}x - \frac{3}{5}y = 11 \\ \frac{2}{9}x + \frac{1}{5}y = -2 \end{cases}.$$



LUYỆN TẬP

1.9. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

$$a) \begin{cases} x + 2y = 8 \\ \frac{1}{2}x - y = 18 \end{cases};$$

$$b) \begin{cases} 0,2x + 0,5y = 0,7 \\ 4x + 10y = 9 \end{cases};$$

$$c) \begin{cases} -2x + 3y = 1 \\ \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}y = -\frac{1}{6} \end{cases}.$$

1.10. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

$$a) \begin{cases} 3x - 7y = -14 \\ 5x + 2y = 45 \end{cases};$$

$$b) \begin{cases} x - 0,5y = -3 \\ 2x - y = 6 \end{cases};$$

$$c) \begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ \frac{2}{3}x + y = 1 \end{cases}.$$

1.11. Dùng MTCT, tìm nghiệm của các hệ phương trình sau:

a)
$$\begin{cases} \sqrt{3}x + 3y = 1 \\ 2x - \sqrt{3}y = \sqrt{3} \end{cases} ;$$

b)
$$\begin{cases} 2,5x - 3,5y = 0,5 \\ -0,5x + 0,7y = 1 \end{cases} ;$$

c)
$$\begin{cases} \frac{x}{5} + \frac{y}{2} = 5 \\ 0,4x + y = 1 \end{cases} .$$

1.12. Tìm a và b để đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm $(4; 1)$ và $(-4; -3)$.

1.13. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 3y = 1 \\ 2x + my = 5. \end{cases}$$

a) Giải hệ với $m = 1$.

b) Chứng tỏ rằng hệ đã cho vô nghiệm khi $m = 6$.

1.14. Trong kinh tế học, đường IS là một phương trình bậc nhất biểu diễn tất cả các kết hợp thu nhập Y và lãi suất r để duy trì trạng thái cân bằng của thị trường hàng hóa trong nền kinh tế. Đường LM là một phương trình bậc nhất biểu diễn tất cả các kết hợp giữa thu nhập Y và lãi suất r duy trì trạng thái cân bằng của thị trường tiền tệ. Trong một nền kinh tế, giả sử mức thu nhập cân bằng Y (tính bằng triệu đô la) và lãi suất cân bằng r thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} 0,06Y - 5\,000r = 240 \\ 0,06Y + 6\,000r = 900. \end{cases}$$

Tìm mức thu nhập và lãi suất cân bằng.

1.15. Phương trình cung và phương trình cầu của một loại thiết bị kỹ thuật số cá nhân mới là:

Phương trình cầu: $p = 150 - 0,00001x$;

Phương trình cung: $p = 60 + 0,00002x$;

trong đó p là giá mỗi đơn vị (tính bằng đô la) và x là số lượng đơn vị sản phẩm. Tìm *điểm cân bằng* của thị trường này, tức là điểm $(p; x)$ thỏa mãn cả hai phương trình cung và cầu.

1.16. Thầy Nam dạy Toán đang thiết kế một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm hai loại câu hỏi, câu hỏi đúng/sai và câu hỏi nhiều lựa chọn. Bài kiểm tra sẽ được tính thang điểm 100, trong đó mỗi câu hỏi đúng/sai có giá trị 2 điểm và mỗi câu hỏi nhiều lựa chọn có giá trị 4 điểm. Thầy Nam muốn số câu hỏi nhiều lựa chọn gấp đôi số câu hỏi đúng/sai.

a) Gọi số câu hỏi đúng/sai là x , số câu hỏi nhiều lựa chọn là y ($x, y \in \mathbb{N}^*$). Viết hệ hai phương trình biểu thị số lượng của từng loại câu hỏi.

b) Giải hệ phương trình trong câu a để biết số lượng câu hỏi mỗi loại trong bài kiểm tra là bao nhiêu.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 0,5x + 0,6y = 0,4 \\ 0,4x - 0,9y = 1,7. \end{cases}$$

Giải

Nhân hai vế của mỗi phương trình với 10, ta được:

$$\begin{cases} 5x + 6y = 4 \\ 4x - 9y = 17. \end{cases} \quad (1)$$

Ta giải hệ (1). Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3 và nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được hệ:

$$\begin{cases} 15x + 18y = 12 \\ 8x - 18y = 34. \end{cases} \quad (2)$$


Cộng từng vế hai phương trình của hệ (2) ta được $23x = 46$, suy ra $x = 2$.

Thế $x = 2$ vào phương trình thứ nhất của hệ (1), ta được $5 \cdot 2 + 6y = 4$ hay $6y = -6$, suy ra $y = -1$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(2; -1)$.

Ví dụ 2

Tìm các hệ số x, y trong phản ứng hoá học đã được cân bằng sau:



Giải

Vì số nguyên tử của Fe và O ở cả hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 3 = 3y \\ 2x = 4y \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} y = 1 \\ x = 2y. \end{cases}$$

Giải hệ này ta được $x = 2, y = 1$.

Ví dụ 3

Tìm hai số a và b để đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm $A(-2; -1)$ và $B(2; 3)$.

Giải

Đường thẳng $y = ax + b$ đi qua điểm $A(-2; -1)$ nên $a(-2) + b = -1$ hay $-2a + b = -1$.

Tương tự, đường thẳng $y = ax + b$ đi qua điểm $B(2; 3)$ nên $a \cdot 2 + b = 3$ hay $2a + b = 3$.

Từ đó, ta có hệ phương trình với hai ẩn là a và b :

$$\begin{cases} -2a + b = -1 \\ 2a + b = 3. \end{cases}$$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ, ta được $2b = 2$, suy ra $b = 1$.

Thay $b = 1$ vào phương trình thứ nhất, ta có $-2a + 1 = -1$, suy ra $a = 1$.

Vậy với $a = 1, b = 1$ thì đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm A, B đã cho.



BÀI TẬP

1.10. Cho hai phương trình:

$$-2x + 5y = 7; \quad (1)$$

$$4x - 3y = 7. \quad (2)$$

Trong các cặp số $(2; 0)$, $(1; -1)$, $(-1; 1)$, $(-1; 6)$, $(4; 3)$ và $(-2; -5)$, cặp số nào là:

a) Nghiệm của phương trình (1)?

b) Nghiệm của phương trình (2)?

c) Nghiệm của phương trình (1) và phương trình (2)?

1.11. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a)
$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x - 2y = -1 \end{cases};$$

b)
$$\begin{cases} 0,5x - 0,5y = 0,5 \\ 1,2x - 1,2y = 1,2 \end{cases};$$

c)
$$\begin{cases} x + 3y = -2 \\ 5x - 4y = 28 \end{cases}.$$


1.12. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

a)
$$\begin{cases} 5x + 7y = -1 \\ 3x + 2y = -5 \end{cases};$$

b)
$$\begin{cases} 2x - 3y = 11 \\ -0,8x + 1,2y = 1 \end{cases};$$

$$c) \begin{cases} 4x - 3y = 6 \\ 0,4x + 0,2y = 0,8 \end{cases}.$$

1.13. Tìm các hệ số x, y trong phản ứng hoá học đã được cân bằng sau:



1.14. Tìm a và b sao cho hệ phương trình

$$\begin{cases} ax + by = 1 \\ ax + (2 - b)y = 3 \end{cases}$$

có nghiệm là $(1; -2)$.



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Kiến thức, kĩ năng

Giải một số bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bài toán. Một vật có khối lượng 124 g và thể tích 15 cm^3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng 1 cm^3 đồng nặng 8,9 g và 1 cm^3 kẽm nặng 7 g.

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Xét bài toán ở Tình huống mở đầu. Gọi x là số gam đồng, y là số gam kẽm cần tính.

HĐ1 Biểu thị khối lượng của vật qua x và y .

HĐ2 Biểu thị thể tích của vật qua x và y .

HĐ3 Giải hệ gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn x, y nhận được ở HĐ1 và HĐ2. Từ đó trả lời câu hỏi ở Tình huống mở đầu.

Nhận xét. Các bước giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Bước 1. Lập hệ phương trình:

- Chọn ẩn số (thường chọn hai ẩn số) và đặt điều kiện thích hợp cho các ẩn số;
- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;
- Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải hệ phương trình.

Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm tìm được của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn, nghiệm nào không thỏa mãn điều kiện của ẩn, rồi kết luận.

Ví dụ 1. Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 1 006, biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124.

Giải

- Gọi hai số cần tìm là x và y , trong đó $x < y$. Số dư trong phép chia y cho x là 124 nên $x > 124$. Vậy điều kiện của hai ẩn là $x, y \in \mathbb{N}$ và $124 < x < y$.

Tổng hai số bằng 1 006 nên ta có phương trình

$$x + y = 1\,006. \quad (1)$$

Khi chia y cho x ta được thương là 2, dư 124 nên ta có phương trình

$$y = 2x + 124. \quad (2)$$

Do đó, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 1\,006 & (1) \\ y = 2x + 124 & (2) \end{cases}$$

- Giải hệ phương trình:

Từ (2) thế $y = 2x + 124$ vào (1), ta được $3x + 124 = 1\,006$ hay $3x = 882$, suy ra $x = 294$.

Từ đó ta được $y = 2 \cdot 294 + 124 = 712$.

- Các giá trị $x = 294$ và $y = 712$ thỏa mãn các điều kiện của ẩn.

Vậy hai số cần tìm là 294 và 712.

Luyện tập 1. Một chiếc xe khách đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, quãng đường dài 170 km. Sau khi xe khách xuất phát 1 giờ 40 phút, một chiếc xe tải bắt đầu đi từ Cần Thơ về Thành phố Hồ Chí Minh và gặp xe khách sau đó 40 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km.

Hướng dẫn. Gọi x (km/h) là vận tốc của xe tải và y (km/h) là vận tốc xe khách ($x, y > 0$). Chú ý rằng hai xe (đi ngược chiều) gặp nhau khi tổng quãng đường hai xe đã đi bằng 170 km.

Ví dụ 2. Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong 24 ngày thì xong. Mỗi ngày, đội I làm được nhiều gấp rưỡi đội II. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong đoạn đường đó trong bao lâu? (Giả sử năng suất của mỗi đội là không đổi).

Giải

- Gọi x là số ngày để đội I hoàn thành công việc nếu làm riêng một mình; y là số ngày để đội II hoàn thành công việc nếu làm riêng một mình. Điều kiện: $x > 0$ và $y > 0$.

Mỗi ngày đội I làm được $\frac{1}{x}$ (công việc) và đội II làm được $\frac{1}{y}$ (công việc).

Mỗi ngày đội I làm được nhiều gấp rưỡi đội II nên ta có phương trình

$$\frac{1}{x} = 1,5 \cdot \frac{1}{y}$$

hay

$$\frac{1}{x} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{y}. \quad (1)$$

Hai đội làm chung trong 24 ngày thì xong công việc nên mỗi ngày, hai đội làm chung thì được $\frac{1}{24}$ (công việc). Ta có phương trình

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{24}. \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình

$$(I) \quad \begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{y} & (1) \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{24} & (2) \end{cases}$$

- Nếu đặt $u = \frac{1}{x}$ và $v = \frac{1}{y}$ thì ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn mới là u và v :

$$(II) \quad \begin{cases} u = \frac{3}{2}v & (3) \\ u + v = \frac{1}{24} & (4) \end{cases}$$

Giải hệ (II): Thế $u = \frac{3}{2}v$ vào phương trình (4), ta được $\frac{3}{2}v + v = \frac{1}{24}$, hay $\frac{5}{2}v = \frac{1}{24}$, suy ra $v = \frac{1}{60}$. Do đó $u = \frac{3}{2}v = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{60} = \frac{1}{40}$.

Từ đó, ta có:

$$u = \frac{1}{x} = \frac{1}{40} \text{ suy ra } x = 40; \quad v = \frac{1}{y} = \frac{1}{60} \text{ suy ra } y = 60.$$

- Các giá trị tìm được của x và y thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Trả lời: Nếu làm một mình thì đội I làm xong đoạn đường đó trong 40 ngày, còn đội II làm xong trong 60 ngày.

Luyện tập 2. Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở riêng vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được $\frac{2}{15}$ bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể nước là bao nhiêu phút?



BÀI TẬP

1.15. Tìm số tự nhiên N có hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số đó bằng 12, và nếu viết hai chữ số đó theo thứ tự ngược lại thì được một số lớn hơn N là 36 đơn vị.

1.16. Điểm số trung bình của một vận động viên bắn súng sau 100 lần bắn là 8,69 điểm. Kết quả cụ thể được ghi trong bảng sau, trong đó có hai ô bị mờ không đọc được (đánh dấu “?”):

Điểm số của mỗi lần bắn	10	9	8	7	6
Số lần bắn	25	42	?	15	?

Em hãy tìm lại các số bị mờ trong hai ô đó.

1.17. Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 3 600 tấn thóc. Năm nay, hai đơn vị thu hoạch được 4 095 tấn thóc. Hỏi năm nay, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc, biết rằng năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 12% so với năm ngoái? Hãy dùng máy tính cầm tay để kiểm tra lại kết quả thu được.

1.18. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc trong bao lâu?



LUYỆN TẬP

1.17. Vào năm 2005, có tổng cộng 55 lần phóng vệ tinh thương mại và phi thương mại trên toàn thế giới. Ngoài ra, số lần phóng vệ tinh phi thương mại nhiều hơn 1 lần so với hai lần số lần phóng vệ tinh thương mại. Tính số lần phóng vệ tinh thương mại và phi thương mại trong năm 2005.

1.18. Một ca nô đi ngược dòng sông một quãng đường 6 km thì hết $\frac{3}{2}$ giờ. Mặt khác, ca nô đó chỉ mất 45 phút để đi xuôi dòng sông một quãng đường tương tự. Tính vận tốc thực của ca nô và vận tốc của dòng nước.

1.19. Để pha chế 1 000 lít cồn nồng độ 16%, người ta trộn lẫn dung dịch cồn nồng độ 10% và dung dịch cồn nồng độ 70%. Tính số lít mỗi dung dịch cồn nồng độ 10% và nồng độ 70% cần dùng.

1.20. Chị Hương tập thể dục vào mỗi buổi sáng trong vòng 40 phút. Chị ấy kết hợp giữa thể dục nhịp điệu giúp đốt cháy khoảng 11 calo mỗi phút và giãn cơ giúp đốt cháy khoảng 4 calo mỗi phút. Mục tiêu của chị là đốt cháy 335 calo trong mỗi buổi tập sáng của mình.

a) Viết hệ phương trình biểu thị thời gian chị dành cho mỗi hoạt động tập.

b) Từ hệ phương trình lập được ở câu a, tính thời gian chị nên dành cho mỗi hoạt động tập để đạt được mục tiêu của mình.

1.21. Chi phí để anh Hùng và ban nhạc của anh thu âm đĩa CD đầu tiên là 30 triệu đồng và mỗi đĩa CD sẽ có giá 8 nghìn đồng để sản xuất. Nếu ban nhạc bán đĩa CD của mình với giá 20 nghìn đồng mỗi đĩa thì phải bán bao nhiêu đĩa để hoà vốn (tức là doanh thu bằng với chi phí thu âm và sản xuất)?

1.22. Một cửa hàng sách có hai khu sách mới và sách cũ, mỗi khu được bán đồng giá. Mai chi 112 500 đồng để mua 3 cuốn sách mới và 4 cuốn sách cũ, còn Linh chi 157 500 đồng để mua 10 cuốn sách cũ và 3 cuốn sách mới. Tính giá mỗi cuốn sách mới và giá mỗi cuốn sách cũ.

1.23. Chuyến bay thẳng của hãng hàng không Delta Air Lines (một hãng hàng không của Mỹ) trên chặng Atlanta - Paris dài 4 000 dặm, mất khoảng 8 giờ để đi từ Atlanta đến Paris (đi về phía đông) và mất 10 giờ để đi từ Paris đến Atlanta (đi về phía tây). Mặc dù máy bay có vận tốc riêng (tức là vận tốc so với không khí) không đổi, nhưng có gió ngược khi di chuyển về phía tây và gió thuận khi di chuyển về phía đông nên vận tốc của máy bay so với mặt đất là khác nhau tùy vào hướng di chuyển của máy bay. Tính vận tốc riêng của máy bay và vận tốc gió.

1.24. Hùng dự định chạy 4 km trong tuần tập luyện đầu tiên và tăng quãng đường chạy thêm 1 km mỗi tuần. Trong khi đó, Huy lại dự định sẽ bắt đầu chạy 1 km trong tuần đầu tiên và sau đó tăng thêm 2 km mỗi tuần. Hỏi ở tuần thứ bao nhiêu thì hai người có tổng quãng đường chạy là bằng nhau và quãng đường đó là bao nhiêu kilômét?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

A. TRẮC NGHIỆM

1.19. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 5x + 7y = -1, \\ 3x + 2y = -5? \end{cases}$$

- A. $(-1; 1)$. B. $(-3; 2)$. C. $(2; -3)$. D. $(5; 5)$.

☐

1.20. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(1; 2)$, $B(5; 6)$, $C(2; 3)$, $D(-1; -1)$. Đường thẳng $4x - 3y = -1$ đi qua hai điểm nào trong các điểm đã cho?

- A. A và B . B. B và C . C. C và D . D. D và A .

☐

1.21. Hệ phương trình

$$\begin{cases} 1,5x - 0,6y = 0,3, \\ -2x + y = -2 \end{cases}$$

- A. Có nghiệm là $(0; -0,5)$. B. Có nghiệm là $(1; 0)$.
C. Có nghiệm là $(-3; -8)$. D. Vô nghiệm.

☐

1.22. Hệ phương trình

$$\begin{cases} 0,6x + 0,3y = 1,8, \\ 2x + y = -6 \end{cases}$$

- A. Có một nghiệm. B. Vô nghiệm.
C. Có vô số nghiệm. D. Có hai nghiệm.

☐

B. TỰ LUẬN

1.23. Giải các hệ phương trình:

a)
$$\begin{cases} 2x + 5y = 10, \\ \frac{2}{5}x + y = 1; \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 0,2x + 0,1y = 0,3, \\ 3x + y = 5; \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \frac{3}{2}x - y = \frac{1}{2}, \\ 6x - 4y = 2. \end{cases}$$

1.24. Giải các hệ phương trình:

$$a) \begin{cases} 0,5x + 2y = -2,5, \\ 0,7x - 3y = 8,1; \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 5x - 3y = -2, \\ 14x + 8y = 19; \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 2(x - 2) + 3(1 + y) = -2, \\ 3(x - 2) - 2(1 + y) = -3. \end{cases}$$

1.25. Tìm số tự nhiên n có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào giữa hai chữ số của số n thì được một số lớn hơn số n là 585 đơn vị, và nếu viết hai chữ số của số n theo thứ tự ngược lại thì được một số nhỏ hơn số n là 18 đơn vị.

1.26. Trên cánh đồng có diện tích 160 ha của một đơn vị sản xuất, người ta dành 60 ha để cấy thí điểm giống lúa mới, còn lại vẫn cấy giống lúa cũ. Khi thu hoạch, đầu tiên người ta cấy 8 ha giống lúa cũ và 7 ha giống lúa mới để đối chứng. Kết quả là, 7 ha giống lúa mới cho thu hoạch nhiều hơn 8 ha giống lúa cũ là 2 tấn thóc. Biết rằng tổng số thóc (cả hai giống) thu hoạch cả vụ trên 160 ha là 860 tấn. Hỏi năng suất của mỗi giống lúa trên 1 ha là bao nhiêu tấn thóc?

1.27. Hai vật chuyển động đều trên một đường tròn đường kính 20 cm, xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm. Nếu chuyển động ngược chiều thì cứ sau 4 giây chúng lại gặp nhau. Nếu chuyển động cùng chiều thì cứ sau 20 giây chúng lại gặp nhau. Tính vận tốc (cm/s) của mỗi vật.

1.28. Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng là 21,7 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 21,8 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng?



ÔN TẬP CHƯƠNG I

A. CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A.
$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - z = -1. \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 0x + 0y = 1. \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 0x - y = -1. \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x + y^2 = 1. \end{cases}$$

☐

2. Nghiệm của hệ phương trình
$$\begin{cases} 4x + 3y = -1 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$$
 là

A. $(-1; 1).$

B. $(3; -1).$

C. $\left(\frac{1}{2}; -1\right).$

D. $(2; -3).$

☐

3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $M(1; 2)$, $N(2; 3)$, $P(-1; -1)$, $Q(5; 8)$. Đường thẳng $3x - 2y = -1$ đi qua hai điểm nào trong các điểm đã cho?

A. M và N .

B. M và P .

C. P và Q .

D. N và P .

☐

4. Giá trị của a và b để đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm $(1; -1)$ và $(-1; 5)$ là

A. $a = 1, b = -2.$

B. $a = -5, b = 1.$

C. $a = -3, b = 2.$

D. $a = -1, b = 0.$

☐

5. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất?

A.
$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ 2x - 4y = 5. \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ -2x + 4y = -6. \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ 2x + 4y = 5. \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ -x + 2y = -2. \end{cases}$$

☐


6. Hình bên dưới minh họa tập nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x - y = 1 \\ x - y = 3. \end{cases}$

B. $\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 3. \end{cases}$

C. $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 3. \end{cases}$

D. $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 3. \end{cases}$



7. Hệ phương trình $\begin{cases} 3x - ay = b \\ ax + by = 3 \end{cases}$ có nghiệm là $(2; -3)$ khi

A. $a = 3, b = 3.$

B. $a = 3, b = -3.$

C. $a = -3, b = 3.$

D. $a = -3, b = -3.$



8. Hệ phương trình $\begin{cases} x + my = 1 \\ -mx - y = -1 \end{cases}$ có vô số nghiệm trong trường hợp nào sau đây?

A. $m = 1.$

B. $m = -1.$

C. $m = 2.$

D. $m = -2.$



B. BÀI TẬP

1.25. Hai nghiệm của phương trình $ax + by = 1$ là $(3; -1)$ và $(-4; -2)$. Tìm a và b .

1.26. Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 0,4x + 0,3y = 1,1, \\ -0,5x + 0,2y = 1,5; \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}y = 1, \\ -4x + 6y = 3; \end{cases}$

c) $\begin{cases} 0,2x - 0,3y = 0,6, \\ -\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}y = -1. \end{cases}$

1.27. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} mx + 9y = m + 3 \\ x + my = 2. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình đã cho trong mỗi trường hợp sau:

- a) $m = 1$;
- b) $m = -3$;
- c) $m = 3$.

1.28. Tìm a để ba đường thẳng sau đồng quy:

$$d_1 : x - y = 1; \quad d_2 : x + y = 3; \quad d_3 : 2x + ay = 1.$$

1.29. Điểm mà tại đó chi phí sản xuất của công ty bằng doanh thu của nó được gọi là *điểm hoà vốn*. Dưới đây, C thể hiện chi phí sản xuất (tính bằng đô la) của x đơn vị sản phẩm và R thể hiện doanh thu (tính bằng đô la) từ việc bán x đơn vị sản phẩm. Tìm số lượng sản phẩm cần sản xuất và bán để hoà vốn, nghĩa là tìm giá trị của x để $C = R$ với

$$\begin{cases} C = 15x + 12\,000, \\ R = 18x - 6\,000. \end{cases}$$

Tính doanh thu của công ty khi đó.

1.30. Một buổi biểu diễn ca nhạc bán được 1 500 vé. Mỗi vé loại I có giá 250 nghìn đồng và mỗi vé loại II có giá 150 nghìn đồng. Tổng số tiền bán vé thu được là 285 triệu đồng. Hỏi mỗi loại vé đã bán được bao nhiêu vé?

1.31. Một khẩu phần súp cà chua chứa 100 calo và 18 gam carbohydrate. Một lát bánh mì nguyên hạt chứa 70 calo và 13 gam carbohydrate. Cần bao nhiêu khẩu phần mỗi loại để có được 230 calo và 42 gam carbohydrate?

1.32. Một loại xe ô tô có mức tiêu hao nhiên liệu là 8,1 lít/100 km khi lái xe trong thành phố và 4,8 lít/100 km khi lái xe trên đường cao tốc. Vào một ngày Chủ nhật, chiếc xe đi tổng quãng đường trong thành phố và trên đường cao tốc là 165 km và tiêu thụ hết 8,415 lít xăng. Tính độ dài quãng đường xe ô tô đi trong thành phố và trên đường cao tốc vào ngày Chủ nhật đó.

Chương II

Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn


Phương trình, bất phương trình xảy ra trong các tình huống hằng ngày liên quan đến vận tốc, tỉ số, công thức hình học, các ứng dụng tài chính,... Dùng phương trình hoặc bất phương trình để giải quyết những bài toán thực tế là một mục tiêu quan trọng của chương này.



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
- Phương trình tích - Phương trình chứa ẩn ở mẫu	- Giải phương trình tích có dạng $(ax + b)(cx + d) = 0$. - Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.

Trong một khu vườn hình vuông có cạnh bằng 15 m người ta làm một lối đi xung quanh vườn có bề rộng là x (m) (H.2.1). Để diện tích phần đất còn lại là 169 m^2 thì bề rộng x của lối đi là bao nhiêu?



Hình 2.1

1. PHƯƠNG TRÌNH TÍCH

Phương trình tích

HĐ1 Phân tích đa thức $P(x) = (x + 1)(2x - 1) + (x + 1)x$ thành nhân tử.

HĐ2 Giải phương trình $P(x) = 0$.

Để giải phương trình tích $(ax + b)(cx + d) = 0$, ta giải hai phương trình $ax + b = 0$ và $cx + d = 0$. Sau đó lấy tất cả các nghiệm của chúng.

Ví dụ 1: Giải phương trình $(2x + 1)(3x - 1) = 0$.

Giải

Ta có $(2x + 1)(3x - 1) = 0$

nên $2x + 1 = 0$ hoặc $3x - 1 = 0$.

- $2x + 1 = 0$ hay $2x = -1$, suy ra $x = -\frac{1}{2}$.

- $3x - 1 = 0$ hay $3x = 1$, suy ra $x = \frac{1}{3}$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là $x = -\frac{1}{2}$ và $x = \frac{1}{3}$.

Ví dụ 2: Giải phương trình $x^2 - x = -2x + 2$.

Giải

Biến đổi phương trình đã cho về phương trình tích như sau:

$$\begin{aligned}x^2 - x &= -2x + 2 \\x^2 - x + 2x - 2 &= 0 \\x(x - 1) + 2(x - 1) &= 0 \\(x + 2)(x - 1) &= 0.\end{aligned}$$

Ta giải hai phương trình sau:

- $x + 2 = 0$ suy ra $x = -2$.
- $x - 1 = 0$ suy ra $x = 1$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là $x = -2$ và $x = 1$.

Nhận xét. Trong Ví dụ 2, ta thực hiện việc giải phương trình theo hai bước:

- **Bước 1.** Đưa phương trình về phương trình tích $(ax + b)(cx + d) = 0$;
- **Bước 2.** Giải phương trình tích tìm được.

Luyện tập 1. Giải các phương trình sau:

a) $(3x + 1)(2 - 4x) = 0$;

b) $x^2 - 3x = 2x - 6$.

Vận dụng. Giải bài toán ở tình huống mở đầu.

2. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

Điều kiện xác định của một phương trình

Xét phương trình

$$x + \frac{1}{x+1} = -1 + \frac{1}{x+1}. \quad (1)$$

HD3 Chuyển các biểu thức chứa ẩn từ vế phải sang vế trái, rồi thu gọn vế trái.

HD4 Giá trị $x = -1$ có là nghiệm của phương trình đã cho hay không? Vì sao?

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến điều kiện xác định của một phương trình. Chẳng hạn, đối với phương trình trên, để phương trình xác định thì $x + 1 \neq 0$ hay $x \neq -1$.

Đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta thường đặt điều kiện cho ẩn để tất cả các mẫu thức trong phương trình đều khác 0 và gọi đó là điều kiện xác định (viết tắt là ĐKXD) của phương trình.

Ví dụ 3: Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

- a) $\frac{5x + 2}{x - 1} = 0$;
 b) $\frac{1}{x + 1} = 1 + \frac{1}{x - 2}$.

Giải

a) Vì $x - 1 \neq 0$ khi $x \neq 1$ nên ĐKXD của phương trình $\frac{5x + 2}{x - 1} = 0$ là $x \neq 1$.

b) Vì $x + 1 \neq 0$ khi $x \neq -1$ và $x - 2 \neq 0$ khi $x \neq 2$ nên ĐKXD của phương trình $\frac{1}{x + 1} = 1 + \frac{1}{x - 2}$ là $x \neq -1$ và $x \neq 2$.

Luyện tập 2. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

- a) $\frac{3x + 1}{2x - 1} = 1$;
 b) $\frac{x}{x - 1} + \frac{x + 1}{x} = 2$.

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

HD5 Xét phương trình

$$\frac{x + 3}{x} = \frac{x + 9}{x - 3}. \quad (2)$$

Hãy thực hiện các yêu cầu sau để giải phương trình (2):

- a) Tìm điều kiện xác định của phương trình (2);
 b) Quy đồng mẫu hai vế của phương trình (2), rồi khử mẫu;
 c) Giải phương trình vừa tìm được;
 d) Kết luận nghiệm của phương trình (2).

Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta thường thực hiện các bước như sau:

- **Bước 1.** Tìm điều kiện xác định của phương trình.
- **Bước 2.** Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
- **Bước 3.** Giải phương trình vừa tìm được.
- **Bước 4 (Kết luận).** Trong các giá trị tìm được của ẩn ở Bước 3, giá trị nào thỏa mãn điều kiện

xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho.

Ví dụ 4: Giải phương trình

$$\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-2} = \frac{3}{(x+1)(x-2)}. \quad (3)$$

Giải

Điều kiện xác định $x \neq -1$ và $x \neq 2$.

Quy đồng mẫu và khử mẫu, ta được

$$\frac{2(x-2)}{(x+1)(x-2)} + \frac{x+1}{(x+1)(x-2)} = \frac{3}{(x+1)(x-2)},$$

suy ra

$$2(x-2) + (x+1) = 3. \quad (3a)$$

Giải phương trình (3a):

$$2(x-2) + (x+1) = 3$$

$$2x - 4 + x + 1 = 3$$

$$3x - 3 = 3$$

$$3x = 6$$

$$x = 2.$$

Giá trị $x = 2$ không thỏa mãn ĐKXD. Vậy phương trình (3) vô nghiệm.

Luyện tập 3. Giải phương trình

$$\frac{1}{x-1} - \frac{4x}{x^3-1} = \frac{x}{x^2+x+1}.$$



BÀI TẬP

2.1. Giải các phương trình sau:

a) $x(x-2) = 0;$

b) $(2x+1)(3x-2) = 0.$

2.2. Giải các phương trình sau:

a) $(x^2-4) + x(x-2) = 0;$


b) $(2x + 1)^2 - 9x^2 = 0$.

2.3. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{2}{2x + 1} + \frac{1}{x + 1} = \frac{3}{(2x + 1)(x + 1)}$;

b) $\frac{1}{x + 1} - \frac{x}{x^2 - x + 1} = \frac{3x}{x^3 + 1}$.

2.4. Bác An có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 14 m và chiều rộng 12 m. Bác dự định xây nhà trên mảnh đất đó và dành một phần diện tích đất để làm sân vườn như Hình 2.3. Biết diện tích đất làm nhà là 100 m^2 . Hỏi x bằng bao nhiêu mét?



Hình 2.3

2.5. Hai người cùng làm chung một công việc thì xong trong 8 giờ. Hai người cùng làm được 4 giờ thì người thứ nhất bị điều đi làm công việc khác. Người thứ hai tiếp tục làm việc trong 12 giờ nữa thì xong công việc. Gọi x là thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc (đơn vị tính là giờ, $x > 0$).

a) Hãy biểu thị theo x :

- Khối lượng công việc mà người thứ nhất làm được trong 1 giờ;
- Khối lượng công việc mà người thứ hai làm được trong 1 giờ.

b) Hãy lập phương trình theo x và giải phương trình đó. Sau đó cho biết, nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao lâu mới xong công việc đó.



LUYỆN TẬP

2.1. Giải các phương trình sau:

a) $(x + 2)^2 - (2x + 1)(x + 2) = 0$;

b) $16x^2 - (3x + 2)^2 = 0$.

2.2. Giải các phương trình sau:

a) $x^3 + 3x^2 - 8 = x^3 + 2x^2 - 7$;

b) $x(2x - 5) = (2x + 1)(5 - 2x)$.

2.3. Giải các phương trình sau:

a) $x^2 + x = -6x - 6$;

b) $2x^2 - 2x = x - 1$.

2.4. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{5x-1}{3x+2} - \frac{5x+2}{3x} = 0;$

b) $\frac{6x-5}{2x-1} - \frac{9x}{3x-1} = 0.$

2.5. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{3}{x+2} + \frac{x}{x^2-2x+4} = \frac{4x^2}{x^3+8};$

b) $\frac{3}{2x+1} + \frac{7}{3x+2} = \frac{21x+10}{(2x+1)(3x+2)}.$

2.6. Một vật rơi tự do từ độ cao so với mặt đất là 120 mét. Bỏ qua sức cản không khí, quãng đường chuyển động s (mét) của vật rơi tự do sau thời gian t được biểu diễn gần đúng bởi công thức $s = 4,9t^2$, trong đó t là thời gian tính bằng giây. Sau bao nhiêu giây kể từ khi bắt đầu rơi thì vật này chạm mặt đất (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. BẤT ĐẲNG THỨC

Nhắc lại thứ tự trên tập số thực

Trên tập số thực, với hai số a và b có ba trường hợp sau:

- a) Số a bằng số b , kí hiệu $a = b$;
- b) Số a lớn hơn số b , kí hiệu $a > b$;
- c) Số a nhỏ hơn số b , kí hiệu $a < b$.

Câu hỏi

Thay ? trong các biểu thức sau bằng dấu thích hợp ($=$, $>$, $<$).

- a) $-34,2$ -27 ;
- b) $\frac{6}{-8}$ $-\frac{3}{4}$;
- c) 2024 1954 .

Khi biểu diễn số thực trên trục số, điểm biểu diễn số bé hơn nằm trước điểm biểu diễn số lớn hơn.
 Chẳng hạn, $-2,5 < -1 < 1 < 1,5$.

Số a lớn hơn hoặc bằng số b , tức là $a > b$ hoặc $a = b$, kí hiệu là $a \geq b$.

Số a nhỏ hơn hoặc bằng số b , tức là $a < b$ hoặc $a = b$, kí hiệu là $a \leq b$.

Khái niệm bất đẳng thức

Ta gọi hệ thức dạng $a > b$ (hay $a < b$, $a \geq b$, $a \leq b$) là bất đẳng thức và gọi a là vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức.

Chú ý: Hai bất đẳng thức $1 < 2$ và $-3 < -2$ (hay $6 > 3$ và $8 > 5$) được gọi là hai bất đẳng thức cùng chiều. Hai bất đẳng thức $1 < 2$ và $-2 > -3$ (hay $6 > 3$ và $5 < 8$) được gọi là hai bất đẳng thức ngược chiều.

Bất đẳng thức có tính chất quan trọng sau:

Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$ (tính chất bắc cầu của bất đẳng thức).

Chú ý: Tương tự, các thứ tự lớn hơn ($>$), lớn hơn hoặc bằng ($\geq$), nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) cũng có tính chất bắc cầu.

Luyện tập 2

Chứng minh rằng:

a) $\frac{2024}{1000} > 1,9$;

b) $-\frac{2022}{2023} > -1,1$.

II. LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG

Khám phá

Xét bất đẳng thức $-1 < 2$.

(1)

- Cộng 2 vào hai vế của bất đẳng thức (1) rồi so sánh kết quả thì ta được bất đẳng thức nào?
- Cộng -2 vào hai vế của bất đẳng thức (1) rồi so sánh kết quả nhận được thì ta được bất đẳng thức nào?
- Cộng vào hai vế của bất đẳng thức (1) với cùng một số c thì ta sẽ được bất đẳng thức nào?

Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Với ba số a, b, c ta có:

- Nếu $a < b$ thì $a + c < b + c$;
- Nếu $a \leq b$ thì $a + c \leq b + c$;
- Nếu $a > b$ thì $a + c > b + c$;
- Nếu $a \geq b$ thì $a + c \geq b + c$.

Luyện tập 3

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

- $19 + 2\,023$ và $-31 + 2\,023$;
- $\sqrt{2} + 2$ và 4 .

III. LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN

Khám phá

Cho bất đẳng thức $-2 < 5$.

- Nhân hai vế của bất đẳng thức với 7 rồi so sánh kết quả thì ta được bất đẳng thức nào?
- Nhân hai vế của bất đẳng thức với -7 rồi so sánh kết quả thì ta được bất đẳng thức nào?

Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Với ba số a, b, c và $c > 0$ ta có:

- Nếu $a < b$ thì $ac < bc$;
- Nếu $a \leq b$ thì $ac \leq bc$;

- Nếu $a > b$ thì $ac > bc$;
- Nếu $a \geq b$ thì $ac \geq bc$.

Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

Với ba số a, b, c và $c < 0$ ta có:

- Nếu $a < b$ thì $ac > bc$;
- Nếu $a \leq b$ thì $ac \geq bc$;
- Nếu $a > b$ thì $ac < bc$;
- Nếu $a \geq b$ thì $ac \leq bc$.

Luyện tập 4

Thay ? trong các biểu thức sau bởi dấu thích hợp ($<$, $>$) để được khẳng định đúng.

- a) $13 \cdot (-10,5) \square 13 \cdot 11,2$;
 b) $(-13) \cdot (-10,5) \square (-13) \cdot 11,2$.

Vận dụng 2

Một nhà tài trợ dự kiến tổ chức một buổi đi dã ngoại tập thể nhằm giúp các bạn học sinh vùng cao trải nghiệm thực tế tại một trang trại trong 1 ngày (từ 14h00 ngày hôm trước đến 12h00 ngày hôm sau). Cho biết số tiền tài trợ dự kiến là 30 triệu đồng và giá thuê các dịch vụ và phòng nghỉ là 17 triệu đồng 1 ngày, giá mỗi suất ăn trưa, ăn tối là 60 000 đồng và mỗi suất ăn sáng là 30 000 đồng. Hỏi có thể tổ chức cho nhiều nhất bao nhiêu bạn tham gia được?



BÀI TẬP

2.6. Dùng kí hiệu để viết bất đẳng thức tương ứng trong mỗi trường hợp sau:

- a) x nhỏ hơn hoặc bằng -2 ;
 b) m là số âm;
 c) y là số dương;
 d) p lớn hơn hoặc bằng 2 024.

2.7. Viết một bất đẳng thức phù hợp trong mỗi trường hợp sau:

- a) Bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được phép lái ô tô;
 b) Xe buýt chở được tối đa 45 người;
 c) Mức lương tối thiểu cho một giờ làm việc của người lao động là 20 000 đồng.

2.8. Không thực hiện phép tính, hãy chứng minh:

a) $2 \cdot (-7) + 2023 < 2 \cdot (-1) + 2023$;

b) $(-3) \cdot (-8) + 1975 > (-3) \cdot (-7) + 1975$.

2.9. Cho $a < b$, hãy so sánh:

a) $5a + 7$ và $5b + 7$;

b) $-3a - 9$ và $-3b - 9$.

2.10. So sánh hai số a và b , nếu:

a) $a + 1954 < b + 1954$;

b) $-2a > -2b$.

2.11. Chứng minh rằng:

a) $-\frac{2023}{2024} > -\frac{2024}{2023}$;

b) $\frac{34}{11} > \frac{26}{9}$.



LUYỆN TẬP

2.7. Khi đi trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, chúng ta thấy biển báo giao thông báo hiệu giới hạn tốc độ mà ô tô được phép đi trong điều kiện bình thường. Hãy viết các bất đẳng thức để mô tả tốc độ cho phép của ô tô

a) Ở làn ngoài cùng bên trái và ở làn giữa;

b) Ở làn ngoài cùng bên phải.

2.8. Viết bất đẳng thức để mô tả tình huống sau:

a) Bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được đi bầu cử đại biểu Quốc hội.

b) Một thang máy chở được tối đa 700 kg.

c) Bạn phải mua hàng có tổng giá trị ít nhất 1 triệu đồng mới được giảm giá.

d) Bạn phải ném vào rổ ít nhất 5 quả bóng mới vào được đội tuyển bóng rổ.

2.9. So sánh

a) $-\frac{2019}{1010}$ và $-\frac{201}{100}$;

b) $\frac{2024^2 - 1}{2024}$ và $\frac{2025^2 + 1}{2025}$.

2.10. Cho $a > b$, hãy so sánh

a) $20a + 5b$ và $20b + 5a$;

b) $-3(a + b) - 1$ và $-6b - 1$.

2.11. Cho $a > b > 0$, chứng minh rằng

a) $a^2 > ab$ và $ab > b^2$;

b) $a^2 > b^2$ và $a^3 > b^3$.

Chú ý: Tính chất “Với $a > b > 0$ thì $a^2 > b^2$ và $a^3 > b^3$ ” thường hay dùng trong nhiều bài toán chứng minh bất đẳng thức.

2.12. Chứng minh rằng với mọi số a, b ta có $\frac{a^2 + b^2}{2} \geq ab$.

2.13. Chứng minh rằng: Trong ba số tự nhiên liên tiếp thì bình phương số đứng giữa lớn hơn tích hai số còn lại.

100

80

40

60

50

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1 Giải phương trình

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x^2+x+1} = \frac{x^2+x}{x^3-1}. \quad (1)$$

Giải

ĐKXĐ: $x \neq 1$. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình:

$$\frac{(x^2+x+1) + 2(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{x^2+x}{x^3-1}$$

$$\frac{x^2+3x-1}{x^3-1} = \frac{x^2+x}{x^3-1}.$$

Suy ra $x^2+3x-1 = x^2+x$ hay $2x-1=0$.

Giải phương trình:

$$2x-1=0$$

$$2x=1$$

$$x = \frac{1}{2} \quad (\text{thoả mãn ĐKXĐ}).$$

Vậy phương trình (1) có nghiệm là $x = \frac{1}{2}$.

Ví dụ 2 Giải phương trình:

$$\frac{x}{x+3} - \frac{2}{x-3} = \frac{-2x-6}{x^2-9}. \quad (2)$$

Giải

ĐKXĐ: $x \neq 3$ và $x \neq -3$.

Quy đồng mẫu hai vế của phương trình:

$$\frac{x(x-3) - 2(x+3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{-2x-6}{x^2-9}$$

$$\frac{x^2-5x-6}{x^2-9} = \frac{-2x-6}{x^2-9}.$$

Suy ra $x^2-5x-6 = -2x-6$ hay $x^2-3x=0$.

Giải phương trình $x^2-3x=0$:

$$x(x-3)=0$$

$$x=0 \text{ hoặc } x-3=0$$

$$x=0 \text{ (thoả mãn ĐKXĐ) hoặc } x=3 \text{ (không thoả mãn ĐKXĐ).}$$

Vậy phương trình (2) có nghiệm là $x=0$.

Ví dụ 3 Cho $a < b$. Chứng minh rằng:

a) $2a+1 < 2b+2$;

b) $-2a-5 > -2b-7$.

Giải

a) Từ $a < b$, ta có $2a < 2b$. Suy ra $2a+1 < 2b+1$.

(1)

Vì $1 < 2$ nên $2b + 1 < 2b + 2$. (2)

Theo tính chất bắc cầu, từ (1) và (2) suy ra $2a + 1 < 2b + 2$.

b) Từ $a < b$, ta có $-2a > -2b$. Suy ra $-2a - 5 > -2b - 5$. (3)

Vì $-5 > -7$ nên $-2b - 5 > -2b - 7$. (4)

Theo tính chất bắc cầu, từ (3) và (4) suy ra $-2a - 5 > -2b - 7$.

BÀI TẬP

2.12. Giải các phương trình sau:

a) $2(x + 1) = (5x - 1)(x + 1)$;

b) $(-4x + 3)x = (2x + 5)x$.

2.13. Để loại bỏ $x\%$ một loại tảo độc khỏi một hồ nước, người ta ước tính chi phí cần bỏ ra là

$$C(x) = \frac{50x}{100 - x} \quad (\text{triệu đồng}), \quad 0 \leq x < 100.$$

Nếu bỏ ra 450 triệu đồng, người ta có thể loại bỏ được bao nhiêu phần trăm loại tảo độc đó?

2.14. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{1}{x + 2} - \frac{2}{x^2 - 2x + 4} = \frac{x - 4}{x^3 + 8}$;

b) $\frac{2x}{x - 4} + \frac{3}{x + 4} = \frac{x - 12}{x^2 - 16}$.

2.15. Cho $a > b$, chứng minh rằng:

a) $4a + 4 > 4b + 3$;

b) $1 - 3a < 3 - 3b$.



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Bạn Thanh có 100 nghìn đồng. Bạn muốn mua một cái bút giá 18 nghìn đồng và một số quyển vở, mỗi quyển vở giá 7 nghìn đồng. Hỏi bạn Thanh mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở?

I. KHÁI NIỆM BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Trong bài toán mở đầu, nếu kí hiệu số vở mà Thanh mua là x ($x \in \mathbb{N}^*$) thì x phải thoả mãn hệ thức $7x + 18 \leq 100$. Khi đó ta nói hệ thức $7x + 18 \leq 100$ là bất phương trình với ẩn là x .

Trong bất phương trình này, ta gọi $7x + 18$ là vế trái, 100 là vế phải.

Ta có thể biến đổi bất phương trình này về dạng $7x - 82 \leq 0$.

Hệ thức này là bất phương trình bậc nhất với ẩn là x .

Bất phương trình dạng $ax + b < 0$ (hoặc $ax + b > 0$; $ax + b \leq 0$; $ax + b \geq 0$) trong đó a, b là hai số đã cho, $a \neq 0$ được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn x .

Ví dụ 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn x ?

- a) $3x + 16 \leq 0$;
- b) $-5x + 5 > 0$;
- c) $x^2 - 4 > 0$;
- d) $-3x < 0$.

Giải.

a), b), d) là bất phương trình bậc nhất một ẩn x .

c) không là bất phương trình bậc nhất một ẩn x vì $x^2 - 4$ là một đa thức bậc hai.

Luyện tập 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn x ?

- a) $-3x + 7 \leq 0$;
- b) $4x - \frac{3}{2} > 0$;
- c) $x^3 > 0$.

II. NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Xét bất phương trình $3x + 8 < 20$.

Khi thay giá trị $x = \frac{4}{3}$ vào bất phương trình, ta được $3 \cdot \frac{4}{3} + 8 < 20$ là một khẳng định đúng.

Ta nói số $\frac{4}{3}$ (hay giá trị $x = \frac{4}{3}$) là một nghiệm của bất phương trình.

Khi thay giá trị $x = 5$ vào bất phương trình, ta được $3 \cdot 5 + 8 < 20$ là một khẳng định sai.

Ta nói số 5 (hay giá trị $x = 5$) không phải là nghiệm của bất phương trình.

- Số x_0 là một nghiệm của bất phương trình $A(x) < B(x)$ nếu $A(x_0) < B(x_0)$ là khẳng định đúng.
- Giải một bất phương trình là tìm tất cả các nghiệm của bất phương trình đó.

Luyện tập 2. Trong các số -2 ; 0 ; 5 , những số nào là nghiệm của bất phương trình $2x - 10 < 0$?

III. CÁCH GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

HD. Xét bất phương trình

$$5x + 3 < 0. \quad (1)$$

Hãy thực hiện các yêu cầu sau để giải bất phương trình (1):

a) Sử dụng tính chất của bất đẳng thức, cộng vào hai vế của bất phương trình (1) với -3 , ta được một bất phương trình, kí hiệu là (2).

b) Sử dụng tính chất của bất đẳng thức, nhân vào hai vế của bất phương trình (2) với $\frac{1}{5}$ (tức là chia cả hai vế của bất phương trình (2) cho hệ số của x là 5) để tìm nghiệm của bất phương trình.

Bất phương trình bậc nhất một ẩn $ax + b < 0$ ($a \neq 0$) được giải như sau:

$$ax + b < 0,$$

$$ax < -b.$$

- Nếu $a > 0$ thì $x < -\frac{b}{a}$.
- Nếu $a < 0$ thì $x > -\frac{b}{a}$.

Chú ý. Các bất phương trình $ax + b > 0$, $ax + b \leq 0$, $ax + b \geq 0$ được giải tương tự.

Ví dụ 2. Giải bất phương trình $-2x - 4 > 0$.

Giải. Ta có

$$-2x - 4 > 0,$$

$$-2x > 0 + 4$$

(Cộng hai vế của bất phương trình với 4 .)

$$-2x > 4,$$

$$x < 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

(Nhân hai vế với số âm $-\frac{1}{2}$ và đổi chiều bất đẳng thức.)

$$x < -2.$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x < -2$.

Luyện tập 3. Giải các bất phương trình:

a) $6x + 5 < 0$;

b) $-2x - 7 > 0$.

Ví dụ 3. Giải bài toán ở tình huống mở đầu.

Giải. Gọi x (quyển) là số vở mà Thanh có thể mua. Theo bài ra, ta có bất phương trình:

$$\begin{aligned}7x + 18 &\leq 100, \\7x &\leq 100 - 18, \\7x &\leq 82, \\x &\leq \frac{82}{7}.\end{aligned}$$

Vì số vở là số tự nhiên nên Thanh có thể mua nhiều nhất 11 quyển vở.

Chú ý. Ta cũng có thể giải được các bất phương trình một ẩn đưa được về dạng $ax + b < 0$, $ax + b > 0$, $ax + b \leq 0$, $ax + b \geq 0$.

Ví dụ 4. Giải các bất phương trình:

- a) $2x + 5 < 3x - 4$;
- b) $-3x + 5 \geq -4x + 3$.

Giải.

a) Ta có

$$\begin{aligned}2x + 5 &< 3x - 4, \\2x - 3x &< -4 - 5, \\-x &< -9, \\x &> 9.\end{aligned}$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x > 9$.

b) Ta có

$$\begin{aligned}-3x + 5 &\geq -4x + 3, \\-3x + 4x &\geq 3 - 5, \\x &\geq -2.\end{aligned}$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \geq -2$.

Ví dụ 5. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng là 7,4%/năm. Bà Mai dự kiến gửi một khoản tiền vào ngân hàng này và cần số tiền lãi hàng năm ít nhất là 60 triệu để chi tiêu. Hỏi số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

Giải. Gọi x (triệu đồng) là số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm. Ta có số tiền lãi gửi tiết kiệm x (triệu đồng) trong một năm là $0,074 \cdot x$ (triệu đồng).

Để có số tiền lãi ít nhất là 60 triệu đồng/năm thì ta phải có:

$$\begin{aligned}0,074x &\geq 60, \\x &\geq 60 : 0,074, \\x &\geq 810,81.\end{aligned}$$

Vậy bà Mai cần gửi ngân hàng ít nhất 811 triệu đồng.

Luyện tập 4. Giải các bất phương trình sau:

a) $5x + 7 > 8x - 5$;

b) $-4x + 3 \leq 3x - 1$.

Vận dụng. Trong một cuộc thi tuyển dụng việc làm, ban tổ chức quy định mỗi người ứng tuyển phải trả lời 25 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn bốn đáp án, trong đó chỉ có một đáp án đúng. Người ứng tuyển chọn đáp án đúng sẽ được cộng thêm 2 điểm, chọn đáp án sai bị trừ đi 1 điểm. Ở vòng sơ tuyển, ban tổ chức tặng cho mỗi người dự thi 5 điểm và theo quy định người ứng tuyển phải trả lời hết 25 câu hỏi; người nào có số điểm từ 25 điểm trở lên mới được dự thi vòng tiếp theo. Hỏi người ứng tuyển phải trả lời chính xác ít nhất bao nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được vào vòng tiếp theo?



BÀI TẬP

2.16. Giải các bất phương trình sau:

a) $x - 5 \geq 0$;

b) $x + 5 \leq 0$;

c) $-2x - 6 > 0$;

d) $4x - 12 < 0$.

2.17. Giải các bất phương trình sau:

a) $3x + 2 > 2x + 3$;

b) $5x + 4 < -3x - 2$.

2.18. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hằng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

2.19. Một hãng taxi có giá mở cửa là 15 nghìn đồng và giá 12 nghìn đồng cho mỗi kilômét tiếp theo. Hỏi với 200 nghìn đồng thì hành khách có thể di chuyển được tối đa bao nhiêu kilômét (làm tròn đến hàng đơn vị)?

2.20. Người ta dùng một loại xe tải để chở bia cho một nhà máy. Mỗi thùng bia 24 lon nặng trung bình 6,7 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng bia, biết bác lái xe nặng 65 kg?



LUYỆN TẬP

2.14. Giải các bất phương trình:

a) $-7x + 3 > 0$;

b) $6x + 5 \geq 0$;

c) $-\frac{1}{2}x + 7 < 0$;

d) $\frac{2}{5}x + 3 \leq 0$.

2.15. Giải các bất phương trình:

a) $-5x + 3 > 2x + 5$;

b) $6x^2 - 5x + 1 \leq 6x^2 + 4x + 3$.

2.16. Giải các bất phương trình:

a) $3(2x - 3)(2x + 3) > 12x^2 + 2x$;

b) $(2x + 1)(5x - 3) > 10x^2 + 2x + 1$.

2.17. Một công ty chuyển nhà cần di chuyển một cây đàn piano nặng 260 kg bằng thang máy. Thang máy có thể chở được tối đa là 710 kg.

a) Viết và giải bất phương trình để xác định khối lượng thang máy có thể chở thêm được.


b) Ngoài chiếc đàn piano, thang máy có thể chở thêm được bao nhiêu người biết mỗi người nặng khoảng 60 kg.

2.18. David có thể kiếm được 8 USD cho mỗi giờ làm việc tại công ty chuyên chăm sóc cây cảnh và anh ấy muốn kiếm được ít nhất 1 200 USD trong mùa hè này.

a) Hãy viết một bất phương trình mô tả tình huống này.

b) Hỏi anh ấy cần làm việc ít nhất bao nhiêu giờ để kiếm được số tiền trên?

2.19. Chiều dài của một hình chữ nhật thì luôn lớn hơn hoặc bằng chiều rộng. Hãy viết và giải bất phương trình để tìm giá trị có thể của x (cm) trong hình vẽ dưới đây:



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II



BÀI TẬP

A. TRẮC NGHIỆM

2.21. Nghiệm của bất phương trình $-2x + 1 < 0$ là

- A. $x < \frac{1}{2}$. B. $x > \frac{1}{2}$. C. $x \leq \frac{1}{2}$. D. $x \geq \frac{1}{2}$.

2.22. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x}{2x+1} + \frac{3}{x-5} = \frac{x}{(2x+1)(x-5)}$ là

- A. $x \neq -\frac{1}{2}$. B. $x \neq -\frac{1}{2}$ và $x \neq -5$.
C. $x \neq 5$. D. $x \neq -\frac{1}{2}$ và $x \neq 5$.

2.23. Phương trình $x - 1 = m + 4$ có nghiệm lớn hơn 1 với

- A. $m \geq -4$. B. $m \leq 4$. C. $m > -4$. D. $m < -4$.

2.24. Nghiệm của bất phương trình $1 - 2x \geq 2 - x$ là

- A. $x > \frac{1}{2}$. B. $x < \frac{1}{2}$. C. $x \leq -1$. D. $x \geq -1$.

2.25. Cho $a > b$. Khi đó ta có:

- A. $2a > 3b$. B. $2a > 2b + 1$.
C. $5a + 1 > 5b + 1$. D. $-3a < -3b - 3$.

B. TỰ LUẬN

2.26. Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 1)^2 - (x + 2)^2 = 0$;

b) $x(x + 1) = 2(x^2 - 1)$.

2.27. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{x}{x-5} - \frac{2}{x+5} = \frac{x^2}{x^2-25}$;

b) $\frac{1}{x+1} - \frac{x}{x^2-x+1} = \frac{3}{x^3+1}$.

2.28. Cho $a < b$, hãy so sánh:

a) $a + b + 5$ với $2b + 5$;

b) $-2a - 3$ với $-(a + b) - 3$.

2.29. Giải các bất phương trình:

a) $2x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 4)$;

b) $(x + 1)(2x - 1) < 2x^2 - 4x + 1$.

2.30. Một hãng viễn thông nước ngoài có hai gói cước như sau:

Gói cước A	Gói cước B
Cước thuê bao hằng tháng 32 USD	Cước thuê bao hằng tháng là 44 USD
45 phút miễn phí	Không có phút miễn phí
0,4 USD cho mỗi phút thêm	0,25 USD/phút

a) Hãy viết một phương trình xác định thời gian gọi (phút) mà phí phải trả trong cùng một tháng của hai gói cước là như nhau và giải phương trình đó.

b) Nếu khách hàng chỉ gọi tối đa là 180 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước nào? Nếu khách hàng gọi 500 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước nào?

2.31. Thanh tham dự một kì kiểm tra năng lực tiếng Anh gồm 4 bài kiểm tra nghe, nói, đọc và viết. Mỗi bài kiểm tra có điểm là số nguyên từ 0 đến 10. Điểm trung bình của ba bài kiểm tra nghe, nói, đọc của Thanh là 6,7. Hỏi bài kiểm tra viết của Thanh cần được bao nhiêu điểm để điểm trung bình cả 4 bài kiểm tra được từ 7,0 trở lên? Biết điểm trung bình được tính gần đúng đến chữ số thập phân thứ nhất.

2.32. Để lập đội tuyển năng khiếu về bóng rổ của trường, thầy thể dục đưa ra quy định tuyển chọn như sau: mỗi bạn dự tuyển sẽ được ném 15 quả bóng vào rổ, quả bóng vào rổ được cộng 2 điểm; quả bóng ném ra ngoài bị trừ 1 điểm. Nếu bạn nào có số điểm từ 15 điểm trở lên thì sẽ được chọn vào đội tuyển. Hỏi một học sinh muốn được chọn vào đội tuyển thì phải ném ít nhất bao nhiêu quả vào rổ?

ÔN TẬP CHƯƠNG II



LUYỆN TẬP

A. CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

Chọn một phương án đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1. Nghiệm của bất phương trình $-5x - 1 < 0$ là

- A. $x > -\frac{1}{5}$. B. $x < -\frac{1}{5}$. C. $x \geq -\frac{1}{5}$. D. $x \leq -\frac{1}{5}$.

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2x}{x-1} + \frac{3x+1}{2x+1} = \frac{7x^2}{(x-1)(2x+1)}$ là

- A. $x \neq 1$. B. $x \neq -\frac{1}{2}$.
C. $x \neq 1$ và $x \neq -\frac{1}{2}$. D. $x \in \mathbb{R}$.

Câu 3. Phương trình $2x + 1 = m$ có nghiệm lớn hơn -2 với

- A. $m > 0$. B. $m > -2$. C. $m > -3$. D. $m \leq -3$.

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình $3x - 1 \leq 2x + 2$ là

- A. $x > 3$. B. $x < 3$. C. $x \geq 3$. D. $x \leq 3$.

Câu 5. Cho $a > b$, khi đó ta có

- A. $2a > b + 1$. B. $-2a > -2b$.
C. $2a > a + b$. D. $3a < a + 2b$.

B. BÀI TẬP

2.20. Giải các phương trình sau:

a) $5x(x+2) - 10x - 20 = 0$;

b) $x^2 - 4x = x - 4$.

2.21. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{6}{8+x^3} = \frac{1}{x^2-2x+4} + \frac{1}{x+2}$;

b) $\frac{x}{x+5} + \frac{x-5}{x} = 2$.

2.22. Giải các bất phương trình sau:

a) $(3x + 1)(x + 2) > x(3x - 2) + 1;$

b) $2x(x + 1) + 3 < x(2x + 5) - 7.$

2.23. a) Cho $a < b$ và $c < d$, chứng minh rằng $a + c < b + d$.

b) Cho $0 < a < b$ và $0 < c < d$, chứng minh rằng $0 < ac < bd$.

2.24. Chứng minh rằng với số $a > 0, b > 0$ bất kì, ta luôn có $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$.

2.25. Hà phải làm 4 bài kiểm tra tiếng Anh: nghe, nói, đọc và viết. Bài nghe, nói, đọc Hà đạt điểm số lần lượt là 78, 83 và 89. Hỏi bài kiểm tra viết, Hà phải đạt điểm số là bao nhiêu để điểm số trung bình Hà đạt được của cả 4 bài kiểm tra ít nhất là 85?

2.26. Mức lương tối thiểu theo quy định ở Pháp năm 2022 là 10,25 € cho mỗi giờ làm việc. Trong dịp hè, Laurent David làm thêm tại một khách sạn theo mức lương tối thiểu như quy định và anh ấy muốn kiếm được ít nhất 1500 € trong mùa hè này.

a) Hãy viết một bất phương trình mô tả tình huống này.

b) Hỏi anh ấy cần làm việc ít nhất bao nhiêu giờ để kiếm được số tiền trên?

(€ là viết tắt của Euro, là loại tiền tệ mà 20 nước thuộc Liên minh Châu Âu đang sử dụng chung)

2.27. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A đến B trên cùng quãng đường dài 150 km. Vận tốc xe thứ nhất hơn vận tốc xe thứ hai là 10 km/h và xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai là 30 phút. Hỏi vận tốc của hai xe là bao nhiêu?

Chương III

Căn bậc hai và căn bậc ba



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Mở đầu

Trong Vật lí, quãng đường S (tính bằng mét) của một vật rơi tự do được cho bởi công thức $S = 4,9t^2$, trong đó t là thời gian rơi (tính bằng giây). Hỏi sau bao nhiêu giây thì vật sẽ chạm đất nếu được thả rơi tự do từ độ cao 122,5 mét?

I. CĂN BẬC HAI

Tìm hiểu khái niệm căn bậc hai

HD1. Tìm các số thực x sao cho $x^2 = 49$.

Căn bậc hai của số thực không âm a là số thực x sao cho $x^2 = a$.

Nhận xét

- Số âm không có căn bậc hai;
- Số 0 có một căn bậc hai duy nhất là 0;
- Số dương a có đúng hai căn bậc hai đối nhau là $\sqrt{a}$ (căn bậc hai số học của a) và $-\sqrt{a}$.

Ví dụ 1. Tìm căn bậc hai của 81.

Giải

Ta có $\sqrt{81} = 9$ nên 81 có hai căn bậc hai là 9 và -9 .

Luyện tập 1. Tìm căn bậc hai của 121.

Tính căn bậc hai của một số bằng máy tính cầm tay

Để tính các căn bậc hai của một số $a > 0$, chỉ cần tính $\sqrt{a}$. Có thể dễ dàng làm điều này bằng cách sử dụng MTCT.

Ví dụ 2. Sử dụng MTCT, tính căn bậc hai của 11,1 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Giải

Bấm các phím màn hình hiện kết quả là 3,33166625. Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai ta được $\sqrt{11,1} \approx 3,33$.

Vậy căn bậc hai của 11,1 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là 3,33 và $-3,33$.

Luyện tập 2. Sử dụng MTCT tìm căn bậc hai của $\frac{7}{11}$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Tính chất của căn bậc hai

HD2. Tính và so sánh $\sqrt{a^2}$ và $|a|$ trong mỗi trường hợp sau:

- a) $a = 3$;
- b) $a = -3$.

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

với mọi số thực a .

Ví dụ 3. Không sử dụng MTCT, tính:

- a) $1 - \sqrt{2} + \sqrt{(1 + \sqrt{2})^2}$;
- b) $\sqrt{(-3)^2} + 3$.

Giải

a) Ta có $\sqrt{(1 + \sqrt{2})^2} = |1 + \sqrt{2}| = 1 + \sqrt{2}$ nên

$$1 - \sqrt{2} + \sqrt{(1 + \sqrt{2})^2} = 1 - \sqrt{2} + (1 + \sqrt{2}) = 2.$$

b) Ta có $\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3$ nên

$$\sqrt{(-3)^2} + 3 = 3 + 3 = 6.$$

Luyện tập 3.

a) Không sử dụng MTCT, tính: $\sqrt{6^2}$; $\sqrt{(-5)^2}$; $\sqrt{5} - \sqrt{(\sqrt{5} - 1)^2}$.

b) So sánh 3 với $\sqrt{10}$ bằng hai cách:

- Sử dụng MTCT;
- Sử dụng tính chất của căn bậc hai số học đã học ở lớp 7: Nếu $0 \leq a < b$ thì $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

II. CĂN THỨC BẬC HAI

Căn thức bậc hai

HD3. Viết biểu thức tính độ dài cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC , biết $AB = 3$ cm và $AC = x$ cm.

Biểu thức nhận được trong HĐ3 có dạng $\sqrt{A}$, trong đó A là một biểu thức đại số. Tổng quát, ta có định nghĩa:

Căn thức bậc hai là biểu thức có dạng $\sqrt{A}$, trong đó A là một biểu thức đại số. A được gọi là biểu thức lấy căn hoặc biểu thức dưới dấu căn.

HĐ4. Cho biểu thức $C = \sqrt{2x - 1}$.

- Tính giá trị của biểu thức tại $x = 5$.
- Tại $x = 0$ có tính được giá trị của biểu thức không? Vì sao?

$\sqrt{A}$ xác định khi A lấy giá trị không âm và ta thường viết là $A \geq 0$. Ta nói $A \geq 0$ là điều kiện xác định (hay điều kiện có nghĩa) của $\sqrt{A}$.

Ví dụ 4. Xét căn thức $\sqrt{2x + 1}$.

- Tìm điều kiện xác định của căn thức.
- Tính giá trị của căn thức đã cho tại $x = 0$ và $x = 4$.

Giải

a) Điều kiện xác định của căn thức là $2x + 1 \geq 0$ hay $x \geq -\frac{1}{2}$.

b) Tại $x = 0$ (thỏa mãn điều kiện xác định) căn thức có giá trị là $\sqrt{2 \cdot 0 + 1} = 1$.

Tại $x = 4$ (thỏa mãn điều kiện xác định) căn thức có giá trị là $\sqrt{2 \cdot 4 + 1} = 3$.

Luyện tập 4. Cho căn thức $\sqrt{5 - 2x}$.

- Tìm điều kiện xác định của căn thức.
- Tính giá trị của căn thức tại $x = 2$.

Hằng đẳng thức $\sqrt{A^2} = |A|$

Tương tự như căn bậc hai của một số thực không âm, với A là một biểu thức, ta cũng có:

- Với $A \geq 0$ ta có $\sqrt{A} \geq 0$; $(\sqrt{A})^2 = A$;
- $\sqrt{A^2} = |A|$.

Ví dụ 5. Rút gọn các biểu thức sau:

- $\sqrt{(1 - x)^2}$ với $x < 0$;
- $\sqrt{1 - 2x + x^2}$ với $x > 2$.

Giải

a) Từ giả thiết $x < 0$ suy ra $1 - x > 0$. Do đó

$$\sqrt{(1 - x)^2} = 1 - x.$$

b) Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu và hằng đẳng thức $\sqrt{A^2} = |A|$, ta có

$$\sqrt{1 - 2x + x^2} = \sqrt{(1 - x)^2} = |1 - x|.$$

Do giả thiết $x > 2$ suy ra $1 - x < 0$ nên $|1 - x| = -(1 - x) = x - 1$. Vì vậy

$$\sqrt{1 - 2x + x^2} = \sqrt{(1 - x)^2} = x - 1$$

với $x > 2$.

Luyện tập 5.

a) Rút gọn biểu thức $x\sqrt{x^6}$ ($x < 0$).

b) Rút gọn và tính giá trị của biểu thức $x + \sqrt{4x^2 - 4x + 1}$ tại $x = -2,5$.

Vận dụng. Trở lại tình huống mở đầu.

a) Viết công thức tính thời gian t (giây) cần thiết để vật rơi được quãng đường S (mét).

b) Sử dụng công thức tìm được trong câu a, hãy trả lời câu hỏi trong tình huống mở đầu.

BÀI TẬP

3.1. Tìm căn bậc hai của mỗi số sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

a) 24,5;

b) $\frac{9}{10}$.

3.2. Để chuẩn bị trồng cây trên vỉa hè, người ta để lại những ô đất hình tròn có diện tích khoảng 2 m^2 . Em hãy ước lượng (với độ chính xác 0,005) đường kính của các ô đất đó khoảng bao nhiêu mét?

3.3. Tìm điều kiện xác định của $\sqrt{x + 10}$ và tính giá trị của căn thức tại $x = -1$.

3.4. Tính:

$$\sqrt{5,1^2}; \quad \sqrt{(-4,9)^2}; \quad -\sqrt{(-0,001)^2}.$$

3.5. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2}$;

b) $3\sqrt{x^2} - x + 1$ ($x < 0$);

c) $\sqrt{x^2 - 4x + 4}$ ($x < 2$).

3.6. Không dùng MTCT, chứng tỏ biểu thức A có giá trị là số nguyên:

$$A = \sqrt{(1 + 2\sqrt{2})^2} - \sqrt{(1 - 2\sqrt{2})^2}.$$



LUYỆN TẬP

3.1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

- a) 81;
- b) $\frac{16}{625}$;
- c) 0,0121;
- d) 6 400.

3.2. Sử dụng MTCT tính:

- a) $\sqrt{17}$ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba);
- b) Các căn bậc hai của 4 021 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm);
- c) Giá trị biểu thức $\frac{-11 + \sqrt{11^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2}}{2 \cdot 3}$ (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005).

3.3. Rút gọn:

- a) $(\sqrt{4,1})^2 - (-\sqrt{6,1})^2$;
- b) $(\sqrt{101})^2 - \sqrt{(-99)^2}$;
- c) $\sqrt{(\sqrt{3} + 2\sqrt{2})^2} - (-\sqrt{3} + 2\sqrt{2})$;
- d) $\sqrt{(\sqrt{10} + 3)^2} - \sqrt{(\sqrt{10} - 3)^2}$.

3.4. Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ hiệu hai bình phương và bình phương của một hiệu, rút gọn:

- a) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$;
- b) $\sqrt{2 - 2\sqrt{2} + 1}$.

3.5. Khi giải phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b, c là ba số thực đã cho, $a \neq 0$), ta phải tính giá trị của căn thức bậc hai $\sqrt{b^2 - 4ac}$. Hãy tính giá trị của căn thức này với các phương trình sau:

- a) $x^2 + 5x + 6 = 0$;
 - b) $4x^2 - 5x - 6 = 0$;
 - c) $-3x^2 - 2x + 33 = 0$.
-
-

3.6. Rút gọn các biểu thức sau:

- a) $\sqrt{49x^4} - 3x^2$;
 - b) $\sqrt{a^6(a-b)^2} : (a-b)$ với $a < b < 0$.
-
-

3.7. Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức $\sqrt{25(4x^2 - 4x + 1)^2}$ tại $x = \sqrt{3}$.



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Phép khai căn bậc hai	- Nhận biết cách khai căn bậc hai của một tích, một thương. - Nhận biết cách nhân và chia các căn bậc hai. - Vận dụng tính toán đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số (căn thức bậc hai của một tích, một thương).

Phép tìm căn bậc hai số học của một số hay biểu thức cũng được gọi là phép khai căn bậc hai. Phép khai căn bậc hai và phép nhân, phép chia có một mối liên hệ đặc biệt mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học này.

I. KHAI CĂN BẬC HAI VÀ PHÉP NHÂN

Liên hệ giữa phép khai căn bậc hai và phép nhân

HD1 Tính và so sánh: $\sqrt{100} \cdot \sqrt{4}$ và $\sqrt{100 \cdot 4}$.

Với A, B là các biểu thức không âm, ta có

$$\sqrt{A} \cdot \sqrt{B} = \sqrt{AB}.$$

Chú ý. Kết quả trên có thể mở rộng cho nhiều biểu thức không âm, chẳng hạn:

$$\sqrt{A} \cdot \sqrt{B} \cdot \sqrt{C} = \sqrt{A \cdot B \cdot C} \quad (\text{với } A \geq 0, B \geq 0, C \geq 0).$$

Ví dụ 1 Tính:

- $\sqrt{27} \cdot \sqrt{3}$;
- $\sqrt{5}(\sqrt{125} + \sqrt{5})$.

Giải

a) Ta có:

$$\sqrt{27} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{27 \cdot 3} = \sqrt{81} = 9.$$

b) Ta có:

$$\sqrt{5}(\sqrt{125} + \sqrt{5}) = \sqrt{5} \cdot \sqrt{125} + \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{5 \cdot 125} + \sqrt{25} = 25 + 5 = 30.$$

Ví dụ 2 Rút gọn $\sqrt{5x} \cdot \sqrt{20x}$ với $x \geq 0$.

Giải

Ta có

$$\sqrt{5x} \cdot \sqrt{20x} = \sqrt{5x \cdot 20x} = \sqrt{100x^2} = \sqrt{(10x)^2} = |10x| = 10x$$

với $x \geq 0$.

Luyện tập 1a) Tính $\sqrt{3} \cdot \sqrt{75}$.b) Rút gọn $\sqrt{5ab^3} \cdot \sqrt{5ab}$ (với $a < 0, b < 0$).**Ví dụ 3** Tính $\sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2}$.**Giải**

$$\sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5^2} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30.$$

Nếu $A \geq 0, B \geq 0, C \geq 0$ thì

$$\sqrt{A^2 B^2 C^2} = ABC.$$

Ví dụ 4 Rút gọn biểu thức $\sqrt{25a^2b^2}$ (với $a \geq 0, b < 0$).**Giải**Theo giả thiết $a \geq 0, b < 0$, do đó

$$\sqrt{25a^2b^2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{b^2} = 5|a| \cdot |b| = -5ab.$$

Luyện tập 2a) Tính nhanh $\sqrt{25 \cdot 49}$.b) Phân tích thành nhân tử: $\sqrt{ab} - 4\sqrt{a}$ (với $a \geq 0, b \geq 0$).**II. KHAI CĂN BẬC HAI VÀ PHÉP CHIA****Liên hệ giữa phép khai căn bậc hai và phép chia****HĐ2** Tính và so sánh: $\sqrt{100} : \sqrt{4}$ và $\sqrt{100 : 4}$.Nếu A, B là các biểu thức với $A \geq 0, B > 0$ thì

$$\frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A}{B}}.$$

Ví dụ 5a) Tính $\sqrt{8} : \sqrt{2}$.b) Rút gọn $\sqrt{52a^3} : \sqrt{13a}$ ($a > 0$).

Giải

a)

$$\sqrt{8} : \sqrt{2} = \sqrt{8 : 2} = \sqrt{4} = 2.$$

b)

$$\sqrt{52a^3} : \sqrt{13a} = \sqrt{52a^3 : (13a)} = \sqrt{4a^2} = \sqrt{(2a)^2} = |2a| = 2a$$

(do $a > 0$).**Luyện tập 3**a) Tính $\sqrt{18} : \sqrt{50}$.b) Rút gọn $\sqrt{16ab^2} : \sqrt{4a}$ (với $a > 0, b < 0$).**Ví dụ 6**a) Viết số dưới dấu căn thành một phân số thập phân rồi tính $\sqrt{1,69}$.b) Rút gọn $a \cdot \sqrt{\frac{2}{a^2}}$ ($a > 0$).**Giải**

a) Ta có

$$1,69 = \frac{169}{100} = \frac{13^2}{10^2}$$

nên

$$\sqrt{1,69} = \sqrt{\frac{13^2}{10^2}} = \frac{\sqrt{13^2}}{\sqrt{10^2}} = \frac{13}{10} = 1,3.$$

b) Do $a > 0$ nên

$$a \cdot \sqrt{\frac{2}{a^2}} = a \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{a^2}} = a \cdot \frac{\sqrt{2}}{a} = \sqrt{2}.$$

Luyện tập 4a) Tính $\sqrt{6,25}$.b) Rút gọn $(a^2 - 1) \cdot \sqrt{\frac{5}{(a-1)^2}}$ ($a > 1$).**Vận dụng**

Công suất P (W), hiệu điện thế U (V), điện trở R (Ω) trong đoạn mạch một chiều liên hệ với nhau theo công thức $U = \sqrt{PR}$. Nếu công suất tăng gấp 8 lần, điện trở giảm 2 lần thì tỉ số giữa hiệu điện thế lúc đó và hiệu điện thế ban đầu bằng bao nhiêu?

Tranh luận

Vì $\sqrt{(-3)^2} = -3$ và $\sqrt{(-12)^2} = -12$ nên

$$\sqrt{(-3)^2 \cdot (-12)^2} = (-3) \cdot (-12) = 36.$$

Theo em, cách làm của Vương có đúng không? Vì sao?

**BÀI TẬP****3.7. Tính:**

a) $\sqrt{12} \cdot (\sqrt{12} + \sqrt{3});$

b) $\sqrt{8} \cdot (\sqrt{50} - \sqrt{2});$

c) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 - 2\sqrt{6}.$

3.8. Rút gọn biểu thức

$$\sqrt{2(a^2 - b^2)} \cdot \sqrt{\frac{3}{a + b}}$$

(với $a \geq b > 0$).

3.9. Tính:

a) $\sqrt{99} : \sqrt{11};$

b) $\sqrt{7,84};$

c) $\sqrt{1815} : \sqrt{15}.$

3.10. Rút gọn

$$\frac{-3\sqrt{16a} + 5a\sqrt{16ab^2}}{2\sqrt{a}}$$

(với $a > 0, b > 0$).

3.11. Kích thước màn hình ti vi hình chữ nhật được xác định bởi độ dài đường chéo. Một loại ti vi có tỉ lệ hai cạnh màn hình là 4 : 3.

a) Gọi x (inch) là chiều rộng của màn hình ti vi. Viết công thức tính độ dài đường chéo d (inch) của màn hình ti vi theo x .

b) Tính chiều rộng và chiều dài (theo centimét) của màn hình ti vi loại 40 inch.



LUYỆN TẬP

3.8. So sánh:

a) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{11}$ và $\sqrt{56}$;

b) $\frac{\sqrt{141}}{\sqrt{3}}$ và 7.

3.9. Không dùng MTCT, tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt{1\frac{2}{3}} : \sqrt{\frac{1}{15}}$;

b) $\sqrt{4,9} \cdot \sqrt{1000}$.

3.10. Không dùng MTCT, chứng minh rằng các biểu thức sau có giá trị là số nguyên:

a) $\sqrt{8 + \sqrt{15}} \cdot \sqrt{8 - \sqrt{15}}$;

b) $\left(\sqrt{6-\sqrt{11}} + \sqrt{6+\sqrt{11}}\right)^2.$

3.11. Không dùng MTCT, tính giá trị của biểu thức sau:

$$P = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}} \cdot \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} \cdot \sqrt{4 + \sqrt{8}}.$$

3.12. Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{3\sqrt{10} + \sqrt{20} - 3\sqrt{6} - \sqrt{12}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}.$$

3.13. So sánh

$$\sqrt{\sqrt{6 + \sqrt{20}}} \quad \text{và} \quad \sqrt{\sqrt{6} + 1}.$$

3.14. Cho a, b là hai số dương khác nhau thoả mãn điều kiện

$$a - b = \sqrt{1 - b^2} - \sqrt{1 - a^2}.$$

Chứng minh rằng $a^2 + b^2 = 1$.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Không dùng MTCT, tính giá trị của biểu thức:

$$A = \sqrt{(1 - \sqrt{3})^2} - \sqrt{3}.$$

Giải

Ta có

$$A = |1 - \sqrt{3}| - \sqrt{3} = (\sqrt{3} - 1) - \sqrt{3} = -1. \quad \leftarrow \text{hằng đẳng thức } \sqrt{A^2} = |A|.$$

Ví dụ 2

Tính:

- a) $(2 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5})$;
- b) $(\sqrt{5} + \sqrt{2})(\sqrt{5} - \sqrt{2})$.

Giải

Sử dụng hằng đẳng thức hiệu của hai bình phương, ta được:

- a) $(2 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5}) = 2^2 - (\sqrt{5})^2 = 4 - 5 = -1$.
- b) $(\sqrt{5} + \sqrt{2})(\sqrt{5} - \sqrt{2}) = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2 = 5 - 2 = 3$.

Chú ý. Tổng quát, ta có

$$(A + \sqrt{B})(A - \sqrt{B}) = A^2 - B$$

với A, B là hai biểu thức, $B \geq 0$.

$$(\sqrt{A} + \sqrt{B})(\sqrt{A} - \sqrt{B}) = A - B$$

với A, B là hai biểu thức không âm.

Ta nói $A + \sqrt{B}$ và $A - \sqrt{B}$; $\sqrt{A} + \sqrt{B}$ và $\sqrt{A} - \sqrt{B}$ là những cặp biểu thức liên hợp.

Ví dụ 3

Cho biểu thức

$$P = \frac{x\sqrt{x} + 1}{x - \sqrt{x} + 1} - 1$$

với $x \geq 0$.

- a) Viết $x\sqrt{x} + 1$ thành tổng hai lập phương rồi phân tích thành nhân tử để rút gọn biểu thức đã cho.
- b) Tính giá trị của P tại $x = 100$.

Giải

a) Ta có

$$x\sqrt{x} + 1 = (\sqrt{x})^3 + 1^3 = (\sqrt{x} + 1) [(\sqrt{x})^2 - \sqrt{x} \cdot 1 + 1^2] = (\sqrt{x} + 1)(x - \sqrt{x} + 1).$$

Từ đó

$$P = \sqrt{x} + 1 - 1 = \sqrt{x}.$$

- b) Tại $x = 100$ (thỏa mãn điều kiện) thì $P = \sqrt{100} = 10$.



BÀI TẬP

3.12. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2} + \sqrt{(1 - \sqrt{2})^2};$

b) $\sqrt{(\sqrt{7} - 3)^2} + \sqrt{(\sqrt{7} + 3)^2}.$

3.13. Thực hiện phép tính:

a) $\sqrt{3} (\sqrt{192} - \sqrt{75});$

b) $\frac{-3\sqrt{18} + 5\sqrt{50} - \sqrt{128}}{7\sqrt{2}}.$

3.14. Chứng minh rằng:

a) $(1 - \sqrt{2})^2 = 3 - 2\sqrt{2};$

b) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 = 5 + 2\sqrt{6}.$

3.15. Cho căn thức $\sqrt{x^2 - 4x + 4}$.

a) Hãy chứng tỏ rằng căn thức xác định với mọi giá trị của x .

b) Rút gọn căn thức đã cho với $x \geq 2$.

c) Chứng tỏ rằng với mọi $x \geq 2$, biểu thức $\sqrt{x - \sqrt{x^2 - 4x + 4}}$ có giá trị không đổi.

3.16. Trong Vật lí, tốc độ (m/s) của một vật đang bay được cho bởi công thức

$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}},$$

trong đó E là động năng của vật (tính bằng Joule, kí hiệu là J) và m (kg) là khối lượng của vật (Theo sách Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016).

Tính tốc độ bay của một vật khi biết vật đó có khối lượng 2,5 kg và động năng 281,25 J.



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Không sử dụng MTCT, có thể so sánh được hai số $a = 3\sqrt{2}$ và $b = 2\sqrt{3}$ hay không?

I. ĐƯA THỪA SỐ RA NGOÀI DẤU CĂN

Cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn

HD1. Tính và so sánh $\sqrt{(-3)^2 \cdot 25}$ với $|-3| \cdot \sqrt{25}$.

Nếu a là một số và b là một số không âm thì

$$\sqrt{a^2 \cdot b} = |a| \sqrt{b}.$$

Chú ý. Phép biến đổi trên gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

Ví dụ 1. Viết nhân tử số của biểu thức dưới dấu căn thành tích các lũy thừa rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

- a) $\sqrt{45}$;
- b) $\sqrt{243a}$ ($a \geq 0$).

Giải

a) Ta có $45 = 3^2 \cdot 5$ nên

$$\sqrt{45} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = 3\sqrt{5};$$

b) Ta có $243 = 3 \cdot 9^2$ nên

$$\sqrt{243a} = \sqrt{9^2 \cdot 3a} = 9\sqrt{3a}.$$

Luyện tập 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

- a) $\sqrt{12}$;
- b) $3\sqrt{27}$;
- c) $5\sqrt{48}$.

Chú ý. Khi tính toán với những căn thức bậc hai mà biểu thức dưới dấu căn có mẫu, ta thường khử mẫu của biểu thức lấy căn (tức là biến đổi căn thức bậc hai đó thành một biểu thức mà trong căn thức không còn mẫu) như trong ví dụ sau:

Ví dụ 2. Khử mẫu của biểu thức lấy căn $\sqrt{\frac{4}{7}}$.

Giải

Nhân cả tử và mẫu của biểu thức lấy căn với số 7 và đưa thừa số ra ngoài dấu căn, ta được

$$\sqrt{\frac{4}{7}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 7}{7^2}} = \sqrt{\left(\frac{2}{7}\right)^2 \cdot 7} = \frac{2\sqrt{7}}{7}.$$

Luyện tập 2. Khử mẫu của biểu thức lấy căn $\sqrt{\frac{3}{5}}$.

Tranh luận. Vuông làm:

$$\sqrt{(-2)^2 \cdot 5} = -2\sqrt{5}.$$

Em có đồng ý với cách làm của Vuông không? Vì sao?

II. ĐƯA THỪA SỐ VÀO TRONG DẤU CĂN

Cách đưa một thừa số vào trong dấu căn

HĐ2. Tính và so sánh:

- $5\sqrt{4}$ với $\sqrt{5^2 \cdot 4}$;
- $-5\sqrt{4}$ với $-\sqrt{(-5)^2 \cdot 4}$.

- Nếu a và b là hai số không âm thì

$$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}.$$

- Nếu a là số âm và b là số không âm thì

$$a\sqrt{b} = -\sqrt{a^2b}.$$

Chú ý. Các phép biến đổi trên gọi là phép đưa thừa số vào trong dấu căn.

Ví dụ 3. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

- $5\sqrt{2}$;
- $-2\sqrt{a}$ ($a \geq 0$).

Giải

- $5\sqrt{2} = \sqrt{5^2 \cdot 2} = \sqrt{50}$;
- $-2\sqrt{a} = -\sqrt{2^2 \cdot a} = -\sqrt{4a}$.

Ví dụ 4. Trả lời câu hỏi trong tình huống mở đầu.

Giải

Ta có

$$3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{18}; \quad 2\sqrt{3} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = \sqrt{12}.$$

Vì $12 < 18$ nên $2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$.

Luyện tập 3. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

- $3\sqrt{5}$;
- $-2\sqrt{7}$.

III. TRỰC CĂN THỨC Ở MẪU

Tính toán với các biểu thức có chứa căn ở mẫu thường phức tạp và ta thường tìm cách trục các căn thức ở mẫu (tức là biến đổi biểu thức thành một biểu thức mới không chứa căn ở mẫu).

Cách trục căn thức ở mẫu

HD3. Nhân cả tử và mẫu của biểu thức $\frac{3a}{2\sqrt{2}}$ với $\sqrt{2}$ và viết biểu thức nhận được dưới dạng không có căn thức ở mẫu.

HD4. Cho hai biểu thức $\frac{-2}{\sqrt{3}+1}$ và $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$. Hãy thực hiện các yêu cầu sau để viết các biểu thức đó dưới dạng không có căn thức ở mẫu:

- Xác định biểu thức liên hợp của mẫu.
- Nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu.
- Sử dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để rút gọn mẫu của biểu thức nhận được.

- Với các biểu thức A, B và $B > 0$, ta có

$$\frac{A}{\sqrt{B}} = \frac{A\sqrt{B}}{B}.$$

- Với các biểu thức A, B, C mà $A \geq 0, A \neq B^2$, ta có

$$\frac{C}{\sqrt{A}+B} = \frac{C(\sqrt{A}-B)}{A-B^2}; \quad \frac{C}{\sqrt{A}-B} = \frac{C(\sqrt{A}+B)}{A-B^2}.$$

- Với các biểu thức A, B, C mà $A \geq 0, B \geq 0, A \neq B$, ta có

$$\frac{C}{\sqrt{A}+\sqrt{B}} = \frac{C(\sqrt{A}-\sqrt{B})}{A-B}; \quad \frac{C}{\sqrt{A}-\sqrt{B}} = \frac{C(\sqrt{A}+\sqrt{B})}{A-B}.$$

Ví dụ 5. Trục căn thức ở mẫu của các biểu thức:

- $\frac{2}{3\sqrt{5}}$;
- $\frac{a}{3-2\sqrt{2}}$.

Giải

- a) Nhân cả tử và mẫu của biểu thức đã cho với $\sqrt{5}$, ta được

$$\frac{2}{3\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{3(\sqrt{5})^2} = \frac{2\sqrt{5}}{15}.$$

- b) Biểu thức liên hợp của mẫu là $3+2\sqrt{2}$. Nhân cả tử và mẫu của biểu thức đã cho với $3+2\sqrt{2}$, ta được

$$\frac{a}{3-2\sqrt{2}} = \frac{a(3+2\sqrt{2})}{(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})} = \frac{a(3+2\sqrt{2})}{3^2-(2\sqrt{2})^2} = a(3+2\sqrt{2}).$$

Luyện tập 4. Trục căn thức ở mẫu của các biểu thức sau:

- a) $\frac{-5\sqrt{x^2+1}}{2\sqrt{3}};$
 b) $\frac{a^2-2a}{\sqrt{a}+\sqrt{2}} (a \geq 0, a \neq 2).$

IV. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

Khi rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai, ta cần phối hợp các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) và các phép biến đổi đã học (đưa thừa số ra ngoài hoặc vào trong dấu căn; khử mẫu của biểu thức lấy căn; trục căn thức ở mẫu).

Ví dụ 6. Rút gọn biểu thức

$$A = 2\sqrt{3} - \sqrt{75} + \sqrt{(1-\sqrt{3})^2}.$$

Giải

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, ta có:

$$\sqrt{75} = \sqrt{3 \cdot 5^2} = 5\sqrt{3}; \quad \sqrt{(1-\sqrt{3})^2} = |1-\sqrt{3}| = \sqrt{3}-1.$$

Do đó

$$A = 2\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + \sqrt{3} - 1 = -1 - 2\sqrt{3}.$$

Ví dụ 7.

- a) Trục căn thức ở mẫu của các biểu thức

$$\frac{x^2-1}{\sqrt{x}-1}; \quad \frac{x^2-x}{\sqrt{x}+1}$$

với $x > 1$.

- b) Sử dụng kết quả câu a, rút gọn biểu thức

$$P = \frac{x^2-1}{\sqrt{x}-1} - \frac{x^2-x}{\sqrt{x}+1}$$

với $x > 1$.

Giải

- a) Ta có

$$\frac{x^2-1}{\sqrt{x}-1} = \frac{(x^2-1)(\sqrt{x}+1)}{x-1} = (x+1)(\sqrt{x}+1) = x\sqrt{x} + \sqrt{x} + x + 1,$$

$$\frac{x^2-x}{\sqrt{x}+1} = \frac{x(x-1)(\sqrt{x}-1)}{x-1} = x(\sqrt{x}-1) = x\sqrt{x} - x.$$

- b) Sử dụng kết quả câu a ta có

$$P = x\sqrt{x} + \sqrt{x} + x + 1 - (x\sqrt{x} - x) = 2x + \sqrt{x} + 1.$$

Luyện tập 5. Rút gọn biểu thức sau:

$$\left(\frac{\sqrt{22} - \sqrt{11}}{1 - \sqrt{2}} + \frac{\sqrt{21} - \sqrt{7}}{1 - \sqrt{3}} \right) (\sqrt{7} - \sqrt{11}).$$

Vận dụng. Trong thuyết tương đối, khối lượng m (kg) của một vật khi chuyển động với tốc độ v (m/s) được cho bởi công thức

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

trong đó m_0 (kg) là khối lượng của vật khi đứng yên, c (m/s) là tốc độ của ánh sáng trong chân không (Theo sách Vật lý đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016).

- Viết lại công thức tính khối lượng m dưới dạng không có căn thức ở mẫu.
- Tính khối lượng m theo m_0 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) khi vật chuyển động với vận tốc

$$v = \frac{1}{10}c.$$

BÀI TẬP

3.17. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

- $\sqrt{52}$;
- $\sqrt{27a}$ ($a \geq 0$);
- $\sqrt{50\sqrt{2} + 100}$;
- $\sqrt{9\sqrt{5} - 18}$.

3.18. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

- $4\sqrt{3}$;
- $-2\sqrt{7}$;
- $4\sqrt{\frac{15}{2}}$;
- $-5\sqrt{\frac{16}{5}}$.

3.19. Khử mẫu trong dấu căn:

a) $2a\sqrt{\frac{3}{5}};$

b) $-3x\sqrt{\frac{5}{x}} \ (x > 0);$

c) $-\sqrt{\frac{3a}{b}} \ (a \geq 0, b > 0).$

3.20. Trục căn thức ở mẫu:

a) $\frac{4 + 3\sqrt{5}}{\sqrt{5}};$

b) $\frac{1}{\sqrt{5} - 2};$

c) $\frac{3 + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}};$

d) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}.$

3.21. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $2\sqrt{\frac{2}{3}} - 4\sqrt{\frac{3}{2}};$

b) $\frac{5\sqrt{48} - 3\sqrt{27} + 2\sqrt{12}}{\sqrt{3}};$

c) $\frac{1}{3 + 2\sqrt{2}} + \frac{4\sqrt{2} - 4}{2 - \sqrt{2}}.$

3.22. Rút gọn biểu thức

$$A = \sqrt{x} \left(\frac{1}{\sqrt{x} + 3} - \frac{1}{3 - \sqrt{x}} \right) \quad (x \geq 0, x \neq 9).$$

**LUYỆN TẬP****3.15.** Tính giá trị biểu thức

$$P = (\sqrt{20} + 2\sqrt{45} - 3\sqrt{80})^2.$$

3.16. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

$$9\sqrt{2}; \quad 8\sqrt{3}; \quad 5\sqrt{6}; \quad 4\sqrt{7}.$$

3.17. Thực hiện phép tính

$$\left(\frac{1}{\sqrt{8} + \sqrt{7}} + \sqrt{175} - 2\sqrt{2} \right)^2.$$

3.18. Thực hiện phép tính

$$\sqrt{\frac{3 - 2\sqrt{2}}{17 - 12\sqrt{2}}} - \sqrt{\frac{3 + 2\sqrt{2}}{17 + 12\sqrt{2}}}.$$

3.19. Không sử dụng MTCT, chứng minh rằng biểu thức sau có giá trị là một số nguyên:

$$P = \left(\frac{\sqrt{5} + 1}{1 + \sqrt{5} + \sqrt{3}} + \frac{\sqrt{5} - 1}{1 + \sqrt{3} - \sqrt{5}} \right) \left(\sqrt{3} - \frac{4}{\sqrt{3}} + 2 \right) \sqrt{0,2}.$$

3.20. a) Trục căn ở mẫu của biểu thức

$$\frac{3 + \sqrt{2}}{2\sqrt{2} - 1}.$$

b) Tính giá trị biểu thức

$$P = x(x^4 - 6x^2 + 1)$$

tại

$$x = \frac{3 + \sqrt{2}}{2\sqrt{2} - 1}.$$



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Căn bậc hai của một số thực (dương) có một vai trò quan trọng trong đời sống và toán học. Căn bậc hai của số thực a không âm là các số thực x thoả mãn điều kiện $x^2 = a$. Trong bài học này, các em sẽ được làm quen với khái niệm căn bậc ba, một khái niệm tương tự khái niệm căn bậc hai.

I. CĂN BẬC BA

Căn bậc ba của một số thực

HD1. Kí hiệu V là thể tích của hình lập phương với cạnh x . Hãy thay dấu “?” trong bảng sau bằng các giá trị thích hợp.

x	$V = x^3$
2	8
?	27
?	64

Tổng quát, ta định nghĩa:

Căn bậc ba của số thực a là số thực x thoả mãn $x^3 = a$.

Chú ý. Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba. Căn bậc ba của số a được kí hiệu là $\sqrt[3]{a}$. Trong kí hiệu $\sqrt[3]{a}$, số 3 được gọi là chỉ số của căn. Phép tìm căn bậc ba của một số gọi là phép khai căn bậc ba.

Ví dụ 1

- Chứng tỏ rằng $\sqrt[3]{64} = 4$.
- Tính $\sqrt[3]{0}$ và $\sqrt[3]{-27}$.

Giải.

- Vì $4^3 = 64$ nên $\sqrt[3]{64} = 4$.
- Vì $0^3 = 0$ nên $\sqrt[3]{0} = 0$. Vì $(-3)^3 = -27$ nên $\sqrt[3]{-27} = -3$.

Nhận xét. Từ định nghĩa căn bậc ba, ta có $(\sqrt[3]{a})^3 = \sqrt[3]{a^3} = a$ với mọi số thực a . Do đó có thể giải Ví dụ 1 như sau: $\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$.

Luyện tập 1 Tính:

- $\sqrt[3]{125}$;
- $\sqrt[3]{0,008}$;
- $\sqrt[3]{\frac{-8}{27}}$.

Tính căn bậc ba của một số bằng máy tính cầm tay

Ta có thể sử dụng loại MTCT thích hợp để tính căn bậc ba của một số. Chẳng hạn, để tính $\sqrt[3]{12}$ và $\sqrt[3]{343}$ ta làm như sau:

Phép tính	Bấm các phím	Kết quả
$\sqrt[3]{343}$	SHIFT $\sqrt{}$ 3 4 3 =	7
$\sqrt[3]{12}$	SHIFT $\sqrt{}$ 1 2 =	2,289428485

Chú ý. Màn hình MTCT chỉ hiển thị được một số hữu hạn chữ số nên các kết quả là số thập phân vô hạn (tuần hoàn hay không tuần hoàn) đều được làm tròn, chẳng hạn: $\sqrt[3]{12} \approx 2,289428485$.

Ví dụ 2 Sử dụng MTCT, tính $\sqrt[3]{3,25}$ rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.

Giải. Bấm các phím SHIFT $\sqrt{}$ 3 . 2 5 =, màn hình hiện kết quả 1,481248034. Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai ta được $\sqrt[3]{3,25} \approx 1,48$.

Luyện tập 2 Sử dụng MTCT, tính $\sqrt[3]{45}$ và làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005.

Thử thách nhỏ Có thể xếp 125 khối lập phương đơn vị (có cạnh bằng 1 cm) thành một khối lập phương lớn được không nhỉ?

II. CĂN THỨC BẬC BA

Nhận biết căn thức bậc ba

Tương tự như căn thức bậc hai, ta có định nghĩa sau:

Căn thức bậc ba là biểu thức có dạng $\sqrt[3]{A}$, trong đó A là một biểu thức đại số.

Chú ý

- Tương tự căn bậc ba của một số, ta cũng có $\left(\sqrt[3]{A}\right)^3 = \sqrt[3]{A^3} = A$ (A là một biểu thức).
- Để tính giá trị của $\sqrt[3]{A}$ tại những giá trị cho trước của biến, ta thay các giá trị cho trước của biến vào căn thức rồi tính giá trị của biểu thức số nhận được.

Ví dụ 3 Tính giá trị của căn thức $\sqrt[3]{2x+5}$ tại:

- $x = 60$;
- $x = -6,5$.

Giải

- Với $x = 60$ ta có $\sqrt[3]{2 \cdot 60 + 5} = \sqrt[3]{125} = \sqrt[3]{5^3} = 5$.
- Với $x = -6,5$ ta có $\sqrt[3]{2 \cdot (-6,5) + 5} = \sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{(-2)^3} = -2$.

Ví dụ 4 Rút gọn biểu thức $-x + 5 + \sqrt[3]{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}$.

Giải

Ta có $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x + 1)^3$. (hằng đẳng thức lập phương của một tổng)

Do đó $-x + 5 + \sqrt[3]{x^3 + 3x^2 + 3x + 1} = -x + 5 + \sqrt[3]{(x + 1)^3} = -x + 5 + (x + 1) = 6$.

Luyện tập 3

- Tính giá trị của căn thức $\sqrt[3]{5x-1}$ tại $x = 0$ và tại $x = -1,4$.
- Rút gọn biểu thức $\sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}$.



BÀI TẬP

3.23. Tính:

- a) $\sqrt[3]{216}$;
- b) $\sqrt[3]{-512}$;
- c) $\sqrt[3]{-0,001}$;
- d) $\sqrt[3]{1,331}$.

3.24. Sử dụng MTCT, tính các căn bậc ba sau đây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

- a) $\sqrt[3]{2,1}$;
- b) $\sqrt[3]{-18}$;
- c) $\sqrt[3]{-28}$;
- d) $\sqrt[3]{0,35}$.

3.25. Một người thợ muốn làm một thùng tôn hình lập phương có thể tích bằng 730 dm^3 . Em hãy ước lượng chiều dài cạnh thùng khoảng bao nhiêu đềximét.

3.26. Rút gọn các biểu thức sau:

- a) $\sqrt[3]{(1 - \sqrt{2})^3}$;
- b) $\sqrt[3]{(2\sqrt{2} + 1)^3}$;
- c) $\left(\sqrt[3]{\sqrt{2} + 1}\right)^3$.

3.27. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức $\sqrt[3]{27x^3 - 27x^2 + 9x - 1}$ tại $x = 7$.



LUYỆN TẬP

3.21. Sử dụng định nghĩa căn bậc ba của một số thực, tính giá trị của các biểu thức sau:

- a) $\sqrt[3]{-27} + 2\sqrt[3]{\frac{1}{8}} + 5\sqrt[3]{-0,008}$;

$$\text{b) } \sqrt[3]{0,001} - 3\sqrt[3]{\frac{8}{125}} + 2\sqrt[3]{-64}.$$

3.22. Không dùng MTCT, tính giá trị của các biểu thức sau:

$$\text{a) } (\sqrt[3]{64} - \sqrt[3]{27}) \cdot \sqrt[3]{\frac{125}{8}};$$

$$\text{b) } \frac{5\sqrt[3]{-8} - 10\sqrt[3]{0,008} + 3\sqrt[3]{343}}{\sqrt[3]{0,064} + \sqrt[3]{0,125}}.$$

3.23. Tìm x , biết rằng:

$$\text{a) } \sqrt[3]{2x - 1} = 1;$$

$$\text{b) } 5x - \sqrt[3]{64x^3} = 25.$$

3.24. Tương tự căn bậc hai, căn bậc ba có tính chất sau: Nếu $a < b$ thì $\sqrt[3]{a} < \sqrt[3]{b}$. Sử dụng tính chất này, so sánh:

$$\text{a) } 5 \text{ và } \sqrt[3]{123};$$

$$\text{b) } \sqrt[3]{0,009} \text{ và } 0,2.$$

3.25. Tính diện tích tôn cần dùng để làm một cái thùng không nắp hình lập phương chứa được 215 lít nước (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

3.26. Sử dụng MTCT, tính giá trị biểu thức (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba):

a) $P = 2\sqrt[3]{x^2 - 1}$ tại $x = 5$;

b) $P = \sqrt[3]{2x - 1} - \sqrt[3]{x + 1}$ tại $x = 0,5$.

3.27. Khoảng cách trung bình d (tính bằng mét) giữa một hành tinh và Mặt Trời được tính theo công thức

$$d = \sqrt[3]{\frac{10^{19}T^2}{2,97}},$$

trong đó T (tính bằng giây) là thời gian hành tinh quay một vòng quanh Mặt Trời. Biết rằng Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời trong khoảng 365 ngày. Hãy tính khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trời là bao nhiêu triệu kilômét (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

(Theo courses.lumenlearning.com/sunny-or-universityphysics/chapter/13-4-satellite-orbits-and-energy/)

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Rút gọn biểu thức

$$A = \sqrt{(\sqrt{3} + 1)^2} - \sqrt{3(\sqrt{3} + 1)^2} + \sqrt{4}.$$

Giải

Ta có

$$A = \sqrt{(\sqrt{3} + 1)^2} - \sqrt{3} \cdot \sqrt{(\sqrt{3} + 1)^2} + \sqrt{2^2} = (\sqrt{3} + 1) - \sqrt{3}(\sqrt{3} + 1) + 2 = 0.$$

Ví dụ 2

Cho biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}$$

với $x > 1$.

a) Rút gọn P .

b) Sử dụng kết quả câu a, tính giá trị của P khi $x = 101$.

Giải

a)

$$P = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1) + \sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)}{(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 1)} = \frac{x - \sqrt{x} + x + \sqrt{x}}{x - 1} = \frac{2x}{x - 1}.$$

b) Khi $x = 101$ thì

$$P = \frac{2 \cdot 101}{101 - 1} = \frac{202}{100} = 2,02.$$

Ví dụ 3

Người ta cần làm một thùng hình lập phương bằng bìa cứng không có nắp trên và có thể tích 216 dm^3 để đựng đồ. Tính diện tích bìa cứng cần dùng để làm thùng đựng đồ (coi diện tích các mép nối là không đáng kể).

Giải

Gọi x (dm, $x > 0$) là độ dài cạnh của thùng hình lập phương cần làm.

Ta có: $x^3 = 216$, suy ra $x = \sqrt[3]{216} = 6$ (dm).

Vì thùng đựng không có nắp nên thùng gồm 4 mặt bên và 1 mặt đáy, mỗi mặt là một hình vuông cạnh 6 dm. Do đó diện tích bìa cứng cần dùng là

$$S = 5 \cdot 6^2 = 180 \text{ (dm}^2\text{)}.$$



BÀI TẬP

3.28. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\frac{5 + 3\sqrt{5}}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5} - 2};$

$$b) \sqrt{(\sqrt{7} - 2)^2} - \sqrt{63} + \frac{\sqrt{56}}{\sqrt{2}};$$

$$c) \frac{\sqrt{(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2} + \sqrt{(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2}}{2\sqrt{12}};$$

$$d) \frac{\sqrt[3]{(\sqrt{2} + 1)^3} - 1}{\sqrt{50}}.$$

3.29. Tính giá trị của các biểu thức sau:

$$a) 3\sqrt{45} + \frac{5\sqrt{15}}{\sqrt{3}} - 2\sqrt{245};$$

$$b) \frac{\sqrt{12} - \sqrt{4}}{\sqrt{3} - 1} - \frac{\sqrt{21} + \sqrt{7}}{\sqrt{3} + 1} + \sqrt{7};$$

$$c) \frac{3 - \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}} + \sqrt{3}(2\sqrt{3} - 1) + \sqrt{12};$$

$$d) \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3} - 1} - \frac{6}{\sqrt{6}}.$$

3.30. Giả sử lực F của gió khi thổi theo phương vuông góc với bề mặt cánh buồm của một con thuyền tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ của gió, hệ số tỉ lệ là 30. Trong đó, lực F được tính bằng N (Newton) và tốc độ được tính bằng m/s.

a) Khi tốc độ của gió là 10 m/s thì lực F là bao nhiêu Newton?

b) Nếu cánh buồm chỉ có thể chịu được một áp lực tối đa là 12 000 N thì con thuyền đó có thể đi được trong gió với tốc độ gió tối đa là bao nhiêu?

3.31. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt[3]{(-x-1)^3}$;

b) $\sqrt[3]{8x^3 - 12x^2 + 6x - 1}$.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III

A. TRẮC NGHIỆM

3.32. Căn bậc hai của 4 là

- (A) 2. (B) -2 . (C) 2 và -2 . (D) $\sqrt{2}$ và $-\sqrt{2}$.

☐

3.33. Căn bậc hai số học của 49 là

- (A) 7. (B) -7 . (C) 7 và -7 . (D) $\sqrt{7}$ và $-\sqrt{7}$.

☐

3.34. Rút gọn biểu thức $\sqrt[3]{(4 - \sqrt{17})^3}$ ta được

- (A) $4 + \sqrt{17}$. (B) $4 - \sqrt{17}$.
(C) $\sqrt{17} - 4$. (D) $-4 - \sqrt{17}$.

☐

3.35. Độ dài đường kính (mét) của hình tròn có diện tích 4 m^2 sau khi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai bằng

- (A) 2,26. (B) 2,50. (C) 1,13. (D) 1,12.

☐

3.36. Một vật rơi tự do từ độ cao 396,9 m. Biết quãng đường chuyển động S (mét) của vật phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức $S = 4,9t^2$. Vật chạm đất sau

- (A) 8 giây. (B) 5 giây. (C) 11 giây. (D) 9 giây.

☐

B. TỰ LUẬN

3.37. Không sử dụng MTCT, tính giá trị của biểu thức

$$A = \sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2} + \sqrt{4(2 + \sqrt{3})^2} - \frac{1}{2 - \sqrt{3}}.$$

3.38. Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 2} - \frac{4}{\sqrt{x} + 2} \quad (x \geq 0 \text{ và } x \neq 4).$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tính giá trị của A tại $x = 14$.

3.39. Biết rằng nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn được tính bởi công thức $Q = I^2 R t$, trong đó Q là nhiệt lượng tính bằng đơn vị Joule (J), R là điện trở tính bằng đơn vị Ohm (Ω), I là cường độ dòng điện tính bằng đơn vị Ampe (A), t là thời gian tính bằng giây (s). Dòng điện chạy qua một dây dẫn có $R = 10 \Omega$ trong thời gian 5 giây.

a) Thay dấu “?” trong bảng sau bằng các giá trị thích hợp.

I (A)	1	1,5	2
Q (J)	?	?	?

b) Cường độ dòng điện là bao nhiêu Ampe để nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn đạt 800 J?

ÔN TẬP CHƯƠNG III



ÔN TẬP CHƯƠNG III

A. CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- (A) Mọi số thực đều có căn bậc hai.
- (B) Các số thực âm không có căn bậc ba.
- (C) Mọi số thực đều có căn bậc hai số học.
- (D) Các số thực dương có hai căn bậc hai đối nhau.

☐

2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- (A) Mọi số thực dương đều có căn bậc hai.
- (B) Số -216 không có căn bậc ba.
- (C) Số -216 không có căn bậc hai.
- (D) Số -216 không có căn bậc hai số học.

☐

3. Cho biết $3,1^2 = 9,61$. Số nào sau đây là giá trị của $\sqrt{0,000961}$?

- (A) 3,1. (B) 0,31. (C) 0,031. (D) 0,000031.

☐

4. Biểu thức nào sau đây có giá trị khác với các biểu thức còn lại?

- (A) $\sqrt{7^2}$. (B) $\sqrt{(-7)^2}$. (C) $(-\sqrt{7})^2$. (D) $-(\sqrt{7})^2$.

☐

5. Độ dài cạnh khối lập phương có thể tích bằng $0,512 \text{ dm}^3$ là

- (A) 8 cm. (B) 8 dm. (C) 0,8 cm. (D) 0,08 dm.

☐

B. BÀI TẬP

3.28. Thực hiện phép tính:

- a) $\sqrt{12 - \sqrt{23}} \cdot \sqrt{12 + \sqrt{23}}$;
- b) $\left(\sqrt{9 - \sqrt{17}} + \sqrt{9 + \sqrt{17}}\right)^2$.

3.29. So sánh $\sqrt{\sqrt{89 + 24\sqrt{5}}}$ và $\sqrt{1 + \sqrt{122}}$.

3.30. a) Chứng minh rằng

$$\sqrt{3+\sqrt{5}} \cdot \sqrt{3-\sqrt{5}} = 2 \quad \text{và} \quad \sqrt{3+\sqrt{5}} + \sqrt{3-\sqrt{5}} = \sqrt{10}.$$

b) Rút gọn các biểu thức sau:

$$A = \left(\sqrt{3+\sqrt{5}} \right)^3 + \left(\sqrt{3-\sqrt{5}} \right)^3;$$

$$B = \left(\sqrt{3+\sqrt{5}} \right)^5 + \left(\sqrt{3-\sqrt{5}} \right)^5.$$

3.31. Cho x, y là hai số dương thỏa mãn $x^2 + y^2 = 1$. Tính giá trị biểu thức

$$A = x - y + \sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-y^2}.$$

3.32. a) Khai triển $(2 - \sqrt{3})^2$ và $(2\sqrt{3} - 3)^2$ thành những biểu thức không còn bình phương.

b) Sử dụng kết quả câu a, rút gọn các biểu thức sau:

$$A = \sqrt{4 - 2\sqrt{3}} - \sqrt{21 - 12\sqrt{3}};$$

$$B = \sqrt{2 + \sqrt{3}} + \sqrt{4 - 2\sqrt{3}} - \sqrt{21 - 12\sqrt{3}}.$$

Chương IV


Hệ thức lượng trong tam giác vuông



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM


Mở đầu

Ta có thể xác định “góc dốc” α của một đoạn đường dốc khi biết độ dài của dốc là a và độ cao của đỉnh dốc so với đường nằm ngang là h không? (H.4.1). (Trong các tòa chung cư, người ta thường thiết kế đoạn dốc cho người đi xe lăn với góc dốc bé hơn 6°).




I. KHÁI NIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN

Cho tam giác ABC vuông tại A . Xét góc nhọn B . Cạnh AC gọi là cạnh đối của góc B , cạnh AB gọi là cạnh kề của góc B (H.4.2).




Câu hỏi. Xét góc C của tam giác ABC vuông tại A (H.4.3). Hãy chỉ ra cạnh đối và cạnh kề của góc C .

**Khái niệm sin, cosin, tang, cotang của góc nhọn α**

HĐ1. Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác $A'B'C'$ vuông tại A' có $\widehat{B} = \widehat{B'} = \alpha$. Chứng minh rằng:


- a) $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$;
 b) $\frac{AC}{BC} = \frac{A'C'}{B'C'}, \frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}, \frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B'}, \frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'}.$

Nhận xét. Trong Hình 4.4, các tam giác vuông có cùng một góc nhọn α là đồng dạng với nhau. Vì vậy các tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền (cạnh kề và cạnh huyền), cạnh đối và cạnh kề (cạnh kề và cạnh đối) của góc nhọn α là như nhau, cho dù độ dài các cạnh đối (các cạnh kề) của góc α và các cạnh huyền có thể khác nhau với từng tam giác.



Cho góc nhọn α . Xét tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn B bằng α (H.4.5). Ta có:

- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền gọi là sin của α , kí hiệu $\sin \alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền gọi là cosin của α , kí hiệu $\cos \alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc α gọi là tang của α , kí hiệu $\tan \alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc α gọi là cotang của α , kí hiệu $\cot \alpha$.



Chú ý. Ta có:

$$\sin \alpha = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh huyền}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh huyền}};$$


$$\tan \alpha = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}}, \quad \cot \alpha = \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh đối}}.$$

- $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}.$

- $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha, \cot \alpha$ gọi là các tỉ số lượng giác của góc nhọn α .

Sin, cosin của góc nhọn luôn dương và bé hơn 1 vì trong tam giác vuông, cạnh huyền dài nhất.

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm (H.4.6). Hãy tính các tỉ số lượng giác $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha$ với $\alpha = \widehat{B}$.



Giải

Xét $\triangle ABC$ vuông tại A , $\widehat{B} = \alpha$.

Theo Định lí Pythagore, ta có:

$$BC^2 = AC^2 + AB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$$

nên $BC = 5$ (cm).

Theo định nghĩa của tỉ số lượng giác sin, cosin, tang, ta có

$$\sin \alpha = \frac{AC}{BC} = \frac{4}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{AB}{BC} = \frac{3}{5}, \quad \tan \alpha = \frac{AC}{AB} = \frac{4}{3}.$$

$\sin \alpha$ còn được viết là $\sin \widehat{B}$ hay $\sin B$. Tương tự cho $\cos \alpha, \tan \alpha$ và $\cot \alpha$.


Luyện tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm. Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B .

Giá trị lượng giác sin, cosin, tang, cotang của các góc $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$

HD2. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = AC = a$ (H.4.7a).


a) Hãy tính BC và các tỉ số $\frac{AB}{BC}$ và $\frac{AC}{BC}$. Từ đó suy ra $\sin 45^\circ, \cos 45^\circ$.

b) Hãy tính các tỉ số $\frac{AB}{AC}$ và $\frac{AC}{AB}$. Từ đó suy ra $\tan 45^\circ, \cot 45^\circ$.



HĐ3. Xét tam giác đều ABC có cạnh bằng $2a$.


- Tính đường cao AH của tam giác ABC (H.4.7b).
- Tính $\sin 30^\circ$, $\cos 30^\circ$, $\sin 60^\circ$ và $\cos 60^\circ$.
- Tính $\tan 30^\circ$, $\cot 30^\circ$, $\tan 60^\circ$ và $\cot 60^\circ$.



Từ HĐ2 và HĐ3, ta có bảng sau:

α	30°	45°	60°
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\cot \alpha$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C} = 30^\circ$ và $BC = a$ (H.4.8). Tính các cạnh AB , AC theo a .



Giải

Ta có $\sin C = \frac{AB}{BC}$, suy ra $AB = BC \cdot \sin C = a \cdot \sin 30^\circ$.


Theo bảng trên, $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ nên $AB = \frac{a}{2}$.

Tương tự, ta có $\cos C = \frac{AC}{BC}$, suy ra $AC = BC \cdot \cos C = a \cdot \cos 30^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Luyện tập 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C} = 45^\circ$ và $AB = c$. Tính BC và AC theo c .

II. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA HAI GÓC PHỤ NHAU

HD4. Cho tam giác ABC vuông tại C , có $\widehat{A} = \alpha$, $\widehat{B} = \beta$ (H.4.9). Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc α, β theo độ dài các cạnh của tam giác ABC . Trong các tỉ số đó, cho biết các cặp tỉ số bằng nhau.



Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tang góc này bằng cotang góc kia.

Chú ý. Cho α và β là hai góc phụ nhau (H.4.9), khi đó:

$$\sin \alpha = \cos \beta, \quad \cos \alpha = \sin \beta, \quad \tan \alpha = \cot \beta, \quad \cot \alpha = \tan \beta.$$

Về số đo, hai góc phụ nhau có thể coi là hai góc nhọn của một tam giác vuông.

Ví dụ 3. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45° :

$$\sin 60^\circ, \quad \cos 75^\circ, \quad \sin 52^\circ 30', \quad \tan 80^\circ, \quad \cot 82^\circ.$$

Giải

Ta có:

$$\sin 60^\circ = \cos(90^\circ - 60^\circ) = \cos 30^\circ;$$

$$\cos 75^\circ = \sin(90^\circ - 75^\circ) = \sin 15^\circ;$$

$$\sin 52^\circ 30' = \cos(90^\circ - 52^\circ 30') = \cos 37^\circ 30';$$

$$\tan 80^\circ = \cot(90^\circ - 80^\circ) = \cot 10^\circ;$$

$$\cot 82^\circ = \tan(90^\circ - 82^\circ) = \tan 8^\circ.$$

Luyện tập 3. Hãy giải thích tại sao $\sin 35^\circ = \cos 55^\circ$, $\tan 35^\circ = \cot 55^\circ$.

III. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY TÍNH TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỎ

Về số đo góc, dưới đơn vị độ ($^\circ$) còn có các đơn vị phút ($'$) và giây ($''$) với $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$.

Ví dụ 4. Dùng MTCT, tính $\sin 27^\circ$, $\cos 32^\circ 15'$, $\tan 52^\circ 12'$ và $\cot 35^\circ 23'$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

Giải

Đề tính	Bấm phím	Kết quả
$\sin 27^\circ$	$\sin 27^\circ =$	0,4539904997
$\cos 32^\circ 15'$	$\cos 32^\circ 15' =$	0,8457278217
$\tan 52^\circ 12'$	$\tan 52^\circ 12' =$	1,289192232
$\cot 35^\circ 23'$	$\tan 35^\circ 23' = x^{-1} =$	1,408003909

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ta được $\sin 27^\circ \approx 0,454$; $\cos 32^\circ 15' \approx 0,846$; $\tan 52^\circ 12' \approx 1,289$; $\cot 35^\circ 23' \approx 1,408$.

Lưu ý. $\cot 35^\circ 23' = \frac{1}{\tan 35^\circ 23'}$.

Nhận xét. Để tính $\cot 35^\circ 23'$, ta có thể tính trực tiếp như trên, hoặc có thể tìm góc phụ với góc $35^\circ 23'$ là $54^\circ 37'$ rồi dùng MTCT tính $\tan 54^\circ 37'$ và suy ra kết quả.

Luyện tập 4. Sử dụng MTCT tính các tỉ số lượng giác và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba:

- $\sin 40^\circ 54'$;
- $\cos 52^\circ 15'$;
- $\tan 69^\circ 36'$;
- $\cot 25^\circ 18'$.

Chú ý. Sử dụng MTCT, ta còn có thể tìm được góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc đó.

Ví dụ 5. Dùng MTCT, tìm các góc (làm tròn đến phút) biết $\sin \alpha_1 = 0,3214$, $\cos \alpha_2 = 0,4321$, $\tan \alpha_3 = 1,2742$ và $\cot \alpha_4 = 1,5384$.

Giải

Biết	Bấm phím	Kết quả	Bấm tiếp
$\sin \alpha_1 = 0,3214$	SHIFT sin 0 . 3 2 1 4 =	18,74761209	$18^\circ 44' 51,4''$
$\cos \alpha_2 = 0,4321$	SHIFT cos 0 . 4 3 2 1 =	64,39909458	$64^\circ 23' 56,74''$
$\tan \alpha_3 = 1,2742$	SHIFT tan 1 . 2 7 4 2 =	51,87495892	$51^\circ 52' 29,85''$
$\cot \alpha_4 = 1,5384$	SHIFT tan 1 . 5 3 8 4 x^{-1} =	33,02491482	$33^\circ 1' 29,69''$

Làm tròn đến phút ta được $\alpha_1 \approx 18^\circ 45'$; $\alpha_2 \approx 64^\circ 24'$; $\alpha_3 \approx 51^\circ 52'$; $\alpha_4 \approx 33^\circ 1'$.

Chú ý. Để tìm góc α khi biết $\cot \alpha$, ta có thể tìm góc $(90^\circ - \alpha)$ (vì $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha$) rồi suy ra α .


Luyện tập 5. Dùng MTCT, tìm các góc α (làm tròn đến phút), biết:

- a) $\sin \alpha = 0,3782$;
- b) $\cos \alpha = 0,6251$;
- c) $\tan \alpha = 2,154$;
- d) $\cot \alpha = 3,253$.

Vận dụng. Trở lại bài toán ở tình huống mở đầu. Trong một tòa chung cư, biết đoạn dốc vào sảnh tòa nhà dài 4 m, độ cao của đỉnh dốc bằng 0,4 m.

- a) Hãy tính góc dốc.
- b) Hỏi góc đó có đúng tiêu chuẩn của dốc cho người đi xe lăn không?

Tranh luận. Để tính khoảng cách giữa hai địa điểm A, B không đo trực tiếp được, chẳng hạn A và B là hai địa điểm ở hai bên sông, người ta lấy điểm C về phía bờ sông có chứa B sao cho tam giác ABC vuông tại B . Ở bên bờ sông chứa B , người ta đo được $\widehat{ACB} = \alpha$ và $BC = a$ (H.4.10). Với các dữ liệu đó, đã tính được khoảng cách AB chưa? Nếu được, hãy tính AB , biết $\alpha = 55^\circ$, $a = 70$ m.



Không thể tính được AB vì trong tam giác vuông ABC , theo định lý Pythagore, phải biết được hai cạnh mới tính được cạnh thứ ba.

Với các dữ liệu đã biết là có thể tính được khoảng cách AB rồi.

Em hãy cho biết ý kiến của mình.

BÀI TẬP

4.1. Cho tam giác ABC vuông tại A . Tính các tỉ số lượng giác sin, cosin, tang, cotang của các góc nhọn B và C khi biết:

- a) $AB = 8$ cm, $BC = 17$ cm;
- b) $AC = 0,9$ cm, $AB = 1,2$ cm.

4.2. Cho tam giác vuông có một góc nhọn 60° và cạnh kề với góc 60° bằng 3 cm. Hãy tính cạnh đối của góc này.

4.3. Cho tam giác vuông có một góc nhọn bằng 30° và cạnh đối với góc này bằng 5 cm. Tính độ dài cạnh huyền của tam giác.

4.4. Cho hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 3 và $\sqrt{3}$. Tính góc giữa đường chéo và cạnh ngắn hơn của hình chữ nhật (sử dụng bảng giá trị lượng giác trang 69).

4.5. a) Viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45° :

$$\sin 55^\circ, \quad \cos 62^\circ, \quad \tan 57^\circ, \quad \cot 64^\circ.$$

b) Tính $\frac{\tan 25^\circ}{\cot 65^\circ}, \tan 34^\circ - \cot 56^\circ$.

4.6. Dùng MTCT, tính (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba):

a) $\sin 40^\circ 12'$;

b) $\cos 52^\circ 54'$;

c) $\tan 63^\circ 36'$;

d) $\cot 25^\circ 18'$.

4.7. Dùng MTCT, tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) $\sin x = 0,2368$;

b) $\cos x = 0,6224$;

c) $\tan x = 1,236$;

d) $\cot x = 2,154$.



LUYỆN TẬP

4.1. a) Vẽ tam giác ABC vuông tại A , $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Tính BC , $\sin B$, $\cos B$.

b) Vẽ tam giác MNP vuông tại M , $MN = 6$ cm, $MP = 8$ cm. Hỏi hai tam giác ABC , MNP có đồng dạng không? Tính $\sin N$, $\cos N$.

4.2. a) Chứng minh rằng với mọi góc nhọn $\alpha < 45^\circ$, ta có

$$\sin(45^\circ - \alpha) = \cos(45^\circ + \alpha), \quad \cos(45^\circ - \alpha) = \sin(45^\circ + \alpha).$$

b) Không dùng MTCT, tính

$$\sin 25^\circ + \sin 35^\circ + \sin 45^\circ - \cos 45^\circ - \cos 55^\circ - \cos 65^\circ.$$

4.3. Khi góc α lần lượt bằng $10^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 40^\circ$, hãy dùng MTCT tính $\sin \alpha$ trong mỗi trường hợp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

4.4. Hãy dùng MTCT, tìm số đo của góc nhọn α (làm tròn đến độ) trong mỗi trường hợp

a) Khi $\sin \alpha$ lần lượt bằng $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$;

b) Khi $\cos \alpha$ lần lượt bằng $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$.

4.5. Biết rằng với mọi góc nhọn α , ta có $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, không dùng MTCT, hãy tính $\sin^2 25^\circ + \sin^2 35^\circ + \sin^2 45^\circ + \sin^2 55^\circ + \sin^2 65^\circ$.

4.6. Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông đo được 5 cm, 12 cm. Hỏi sin của góc nhọn nhỏ nhất của tam giác đó bằng bao nhiêu?

4.7. Xét tam giác ABC vuông tại B , có $\widehat{A} = 30^\circ$. Tia Bt sao cho $\widehat{CBt} = 30^\circ$ cắt tia AC ở D , D nằm giữa A và C . Chứng minh rằng khoảng cách từ D đến đường thẳng BC bằng $\frac{AB}{4}$.

4.8. Vẽ góc α trong mỗi trường hợp:

a) $\cos \alpha = 0,4$;

b) $\tan \alpha = \frac{2}{3}$;

c) $\cot \alpha = \frac{3}{4}$.

4.9. Một cái thang dài 3,2 m đặt tựa bức tường, đầu thang đặt đến độ cao 3 m thì thang tạo với mặt đất góc α xấp xỉ bằng bao nhiêu độ (H.4.6)?

4.10. Một cái điều có dây điều dài 8 m, khi dây điều căng thì điều bay ở độ cao 6 m. Hỏi khi đó dây điều tạo với phương ngang của mặt đất góc nhọn α xấp xỉ bằng bao nhiêu độ (H.4.7)?

4.11. Chứng minh tam giác vuông có một góc nhọn có tang bằng 1 là tam giác vuông cân.

4.12. a) Tính các góc của tam giác vuông có một góc nhọn có tang bằng $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

b) Một hình chữ nhật có kích thước 3 và $\sqrt{3}$. Tính các góc tạo bởi đường chéo và cạnh của hình chữ nhật đó.

4.13. Dùng MTCT, hãy tìm tang và cotang của góc nhọn α khi α lần lượt bằng 10° , 20° , 30° , 40° (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

4.14. Tính tang, cotang của góc kề đáy của tam giác cân biết cạnh đáy dài 8 cm, đường cao ứng với đáy dài 5 cm.

4.15. Dùng định nghĩa tỉ số lượng giác $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$ hãy chứng minh rằng:

a) $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$; $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$;

b) $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$.

4.16. Cho góc α có $\tan \alpha = \frac{3}{4}$. Tính $\sin \alpha$, $\cos \alpha$.

4.17. Với $\alpha < \beta < 90^\circ$, chứng minh rằng:

a) $\cos \alpha > \cos \beta$ (HD. Sử dụng Ví dụ 5 và bài 4.15);

b) $\sin \alpha < \sin \beta$ (HD. Sử dụng công thức $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$).



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM


Kiến thức, kĩ năng

- Giải thích một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
- Giải tam giác vuông.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Để đo chiều cao của một toà lâu đài (H.4.11), người ta đặt giác kế thẳng đứng tại điểm M . Quay ống ngắm của giác kế sao cho nhìn thấy đỉnh P' của toà lâu đài dưới góc nhọn α . Sau đó, đặt giác kế thẳng đứng tại điểm N , $NM = 20$ m, thì nhìn thấy đỉnh P' dưới góc nhọn β ($\beta < \alpha$). Biết chiều cao giác kế là 1,6 m, hãy tính chiều cao của toà lâu đài.

I. HỆ THỨC GIỮA CẠNH HUYỀN VÀ CẠNH GÓC VUÔNG**Công thức tính cạnh góc vuông theo cạnh huyền và sin, cosin của các góc nhọn**

HD1 Cho tam giác ABC vuông tại A , cạnh huyền a và các cạnh góc vuông b, c (H.4.12).



Hình 4.12

- Viết các tỉ số lượng giác sin, cosin của góc B và góc C theo độ dài các cạnh của tam giác ABC .
- Tính mỗi cạnh góc vuông b và c theo cạnh huyền a và các tỉ số lượng giác trên của góc B và góc C .

Định lí 1

Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề.

Chú ý. Trong tam giác ABC vuông tại A (H.4.12), ta có:

$$b = a \cdot \sin B = a \cdot \cos C; \quad c = a \cdot \sin C = a \cdot \cos B.$$

Ví dụ 1. Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc 500 km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 30° (H.4.13). Hỏi sau 1,2 phút, máy bay lên cao được bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng?

Giải.

Giả sử trong Hình 4.13, AB là đoạn đường máy bay bay lên trong 1,2 phút thì BH chính là độ cao máy bay đạt được sau 1,2 phút đó.

Ta có 1,2 phút = $\frac{1}{50}$ giờ nên $AB = 500 \cdot \frac{1}{50} = 10$ (km).

Tam giác ABH vuông tại H , có $\widehat{A} = 30^\circ$. Theo Định lí 1, ta có

$$BH = AB \cdot \sin A = 10 \cdot \sin 30^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5 \text{ (km)}.$$

Vậy sau 1,2 phút, máy bay lên cao được 5 km.


Luyện tập 1.

1. Một chiếc thang dài 3 m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến số thập phân thứ hai) để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” 65° (tức là đảm bảo thang chắc chắn khi sử dụng) (H.4.14)?
2. Một khúc sông rộng khoảng 250 m. Một con đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320 m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy con đò đi lệch một góc α bằng bao nhiêu độ (làm tròn đến phút)? (H.4.15).

II. HỆ THỨC GIỮA HAI CẠNH GÓC VUÔNG

Công thức tính cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông kia và tang, cotang của các góc nhọn

HD2 Xét tam giác ABC trong Hình 4.16.



Hình 4.16

- a) Viết các tỉ số lượng giác tang, cotang của góc B và góc C theo b, c .
- b) Tính mỗi cạnh góc vuông b và c theo cạnh góc vuông kia và các tỉ số lượng giác trên của góc B và góc C .

Định lí 2

Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với cotang góc kề.

Chú ý. Trong tam giác ABC vuông tại A (H.4.16), ta có:

$$b = c \cdot \tan B = c \cdot \cot C; \quad c = b \cdot \tan C = b \cdot \cot B.$$

Ví dụ 2. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một toà tháp trên mặt đất dài 8,6 m (H.4.17). Tính chiều cao của toà tháp đó (làm tròn đến mét).

Giải. Ta nhận thấy đường cao của tháp đối diện với góc 34° (góc tạo bởi tia nắng mặt trời và bóng của tháp trên mặt đất).


Theo Định lí 2, ta có $h = 8,6 \cdot \tan 34^\circ \approx 6$ (m).

Vậy chiều cao của tháp là khoảng 6 m.

Luyện tập 2. Bóng trên mặt đất của một cây dài 25 m. Tính chiều cao của cây (làm tròn đến dm), biết rằng tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc 40° (H.4.18).

III. GIẢI TAM GIÁC VUÔNG

Ví dụ 3. Cho tam giác vuông ABC với các cạnh góc vuông $AB = 5$, $AC = 8$ (H.4.19). Hãy tính cạnh BC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và các góc B , C (làm tròn đến độ).



Hình 4.19

Giải. Xét $\triangle ABC$ vuông tại A .

Cách 1. Theo định lí Pythagore, ta có:

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{5^2 + 8^2} = \sqrt{89} \approx 9,4.$$

Ta có

$$\tan C = \frac{AB}{AC} = \frac{5}{8} = 0,625.$$

Từ đó tìm được $\widehat{C} \approx 32^\circ$, suy ra

$$\widehat{B} = 90^\circ - \widehat{C} \approx 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ.$$

Cách 2. Sau khi tìm được $\widehat{C} \approx 32^\circ$, ta tính cạnh BC .

Ta có


$$\sin 32^\circ \approx \sin C = \frac{AB}{BC} = \frac{5}{BC},$$

suy ra

$$BC \approx \frac{5}{\sin 32^\circ} \approx 9,4.$$

Luyện tập 3. Cho tam giác vuông ABC có cạnh góc vuông $AB = 4$, cạnh huyền $BC = 8$. Tính cạnh AC (làm tròn đến số thập phân thứ ba) và các góc B, C (làm tròn đến độ).

Ví dụ 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$, $\widehat{B} = 42^\circ$ (H.4.20). Tính góc C và các cạnh AC, BC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).



Hình 4.20

Giải. Xét $\triangle ABC$ vuông tại A .

Ta có:

$$\widehat{C} = 90^\circ - \widehat{B} = 90^\circ - 42^\circ = 48^\circ;$$

$$AC = AB \cdot \tan B = 3 \cdot \tan 42^\circ \approx 2,701.$$


Theo định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn, ta có:

$$\cos B = \frac{AB}{BC}, \quad \text{suy ra} \quad BC = \frac{AB}{\cos B} = \frac{3}{\cos 42^\circ} \approx 4,037.$$

Giải tam giác vuông là gì?

Trong một tam giác vuông, nếu cho biết trước hai cạnh (hoặc một góc nhọn và một cạnh) thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh và các góc còn lại của tam giác vuông đó. Bài toán này gọi là bài toán Giải tam giác vuông.

Ví dụ 3, Luyện tập 3 và Ví dụ 4 là những bài toán Giải tam giác vuông.



Hình 4.21

Câu hỏi

1. Hãy nêu cách giải tam giác ABC vuông tại A khi biết hai cạnh $AB = c$, $AC = b$ hoặc $AB = c$, $BC = a$ và không sử dụng định lý Pythagore (H.4.21).

2. Hãy nêu cách giải tam giác ABC vuông tại A khi biết cạnh góc vuông AB (hoặc cạnh huyền BC) và góc B .

Luyện tập 4. Giải tam giác ABC vuông tại A , biết $BC = 9$, $\widehat{C} = 53^\circ$.

Vận dụng. Giải bài toán ở tình huống mở đầu với $\alpha = 27^\circ$ và $\beta = 19^\circ$.

**BÀI TẬP**

4.8. Giải tam giác ABC vuông tại A có $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, trong các trường hợp:

- a) $a = 21$, $b = 18$;

- b) $b = 10$, $\widehat{C} = 30^\circ$;

c) $c = 5, b = 3$.

4.9. Tính góc nghiêng α của thùng xe chở rác trong Hình 4.22.

4.10. Tìm góc nghiêng α và chiều rộng AB của mái nhà kho trong Hình 4.23.

4.11. Tính các góc của hình thoi có hai đường chéo dài $2\sqrt{3}$ và 2.

4.12. Cho hình thang $ABCD$ ($AD \parallel BC$) có $AD = 16$ cm, $BC = 4$ cm và $\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{ACD} = 90^\circ$.

a) Kẻ đường cao CE của tam giác ACD . Chứng minh $\widehat{ADC} = \widehat{ACE}$. Tính sin của các góc $\widehat{ADC}$, $\widehat{ACE}$ và suy ra $AC^2 = AE \cdot AD$. Từ đó tính AC .

b) Tính góc D của hình thang.

4.13. Một người đứng tại điểm A , cách gương phẳng đặt nằm trên mặt đất tại điểm B là 1,2 m, nhìn thấy hình phản chiếu qua gương B của ngọn cây (cây có gốc ở tại điểm C cách B là 4,8 m, B nằm giữa A và C). Biết khoảng cách từ mặt đất đến mắt người đó là 1,65 m. Tính chiều cao của cây (H.4.24).



LUYỆN TẬP

4.18. Cho tam giác ABC vuông tại A với đường cao AH . Hãy tính $\cos C$ theo hai cách và suy ra $AC^2 = BC \cdot HC$.

4.19. Gọi AH là đường cao của tam giác ABC vuông tại A . Tính $\tan \widehat{ABH}$ và $\tan \widehat{CAH}$, suy ra $AH^2 = BH \cdot CH$.

4.20. Cho tam giác ABC vuông tại A , AH là đường cao. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}.$$

4.21. Cho tam giác ABC có $BC = 11$ cm, $\widehat{ABC} = 38^\circ$, $\widehat{ACB} = 30^\circ$. Gọi H là chân của đường vuông góc kẻ từ A đến BC . Hãy tính AH .

4.22. Giải tam giác ABC vuông tại A , với $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$ trong các trường hợp (cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba):

a) $a = 5$, $\widehat{B} = 50^\circ$;

b) $b = 5$, $\widehat{B} = 40^\circ$;

c) $b = 5$, $\widehat{C} = 55^\circ$.


4.23. Cho A, B là hai địa điểm ở hai bên bờ sông, biết AN và PM cùng vuông góc MN , $MN = n$ (mét), $MP = p$ (mét), $p > n$ và $\widehat{MPA} = \alpha$ (H.4.12).

Chứng minh rằng:

$$AB = \frac{p \tan \alpha - n}{\sin \alpha}.$$

4.24. Một người đứng xa toà nhà 100 m, dùng giác kế thẳng đứng ngắm thấy điểm trên nóc nhà với góc nhìn 15° (so với phương nằm ngang) (H.4.13). Hỏi toà nhà cao bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất), biết chiều cao của giác kế là 1,7 m?


4.25. Hai trạm quan trắc tàu biển đặt ở hai mỏm núi A và B cách nhau 2 km, nhìn thấy chiếc tàu C ở phía xa với $\widehat{CAB} = 50^\circ$, $\widehat{CBA} = 45^\circ$ (H.4.14). Hỏi tàu còn cách đường thẳng AB bao nhiêu mét?



Hình 4.14

4.26. Trong một trận chiến đấu, một máy bay của đối phương bay ở độ cao 1 800 m. Khẩu pháo cao xạ ngắm chiếc máy bay đó dưới một góc 35° so với phương nằm ngang. Tính khoảng cách từ pháo cao xạ đến máy bay (làm tròn đến mét).

4.27. Từ một đài quan sát ở cạnh bờ biển, có độ cao 300 m so với mặt biển, nhìn thấy một con tàu dưới một góc 25° (so với phương nằm ngang của mực nước biển (H.4.15)). Hỏi khoảng cách từ tàu đến đài quan sát xấp xỉ bao nhiêu mét?


*Hình 4.15*

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm.

- Tính các tỉ số lượng giác của góc B .
- Từ kết quả câu a) suy ra các tỉ số lượng giác của góc C .



Hình 4.25

Giải (H.4.25)

a) Xét tam giác ABC vuông tại A . Theo định lí Pythagore, ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 5^2 + 12^2 = 169,$$

suy ra $BC = 13$ cm.

Ta có:

$$\begin{aligned}\sin B &= \frac{AC}{BC} = \frac{12}{13}, & \cos B &= \frac{AB}{BC} = \frac{5}{13}, \\ \tan B &= \frac{AC}{AB} = \frac{12}{5}, & \cot B &= \frac{AB}{AC} = \frac{5}{12}.\end{aligned}$$


b) Do $\widehat{B} + \widehat{C} = 90^\circ$ nên

$$\begin{aligned}\sin C &= \cos B = \frac{5}{13}, & \cos C &= \sin B = \frac{12}{13}, \\ \tan C &= \cot B = \frac{5}{12}, & \cot C &= \tan B = \frac{12}{5}.\end{aligned}$$

Ví dụ 2

Một bức tường đang xây dở có dạng hình thang vuông $ABCD$, vuông góc ở A và D , $AB = 1$ m, $CD = 4$ m, $AD = 6$ m.

- Hỏi góc α tạo bởi đường thẳng BC và mặt đất AD có số đo xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến phút)? (H.4.26)
- Tính độ dài cạnh BC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Hình 4.26

Giải

a) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC . Qua B kẻ đường thẳng song song với AD (mặt đất) cắt CD ở E thì khi đó $\widehat{EBC} = \widehat{DIC} = \alpha$ (hai góc đồng vị).

Tứ giác $ABED$ có $BE \parallel AD$, $AB \parallel DE$, $\widehat{A} = 90^\circ$ nên $ABED$ là hình chữ nhật.

Do đó $BE = AD = 6$ m, $EC = CD - ED = 4 - 1 = 3$ (m).

Xét $\triangle BCE$ vuông tại E , ta có

$$\tan \alpha = \tan \widehat{EBC} = \frac{EC}{BE} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Từ đó tính được $\alpha \approx 26^\circ 34'$.

b) Cách 1. Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác BEC vuông tại E , ta có:

$$BC^2 = BE^2 + EC^2 = 6^2 + 3^2 = 45.$$

Suy ra $BC = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6,7$ (m).

Cách 2. Tam giác BEC vuông tại E nên $EC = BC \cdot \sin \alpha$, suy ra


$$BC = \frac{EC}{\sin \alpha} = \frac{3}{\sin 26^\circ 34'} \approx 6,7 \text{ (m)}.$$

**BÀI TẬP**

4.14. Một cuốn sách khổ 17×24 cm, tức là chiều rộng 17 cm, chiều dài 24 cm. Gọi α là góc giữa đường chéo và cạnh 17 cm. Tính $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) và tính số đo α (làm tròn đến độ).


4.15. Cho tam giác ABC có chân đường cao AH nằm giữa B và C . Biết $HB = 3$ cm, $HC = 6$ cm, $\widehat{HAC} = 60^\circ$. Hãy tính độ dài các cạnh (làm tròn đến cm), số đo các góc của tam giác ABC (làm tròn đến độ).

4.16. Tìm chiều rộng d của dòng sông trong Hình 4.27 (làm tròn đến m).




Hình 4.27

4.17. Tính các số liệu còn thiếu (dấu “?”) ở Hình 4.28 với góc làm tròn đến độ, với độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.




Hình 4.28

4.18. Một bạn muốn tính khoảng cách giữa hai địa điểm A, B ở hai bên hồ nước. Biết rằng các khoảng cách từ một điểm C đến A và đến B là $CA = 90$ m, $CB = 150$ m và $\widehat{ACB} = 120^\circ$ (H.4.29). Hãy tính AB giúp bạn.




Hình 4.29

4.19. Mặt cắt ngang của một đập ngăn nước có dạng hình thang $ABCD$ (H.4.30). Chiều rộng của mặt trên AB của đập là 3 m. Độ dốc của sườn AD , tức là $\tan D = 1,25$. Độ dốc của sườn BC , tức là $\tan C = 1,5$. Chiều cao của đập là 3,5 m. Hãy tính chiều rộng CD của chân đập, chiều dài của các sườn AD và BC (làm tròn đến dm).



Hình 4.30

4.20. Trong một buổi tập trận, một tàu ngầm đang ở trên mặt biển bắt đầu di chuyển theo đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc 21° để lặn xuống (H.4.31).



Hình 4.31

- Khi tàu chuyển động theo hướng đó và đi được 200 m thì tàu ở độ sâu bao nhiêu so với mặt nước biển? (làm tròn đến m).
- Giả sử tốc độ của tàu là 9 km/h thì sau bao lâu (tính từ lúc bắt đầu lặn) tàu ở độ sâu 200 m (tức là cách mặt nước biển 200 m)?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV

A. TRẮC NGHIỆM


4.21. Trong Hình 4.32, $\cos \alpha$ bằng

A. $\frac{5}{3}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{3}{5}$.

D. $\frac{4}{5}$.



Hình 4.32


4.22. Trong tam giác MNP vuông tại M (H.4.33), $\sin \widehat{MNP}$ bằng

A. $\frac{PN}{MN}$.

B. $\frac{MP}{PN}$.

C. $\frac{MN}{PN}$.

D. $\frac{MN}{MP}$.



Hình 4.33


4.23. Trong tam giác ABC vuông tại A (H.4.34), $\tan B$ bằng

A. $\frac{AB}{AC}$.

B. $\frac{AC}{AB}$.

C. $\frac{AB}{BC}$.

D. $\frac{BC}{AC}$.



Hình 4.34

4.24. Với mọi góc nhọn α , ta có

A. $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$.

B. $\tan(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$.

C. $\cot(90^\circ - \alpha) = 1 - \tan \alpha$.

D. $\cot(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.



4.25. Giá trị $\tan 30^\circ$ bằng

A. $\sqrt{3}$.

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$.


D. 1.




B. TỰ LUẬN

4.26. Xét các tam giác vuông có một góc nhọn bằng hai lần góc nhọn còn lại. Hỏi các tam giác đó có đồng dạng với nhau không? Tính sin và cosin của góc nhọn lớn hơn.

4.27. Hình 4.35 là mô hình của một túp lều. Tìm góc α giữa cạnh mái lều và mặt đất (làm tròn kết quả đến phút).




4.28. Một cây cao bị gãy, ngọn cây đổ xuống mặt đất. Ba điểm: gốc cây, điểm gãy, ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn cây gãy tạo với mặt đất góc 20° và chắn ngang lối đi một đoạn 5 m (H.4.36). Hỏi trước khi bị gãy, cây cao khoảng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



4.29. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\widehat{B} = \alpha$ (H.4.37).

a) Hãy viết các tỉ số lượng giác $\sin \alpha$, $\cos \alpha$.

b) Sử dụng định lý Pythagore, chứng minh rằng $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.




Hình 4.37

4.30. ĐỐ VUI. Chu vi Trái Đất bằng bao nhiêu?

Vào khoảng năm 200 trước Công nguyên, Eratosthenes (Ô-ra-tô-xten), một nhà toán học và thiên văn học người Hy Lạp, đã ước lượng được “chu vi” của Trái Đất (chu vi của đường Xích Đạo) nhờ hai quan sát sau:

1. Hồi đó, hằng năm cứ vào trưa ngày Hạ chí (21/6), người ta thấy tia sáng mặt trời chiếu thẳng xuống đáy một cái giếng sâu nổi tiếng ở thành phố Syene (Xy-en), tức là tia sáng chiếu thẳng đứng.
2. Cùng vào trưa một ngày Hạ chí, ở thành phố Alexandria (A-lếch-xăng-đri-a) cách Syene 800 km, Eratosthenes thấy một tháp cao 25 m có bóng trên mặt đất dài 3,1 m.

Từ hai quan sát trên, ông có thể tính xấp xỉ “chu vi” của Trái Đất như thế nào? (trên Hình 4.38, điểm O là tâm Trái Đất, điểm S tượng trưng cho thành phố Syene, điểm A tượng trưng cho thành phố Alexandria, điểm H là đỉnh của tháp, bóng của tháp trên mặt đất được coi là đoạn thẳng AB).



Hình 4.38



ÔN TẬP CHƯƠNG IV

A. CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Tam giác ABC vuông tại A thì:

A. $\sin B + \cos C = 0$.

B. $\sin C + \cos B = 0$.

C. $\sin B - \cos C = 0$.

D. $\cos B + \cos C = 0$.

2. Tam giác ABC vuông tại A thì:

A. $\tan B + \tan C = 0$.

B. $\tan B + \cot C = 0$.

C. $\tan B - \cot C = 0$.

D. $\cot B + \cot C = 0$.

3. Chọn câu **sai**:Góc nhọn α có $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ thì

A. $\frac{1}{\tan \alpha} = \sqrt{3}$.

B. $\frac{1}{\sin \alpha} = 2$.

C. $\tan^2 \alpha = \frac{1}{3}$.


D. $\cos^2 \alpha = \frac{1}{4}$.

**B. BÀI TẬP**

4.28. Chứng minh nếu một góc nhọn của một tam giác vuông có số đo gấp đôi số đo góc nhọn kia thì tam giác đó có một cạnh dài gấp đôi một trong hai cạnh còn lại.

4.29. Xét điểm B nằm giữa hai điểm A và H . Giả sử có điểm D sao cho DH vuông góc với AB và $\widehat{DAH} = 15^\circ$, $\widehat{DBH} = 30^\circ$. Chứng minh rằng $HD = \frac{AB}{2}$.

4.30. Cho hai toà nhà cách nhau 32 m. Tại điểm A trên nóc toà nhà cao nhìn xuống nóc D và chân C của toà nhà thấp lần lượt theo các góc 15° và 43° (so với phương nằm ngang) (H.4.16). Tính chiều cao của hai toà nhà đó (làm tròn đến m).




Hình 4.16


4.31. Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh tháp Pisa ở Italia là 58 mét, tháp nghiêng góc $5^\circ 30'$ đối với phương thẳng đứng (H.4.17). Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất thì bóng của tháp dài bao nhiêu decimét?

4.32. Cho tam giác ABC có đường cao AH , $\widehat{B} = 60^\circ$, $\widehat{C} = 45^\circ$ và cạnh $BC = 6$ cm. Chứng minh rằng $AH = 3(3 - \sqrt{3})$ cm.


4.33. Tính khoảng cách giữa hai địa điểm A, B ở hai bên hồ nước (không đo trực tiếp được), biết khoảng cách từ một địa điểm C đến A và đến B là $CA = 90$ m, $CB = 150$ m, $\widehat{CAB} = 120^\circ$ (làm tròn đến m) (H.4.18).



4.34. Một cầu thủ đứng cách khung thành 18 m, đá quả bóng sát mặt đất, nghiêng một góc 20° so với phương vuông góc với khung thành, tới điểm M của khung thành (H.4.19). Tính khoảng cách từ cầu thủ đến điểm M (làm tròn đến dm).




4.35. Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như trong Hình 4.20. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến m), biết $IK = 380$ m.




Hình 4.20

4.36. Tìm độ dài dây cáp mắc giữa hai cọc ở vị trí C, D trên hai bên bờ vực như trong Hình 4.21 (làm tròn đến mét).



Hình 4.21

4.37. Một người đứng cách chân ngọn hải đăng 50 m, nhìn xuống chân hải đăng dưới góc 2° và nhìn lên đỉnh ngọn hải đăng dưới góc 45° (so với đường nằm ngang) (H.4.22). Tính chiều cao ngọn hải đăng (làm tròn đến mét).



Hình 4.22

Chương V

Đường tròn



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
- Đường tròn, tâm, bán kính - Tâm đối xứng - Trục đối xứng	- Nhận biết một điểm thuộc hay không thuộc một đường tròn. - Nhận biết hai điểm đối xứng nhau qua một tâm, qua một trục. - Nhận biết tâm đối xứng và trục đối xứng của đường tròn.

Bạn Oanh có một mảnh giấy hình tròn nhưng không còn dấu vết của tâm. Theo em, Oanh làm thế nào để tìm lại được tâm của hình tròn đó.

I. ĐƯỜNG TRÒN

Đường tròn, điểm thuộc đường tròn

Ở lớp dưới các em đã biết cách dùng compa để vẽ đường tròn. Vậy đường tròn là gì? Ta định nghĩa:


Đường tròn tâm O bán kính R ($R > 0$), kí hiệu là $(O; R)$, là hình gồm tất cả các điểm cách điểm O một khoảng bằng R .

- Khi không cần đề ý đến bán kính ta kí hiệu đường tròn tâm O là (O) .
- Nếu A là một điểm của đường tròn (O) thì ta viết $A \in (O)$. Khi đó, ta còn nói đường tròn (O) đi qua điểm A , hay điểm A nằm trên đường tròn (O) .

Nhận xét

1) Trên Hình 5.1, ta thấy điểm A nằm trên, điểm C nằm trong và điểm B nằm ngoài đường tròn (O) . Một cách tổng quát, ta có:

- Điểm M nằm trên đường tròn $(O; R)$ nếu $OM = R$;
- Điểm M nằm trong đường tròn $(O; R)$ nếu $OM < R$;
- Điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ nếu $OM > R$.



Hình 5.1


2) Hình tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm nằm trên và nằm trong đường tròn $(O; R)$.

Ví dụ 1

Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB . Chứng minh rằng đường tròn $(O; OA)$ đi qua B .

Giải (H.5.2)

Vì O là trung điểm của đoạn AB nên $OB = OA$. Do đó $B \in (O; OA)$, nói cách khác, đường tròn $(O; OA)$ đi qua B .



Hình 5.2

Chú ý. Ở lớp dưới, ta đã biết đoạn AB trong Ví dụ 1 là một đường kính của đường tròn (O) . Do đó (O) còn gọi là đường tròn đường kính AB .

Luyện tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A . Chứng minh rằng điểm A thuộc đường tròn đường kính BC .

Vận dụng 1

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(3; 0)$, $B(-2; 0)$, $C(0; 4)$. Vẽ hình và cho biết trong các điểm đã cho, điểm nào nằm trên, điểm nào nằm trong, điểm nào nằm ngoài đường tròn $(O; 3)$?


II. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Đối xứng tâm và đối xứng trục

1) Đối xứng tâm (H.5.3)

Hai điểm M và M' gọi là đối xứng với nhau qua điểm I (hay qua tâm I) nếu I là trung điểm của đoạn MM' .

Chẳng hạn, nếu O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$ thì $OA = OC$ nên A và C đối xứng với nhau qua O . Tương tự, B và D đối xứng với nhau qua O .




Hình 5.3

2) Đối xứng trục (H.5.4)

Hai điểm M và M' gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d (hay qua trục d) nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng MM' .

Chẳng hạn, nếu AH là đường cao trong tam giác ABC cân tại A thì AH cũng là đường trung trực của BC , nên B và C đối xứng với nhau qua AH .



Hình 5.4

Tâm và trục đối xứng của đường tròn

HĐ Chứng minh rằng nếu một điểm thuộc đường tròn (O) thì:

a) Điểm đối xứng với nó qua tâm O cũng thuộc (O) .

b) Điểm đối xứng với nó qua một đường thẳng d tùy ý đi qua O cũng thuộc (O) .

Khi đó ta nói O là tâm đối xứng của đường tròn (O) ; d là trục đối xứng của đường tròn (O) , ta có:


- Đường tròn là hình có tâm đối xứng; tâm của đường tròn là tâm đối xứng của nó.
- Đường tròn là hình có trục đối xứng; mỗi đường thẳng qua tâm của đường tròn là một trục đối xứng của nó.

Đường tròn có một tâm đối xứng, nhưng có vô số trục đối xứng.

Ví dụ 2

Cho điểm M nằm trên đường tròn (O) đường kính AB . Sử dụng tính đối xứng của (O) , hãy nêu cách tìm:

- Điểm N đối xứng với điểm M qua tâm O ;
- Điểm P đối xứng với điểm M qua đường thẳng AB .



Hình 5.5

Giải (H.5.5)

a) Do O là tâm đối xứng của (O) nên điểm N đối xứng với điểm M qua tâm O phải vừa thuộc (O) , vừa thuộc OM . Vậy N là giao điểm của (O) với đường thẳng OM .

b) Do AB là trục đối xứng của (O) nên điểm P đối xứng với điểm M qua AB phải vừa thuộc (O) , vừa thuộc đường vuông góc hạ từ M xuống AB . Vậy P là giao điểm của (O) với đường thẳng đi qua M và vuông góc với AB .

Luyện tập 2

Cho đường tròn tâm O và hai điểm A, B thuộc (O) . Gọi d là đường trung trực của đoạn AB . Chứng minh rằng d là một trục đối xứng của (O) .

Vận dụng 2

Trở lại tình huống mở đầu, bằng cách gấp đôi mảnh giấy hình tròn theo hai cách khác nhau, Oanh có thể tìm lại được tâm của hình tròn. Em hãy làm thử xem.

BÀI TẬP

5.1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $M(0; 2)$, $N(0; -3)$ và $P(2; -1)$. Vẽ hình và cho biết trong các điểm đã cho, điểm nào nằm trên, điểm nào nằm trong, điểm nào nằm ngoài đường tròn $(O; \sqrt{5})$? Vì sao?

5.2. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Chứng minh rằng các điểm A, B, C thuộc cùng một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

5.3. Cho đường tròn (O) , đường thẳng d đi qua O và điểm A thuộc (O) nhưng không thuộc d . Gọi B là điểm đối xứng với A qua d , C và D lần lượt là điểm đối xứng với A và B qua O .

a) Ba điểm B , C và D có thuộc (O) không? Vì sao?

b) Chứng minh tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật.

c) Chứng minh rằng C và D đối xứng với nhau qua d .

5.4. Cho hình vuông $ABCD$ có E là giao điểm của hai đường chéo.

a) Chứng minh rằng có một đường tròn đi qua bốn điểm A , B , C và D . Xác định tâm đối xứng và chỉ ra hai trục đối xứng của đường tròn đó.

b) Tính bán kính của đường tròn ở câu a, biết rằng hình vuông có cạnh bằng 3 cm.



LUYỆN TẬP

5.1. Các bánh xe (xe đạp, ô tô,...) đều có dạng hình tròn (với tâm tại trục của bánh xe). Hãy giải thích lý do.

5.2. Cho đường tròn (O) có bán kính bằng 2,5 cm và hai tia Ox , Oy vuông góc với nhau tại O . Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 3$ cm; trên tia Oy lấy điểm B sao cho $OB = 4$ cm. Gọi M là trung điểm của đoạn AB . Chứng minh rằng điểm M nằm trên đường tròn (O) .

5.3. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(0; -3)$ và $B(2; 0)$. Gọi C và D là các điểm lần lượt đối xứng với A và B qua O .

a) Xác định tọa độ của hai điểm C và D .

b) Xác định vị trí của các điểm A, B, C và D đối với đường tròn $(O; 3)$.

5.4. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(3; 1)$. Gọi B, C và D là các điểm đối xứng với A lần lượt qua trục hoành, qua gốc O và qua trục tung.

a) Xác định tọa độ của ba điểm B, C và D .

b) Có hay không một đường tròn đi qua bốn điểm A, B, C và D . Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó, nếu có.

5.5. Cho đường tròn (O) , đường kính AB và điểm M thuộc (O) (M không trùng với điểm nào trong hai điểm A và B). Trên (O) lấy điểm N nằm khác phía của M đối với đường thẳng AB sao cho $AM = BN$. Chứng minh rằng O là trung điểm của đoạn MN .



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Mở đầu


Trong các cuộc thi đấu thể thao, người ta thường tổ chức thi bắn cung. Thuở xưa, cây cung được làm ra bằng cách buộc một sợi dây (gọi là dây cung) vào hai đầu của một đoạn tre (hoặc gỗ) có tính đàn hồi cao. Đoạn tre bị kéo căng, cong lại tạo nên hình ảnh của một phần đường tròn, đó cũng chính là hình ảnh của “cung” trong Toán học. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến khái niệm này.

I. DÂY VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Khái niệm dây và đường kính của đường tròn

- Đoạn thẳng nối hai điểm tùy ý của một đường tròn gọi là một **dây** (hay **dây cung**) của đường tròn.
- Mỗi dây đi qua tâm là một **đường kính** của đường tròn. Để thấy đường kính của đường tròn bán kính R có độ dài bằng $2R$.

Trên Hình 5.6, CD là một dây, AB là một đường kính của (O) .




Hình 5.6

Quan hệ giữa dây và đường kính

HĐ. Xét dây AB tùy ý không đi qua tâm của đường tròn $(O; R)$ (H.5.7).

Dựa vào quan hệ giữa các cạnh của tam giác AOB , chứng minh $AB < 2R$.




Hình 5.7

Định lý

Trong một đường tròn, đường kính là dây cung lớn nhất.

Ví dụ 1. Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{BAC} = \widehat{BDC} = 90^\circ$. Chứng minh bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn và $AD < BC$.



Hình 5.8

Giải (H.5.8)

Gọi O là trung điểm của đoạn BC . Tam giác ABC vuông tại A ($\widehat{BAC} = 90^\circ$) nên đường trung tuyến AO bằng nửa cạnh huyền, nghĩa là

$$OA = OB = OC = \frac{BC}{2}.$$

Do đó điểm A nằm trên đường tròn (O) đường kính BC .

Tương tự, bằng cách xét tam giác DBC ta cũng suy ra điểm D thuộc đường tròn (O). Vậy AD là một dây (không đi qua tâm) của đường tròn (O). Áp dụng định lí trên ta có $AD < BC$.


Luyện tập 1. Cho đường tròn đường kính BC . Chứng minh rằng với điểm A bất kì (khác B và C) nằm trên đường tròn, ta đều có $BC < AB + AC < 2BC$.

II. GÓC Ở TÂM, CUNG VÀ SỐ ĐO CỦA MỘT CUNG**Khái niệm góc ở tâm và cung tròn**

Cho hai điểm A và B cùng thuộc một đường tròn. Hai điểm ấy chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một **cung tròn** (hay **cung**). Hai điểm A và B gọi là hai mút (hay đầu mút) của mỗi cung đó.

Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn.

Trên Hình 5.9, ta có hai cung, kí hiệu là $\widehat{AmB}$ và $\widehat{AnB}$ nhưng chỉ có một góc ở tâm là $\widehat{AOB}$.




Hình 5.9

Chú ý

- Khi góc AOB không bẹt thì cung nằm trong góc AOB gọi là *cung nhỏ* (trên Hình 5.9, $\widehat{AmB}$ là cung nhỏ). Khi đó $\widehat{AmB}$ còn có thể kí hiệu gọn là $\widehat{AB}$. Cung còn lại, $\widehat{AnB}$ gọi là *cung lớn*. Khi góc AOB bẹt thì mỗi cung AB được gọi là một *nửa đường tròn*.
- Ta còn nói góc AOB chắn cung AB hay cung AB bị chắn bởi góc AOB .

Ví dụ 2. Cho ba điểm A, B và C thuộc đường tròn (O) như Hình 5.10.

- Tìm các góc ở tâm có hai cạnh đi qua hai trong ba điểm A, B, C .
- Tìm các cung có hai mút là hai trong ba điểm A, B, C .



Hình 5.10

Giải

a) Các góc ở tâm cần tìm là $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$ và $\widehat{COA}$.

b)

- Các cung có hai mút A, B là $\widehat{AB}$, $\widehat{ACB}$.
- Các cung có hai mút A, C là $\widehat{AC}$, $\widehat{ABC}$.
- Các cung có hai mút B, C là $\widehat{BC}$, $\widehat{BAC}$.

Cách xác định số đo của một cung

1) **Số đo của một cung** được xác định như sau:

- Số đo của nửa đường tròn bằng 180° .
- Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.
- Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 360° và số đo của cung nhỏ có chung hai mút.

2) Số đo của cung AB được kí hiệu là số $\widehat{AB}$. Trên Hình 5.9, ta có:

$$\text{sđ } \widehat{AmB} = \widehat{AOB} = \alpha \quad (0^\circ < \alpha \leq 180^\circ); \quad \text{sđ } \widehat{AnB} = 360^\circ - \alpha.$$

Chú ý

- Cung có số đo n° còn gọi là cung n° . Cả đường tròn được coi là cung 360° . Đôi khi ta cũng coi một điểm là cung 0° .
- Hai cung trên một đường tròn gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng số đo.


? Tại sao số đo cung lớn của một đường tròn luôn lớn hơn 180° ?

Nhận xét

Nếu A là một điểm thuộc cung BAC thì

$$\text{sđ } \widehat{BAC} = \text{sđ } \widehat{BA} + \text{sđ } \widehat{AC} \quad (\text{H.5.10}).$$

Ví dụ 3. Tính số đo của các cung có các đầu mút là hai trong các điểm A, B, C trong Hình 5.11, biết rằng ABC là tam giác vuông cân tại đỉnh A .



Hình 5.11

Giải

- Trên Hình 5.11, ta thấy $\widehat{AB}$ và $\widehat{AC}$ là các cung nhỏ bị chắn bởi các góc ở tâm thứ tự là $\widehat{AOB}$ và $\widehat{AOC}$. Do tam giác ABC vuông cân tại A nên đường trung tuyến AO cũng là đường cao, tức là $AO \perp BC$. Do đó $\widehat{AOB} = \widehat{AOC} = 90^\circ$, suy ra $sđ \widehat{AB} = sđ \widehat{AC} = 90^\circ$.
- $\widehat{ACB}$ là cung lớn có chung hai mút A, B với cung nhỏ AB nên

$$sđ \widehat{ACB} = 360^\circ - sđ \widehat{AB} = 360^\circ - 90^\circ = 270^\circ.$$

Tương tự, ta có:

$$sđ \widehat{ABC} = 360^\circ - sđ \widehat{AC} = 360^\circ - 90^\circ = 270^\circ.$$

Ngoài ra còn có hai nửa đường tròn có chung hai mút A và B , có số đo bằng 180° .

Luyện tập 2. Cho điểm C nằm trên đường tròn (O) . Đường trung trực của đoạn OC cắt (O) tại A và B . Tính số đo của các cung $\widehat{ACB}$ và $\widehat{ABC}$.

BÀI TẬP

5.5. Cho nửa đường tròn đường kính AB và một điểm M tùy ý thuộc nửa đường tròn đó.

Chứng minh rằng khoảng cách từ M đến AB không lớn hơn $\frac{AB}{2}$.

5.6. Cho đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$ và AB là một dây bất kì của đường tròn đó. Biết $AB = 6 \text{ cm}$.

a) Tính khoảng cách từ O đến đường thẳng AB .

b) Tính $\tan \alpha$ nếu góc ở tâm chắn cung AB bằng 2α .

5.7. Tâm O của một đường tròn cách dây AB của nó một khoảng 3 cm. Tính bán kính của đường tròn (O), biết rằng cung nhỏ AB có số đo bằng 100° (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

5.8. Trên mặt một chiếc đồng hồ có các vạch chia như Hình 5.12. Hỏi cứ sau mỗi khoảng thời gian 36 phút:

a) Đầu kim phút vạch nên một cung có số đo bằng bao nhiêu độ?

b) Đầu kim giờ vạch nên một cung có số đo bằng bao nhiêu độ?

**LUYỆN TẬP**

5.6. Cho tam giác nhọn ABC , hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H . Chứng minh rằng:

a) Bốn điểm A, E, H, D cùng thuộc một đường tròn.

b) $AH > DE$.

5.7. Cho tam giác cân ABC ($AB = AC$). Gọi (O) là đường tròn đi qua ba điểm A, B, C và E là điểm trên cung nhỏ BC sao cho $\widehat{BE} = \widehat{EC}$.

a) Chứng minh rằng ba điểm A, O, E thẳng hàng.

b) Gọi H là chân đường cao hạ từ A xuống BC . Chứng minh rằng $AH < AE$.

5.8. Gọi H là trung điểm của dây AB không đi qua tâm của đường tròn (O).

a) Chứng minh rằng bán kính $OH \perp AB$.

b) Tính khoảng cách từ O đến AB , biết rằng $AB = 8$ cm và bán kính của (O) bằng 5 cm.

5.9. Kim giờ và kim phút của một chiếc đồng hồ tạo thành góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào mỗi thời điểm sau:

- a) 3 giờ?
 - b) 6 giờ?
 - c) 8 giờ?
 - d) 11 giờ?
-
-

5.10. Cho ba điểm A , B và C nằm trên đường tròn (O) sao cho $\widehat{AOB} = 110^\circ$ và $\text{sđ } \widehat{AC} = 50^\circ$. Tính số đo của cung lớn BC .

ĐỘ DÀI CỦA CUNG TRÒN. DIỆN TÍCH HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
- Hình quạt tròn - Hình vành khuyên	- Tính độ dài cung tròn. - Tính diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên.

Số người trên một địa bàn đã được tiêm mũi 4 phòng dịch Covid-19 đạt 40% trong tổng số các đối tượng cần được tiêm. Để hoàn thành một biểu đồ hình quạt tròn, Trang cần vẽ hình quạt tròn biểu thị số liệu 40%. Em có thể giúp bạn Trang được không?

I. ĐỘ DÀI CỦA CUNG TRÒN

Công thức tính độ dài của cung tròn

Người ta chứng minh được rằng tỉ số giữa chu vi và đường kính của một đường tròn luôn bằng một số vô tỉ không đổi gọi là số π (đọc là pi). Ta có thể tìm được giá trị gần đúng của π nhờ máy tính cầm tay. Trong đời sống, ta thường lấy $\pi \approx 3,14$.

Do đó, ta có công thức tính độ dài C của đường tròn $(O; R)$, đường kính $d = 2R$ là:

$$C = \pi d = 2\pi R. \quad (1)$$

HD1 Biết rằng trên một đường tròn, hai cung bằng nhau thì có cùng độ dài và độ dài của cung tỉ lệ với số đo của nó. Từ đó hãy lập công thức tính độ dài cung n° của đường tròn bán kính R bằng cách thực hiện các bước sau:

a) Từ (1), tính độ dài của cung 1° .

b) Tính độ dài l của cung n° .

Ta có công thức tính độ dài l của cung n° trên đường tròn $(O; R)$:

$$l = \frac{n}{180} \pi R. \quad (2)$$

Nhận xét. Từ hai công thức (1) và (2), ta được

$$l = \frac{n}{360} \pi d = \frac{n}{360} C \quad \text{hay} \quad \frac{l}{C} = \frac{n}{360},$$

nghĩa là:

Tỉ số giữa độ dài cung n° và độ dài đường tròn (cùng bán kính) đúng bằng $\frac{n}{360}$.

Ví dụ 1 Cho A và B là hai điểm trên đường tròn $(O; 3 \text{ cm})$ sao cho $\widehat{AOB} = 120^\circ$. Tính số đo và độ dài các cung có hai mút A, B .

Giải (H.5.13)

Ta có hai cung:

- Cung nhỏ AB bị chắn bởi góc ở tâm AOB .

Do đó $sđ\widehat{AB} = \widehat{AOB} = 120^\circ$;

Độ dài l_1 của cung AB là:


$$l_1 = \frac{120}{180} \pi \cdot 3 = 2\pi \text{ (cm)}.$$

- Cung lớn AmB có số đo là:

$$sđ\widehat{AmB} = 360^\circ - 120^\circ = 240^\circ.$$

Độ dài l_2 của cung AmB là:

$$l_2 = \frac{240}{180} \pi \cdot 3 = 4\pi \text{ (cm)}.$$



Hình 5.13

Luyện tập 1 Tính độ dài cung 40° của đường tròn bán kính 9 cm.

Vận dụng 1 Bánh xe (khi bơm căng) của một chiếc xe đạp có đường kính 650 mm. Biết rằng khi giò đĩa quay một vòng thì bánh xe quay được khoảng 3,3 vòng (H.5.14). Hỏi chiếc xe đạp di chuyển được quãng đường dài bao nhiêu mét sau khi người đi xe đạp 10 vòng liên tục?


Hướng dẫn: Khi bánh xe quay 3,3 vòng thì mỗi điểm trên bánh xe di chuyển được một độ dài bằng 3,3 lần chu vi đường tròn.

II. HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN


Hình tròn, hình quạt tròn và hình vành khuyên

1) **Hình quạt tròn** là phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai đầu mút của cung đó (H.5.15).

2) **Hình vành khuyên** (còn gọi là hình vành khăn) (H.5.16) là phần nằm giữa hai đường tròn có cùng tâm và bán kính khác nhau (còn gọi là *hai đường tròn đồng tâm*).



Hình 5.15



Hình 5.16

Em hãy tìm một số hình ảnh của hình quạt tròn và hình vành khuyên trong thực tế.

Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên

Ta đã biết, diện tích hình tròn bán kính R được tính theo công thức $S = \pi R^2$. Hãy thực hiện các hoạt động sau để tìm công thức tính diện tích của hình quạt tròn và hình vành khuyên.

HD2 Biết rằng hai hình quạt tròn ứng với hai cung bằng nhau trên một đường tròn thì có diện tích bằng nhau và diện tích hình quạt tròn tỉ lệ với số đo của cung tương ứng với nó. Hãy thiết lập công thức tính diện tích hình quạt tròn bán kính R ứng với cung n° bằng cách thực hiện từng bước sau:

- Tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung 1° ;
- Tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung n° .

HD3 Thiết lập công thức tính diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính là R và r ($R > r$).

- Diện tích S_q của hình quạt tròn bán kính R ứng với cung n° :

$$S_q = \frac{n}{360} \pi R^2 = \frac{lR}{2}. \quad (3)$$

- Diện tích S_v của hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có bán kính R và r :

$$S_v = \pi(R^2 - r^2) \quad (\text{với } R > r). \quad (4)$$

Nhận xét

Công thức (3) có thể viết là

$$S_q = \frac{n}{360} S \quad \text{hay} \quad \frac{S_q}{S} = \frac{n}{360} = \frac{l}{C},$$

nghĩa là:

Tỉ số giữa diện tích hình quạt tròn ứng với cung n° và diện tích hình tròn (cùng bán kính) đúng bằng $\frac{n}{360}$ và bằng tỉ số giữa độ dài cung n° và độ dài đường tròn.

Ví dụ 2 Tính diện tích của hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính là 3 m và 5 m.

Giải

Gọi S_v là diện tích cần tính.

Ta có $S_v = \pi(5^2 - 3^2) = 16\pi \text{ (m}^2\text{)}$.

Ví dụ 3 Tính diện tích của hình quạt tròn bán kính 5 cm và có độ dài cung tương ứng với nó bằng 4π cm.

Giải

Theo đề bài, hình quạt tròn có độ dài cung tương ứng với nó là $l = 4\pi$ cm, bán kính là $R = 5$ cm. Do đó theo (3), diện tích S của nó là:

$$S = \frac{lR}{2} = \frac{4\pi \cdot 5}{2} = 10\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Thực hành

Trở lại tình huống mở đầu. Hãy vẽ (tô màu) hình quạt tròn theo hướng dẫn sau:

- Vẽ đường tròn tâm O (với bán kính tùy chọn).
- Hình quạt tròn cần vẽ ứng với cung có số đo bằng 40% của 360° . Tính số đo của cung cần vẽ.
- Vẽ góc ở tâm có số đo tìm được và tô màu hình quạt tròn tương ứng.

Luyện tập 2 Tính diện tích của hình quạt tròn đã vẽ trong Thực hành trên nếu bán kính của nó bằng 4 cm.

Vận dụng 2 Một tấm bia tạo bởi năm đường tròn đồng tâm lần lượt có bán kính là 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm và 30 cm (H.5.17). Giả thiết rằng người chơi ném phi tiêu một cách ngẫu nhiên và luôn trúng bia. Tính xác suất ném trúng vòng 8 (hình vành khuyên nằm giữa đường tròn thứ hai và thứ ba), biết rằng xác suất cần tìm bằng tỉ số giữa diện tích của hình vành khuyên tương ứng với diện tích của hình tròn lớn nhất.

**BÀI TẬP**

5.9. Cho đường tròn $(O; 4 \text{ cm})$ và ba điểm A, B, C trên đường tròn đó sao cho tam giác ABC cân tại đỉnh A và số đo của cung nhỏ BC bằng 70° .

a) Giải thích tại sao hai cung nhỏ AB và AC bằng nhau.

b) Tính độ dài của các cung BC, AB và AC (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

5.10. Tính diện tích của hình quạt tròn bán kính 4 cm, ứng với cung 36° .

5.11. Tính diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính là 6 cm và 4 cm.

5.12. Có hai chiếc bánh pizza hình tròn (H.5.18). Chiếc bánh thứ nhất có đường kính 16 cm được cắt thành 6 miếng đều nhau có dạng hình quạt tròn. Chiếc bánh thứ hai có đường kính 18 cm được cắt thành 8 miếng đều nhau có dạng hình quạt tròn. Hãy so sánh diện tích bề mặt của hai miếng bánh cắt ra từ chiếc bánh thứ nhất và thứ hai.

5.13. Một chiếc quạt giấy khi xoè ra có dạng nửa hình tròn bán kính 2,2 dm như Hình 5.19. Tính diện tích phần giấy của chiếc quạt, biết rằng khi gấp lại, phần giấy có chiều dài khoảng 1,6 dm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của dm^2).



LUYỆN TẬP

5.11. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 75^\circ$ và $AB = 6$ cm. Vẽ đường tròn (D) , bán kính 6 cm.

a) Chứng minh rằng $A, C \in (D)$.


b) Tính độ dài cung nhỏ AC và diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ AC .

5.12. Độ dài của một cung tròn bằng $\frac{2}{5}$ chu vi của hình tròn có cùng bán kính. Tính diện tích của hình quạt tròn ứng với cung tròn đó, biết diện tích của hình tròn là $S = 20 \text{ cm}^2$.

5.13. Trên bờ của một cái ao cá hình tròn, người ta dựng ba cái chòi câu cá tại các điểm A , B và C . Biết rằng tam giác ABC cân tại B và có $AB = BC = 10$ m, $\widehat{ABC} = 120^\circ$ (H.5.5).

a) Tính bán kính của ao cá.


b) Tính độ dài quãng đường (men theo bờ ao) từ chòi A đến chòi B và chòi C (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



Hình 5.5

5.14. Giả định rằng Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo tròn có bán kính khoảng 150 triệu kilômét và phải hết đúng một năm (365 ngày) để hoàn thành một vòng quay. Hãy tính quãng đường Trái Đất đi được trong một ngày (làm tròn đến hàng nghìn theo đơn vị kilômét).

5.15. Năm học vừa qua, kết quả xếp loại học lực cuối năm học sinh của một huyện được biểu thị trong biểu đồ hình quạt tròn như hình bên:



Hãy tìm số đo của các cung tròn tương ứng với mỗi hình quạt biểu thị các số liệu cho trên hình.

5.16. Một chiếc bánh pizza hình tròn được chia thành 8 miếng như nhau bởi 4 nhát cắt qua tâm (H.5.6).

- a) Mỗi miếng bánh có dạng một hình quạt tròn ứng với cung bao nhiêu độ?
-
- b) Người ta chọn một chiếc hộp có đáy là hình vuông để đặt lọt chiếc bánh vào trong đó (mà vẫn giữ nguyên hình tròn). Hỏi mỗi cạnh đáy của chiếc hộp đó tối thiểu phải dài bao nhiêu centimét (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng diện tích bề mặt mỗi miếng bánh bằng 60 cm^2 ?
-
-
-

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Cho tam giác nhọn ABC cân tại A . Từ B và C kẻ lần lượt hai đường cao BH và CK của tam giác ABC .

- Chứng minh rằng đường tròn tâm O đường kính BC đi qua K và H .
- Chứng minh rằng hai cung nhỏ BH và CK bằng nhau.
- Tính số đo của cung nhỏ KH nếu $\widehat{BAC} = 40^\circ$.

Giải (H.5.20; học sinh tự ghi giả thiết, kết luận)

a) Đặt $R = \frac{BC}{2} = OB = OC$. Khi đó $(O; R)$ là đường tròn đường kính BC . Dễ thấy HO là trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông HBC nên $OH = \frac{BC}{2} = R$. Do đó $H \in (O; R)$.

Tương tự, ta cũng có $K \in (O; R)$.

Vậy đường tròn $(O; R)$ đi qua các điểm K và H .

b) Hai tam giác vuông HBC và KCB có chung cạnh huyền BC và $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$ (do tam giác ABC cân tại A) nên $\triangle HBC = \triangle KCB$, suy ra $BH = CK$. Do đó $\triangle BOH = \triangle COK$ (vì $BO = CO$, $OH = OK$, $BH = CK$). Từ đó ta có $\widehat{BOH} = \widehat{COK}$.

Mặt khác, số $\widehat{BH} = \widehat{BOH}$, số $\widehat{CK} = \widehat{COK}$, do đó $\widehat{BH} = \widehat{CK}$.

c) Ba tam giác cân ABC , OCH và OBK có các góc ở đáy bằng nhau nên ba góc ở đỉnh cũng bằng nhau. Bởi vậy ta có

$$\widehat{BOK} = \widehat{HOC} = \widehat{BAC} = 40^\circ.$$

Mặt khác, $\widehat{BOK} + \widehat{KOH} + \widehat{HOC} = \widehat{BOC} = 180^\circ$. Do đó

$$\widehat{KOH} = 180^\circ - \widehat{BOK} - \widehat{HOC} = 100^\circ.$$

Do $\widehat{KOH}$ là góc ở tâm khác góc bẹt nên $\widehat{KH}$ là cung nhỏ. Do đó số $\widehat{KH} = \widehat{KOH} = 100^\circ$.

Ví dụ 2

Ta gọi hình giới hạn bởi một cung nhỏ của một đường tròn và dây căng cung đó là hình viên phân. Lập công thức tính diện tích hình viên phân ứng với cung 90° , biết bán kính của đường tròn là R .

Giải

Giả sử AB là cung có số đo 90° ; S là diện tích hình viên phân (phần tô màu trên Hình 5.21) và S_q là diện tích của hình quạt ứng với cung đó; S_t là diện tích hình tam giác OAB .

Ta có

$$S_q = \frac{90}{360} \pi R^2 = \frac{1}{4} \pi R^2, \quad S_t = \frac{1}{2} OA \cdot OB = \frac{1}{2} R^2.$$

Do đó

$$S = S_q - S_t = \frac{1}{4} \pi R^2 - \frac{1}{2} R^2 = R^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right).$$



BÀI TẬP

5.14. Cho dây AB không qua tâm của đường tròn (O) . Gọi A' và B' là hai điểm lần lượt đối xứng với A và B qua O . Hỏi đường trung trực của $A'B'$ có phải là trục đối xứng của (O) hay không? Tại sao?

5.15. Cho tam giác ABC không là tam giác vuông. Gọi H và K là chân các đường vuông góc lần lượt hạ từ B và C xuống AC và AB . Chứng minh rằng:

a) Đường tròn đường kính BC đi qua các điểm H và K ;

b) $KH < BC$.

5.16. Có thể xem guồng nước (còn gọi là cọn nước) là một công cụ hay cỗ máy có dạng hình tròn, quay được nhờ sức nước chảy (H.5.22a). Guồng nước thường thấy ở các vùng miền núi. Nhiều guồng nước được làm bằng tre, dùng để đưa nước lên ruộng cao, giã gạo hoặc làm một số việc khác.

Giả sử ngăn nước ngăn cách giữa phần trên và phần dưới nước của một guồng nước được biểu thị bởi cung ứng với một dây dài 4 m và điểm ngập sâu nhất là 0,5 m (trên Hình 5.22b, điểm ngập sâu nhất là điểm C , ta có $AB = 4$ m và $HC = 0,5$ m). Dựa vào đó, em hãy tính bán kính của guồng nước.

5.17. Cho đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$.

a) Hãy nêu cách vẽ dây AB sao cho khoảng cách từ điểm O đến dây AB bằng 2,5 cm.

b) Tính độ dài của dây AB trong câu a (làm tròn đến hàng phần trăm).

c) Tính số đo và độ dài của cung nhỏ AB .

d) Tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ AB .

5.18. Ba bộ phận truyền chuyển động của một chiếc xe đạp gồm một giò đĩa (bánh răng gắn với bàn đạp), một chiếc líp (cũng có dạng bánh răng) gắn với bánh xe và bộ xích (H.5.23). Biết rằng giò đĩa có bán kính 15 cm, líp có bán kính 4 cm và bánh xe có đường kính 65 cm. Hỏi khi người đi xe đạp một vòng thì xe chạy được quãng đường dài bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần chục)?

5.19. Cho tam giác đều ABC có $AB = 2\sqrt{3}$ cm. Nửa đường tròn đường kính BC cắt hai cạnh AB và AC lần lượt tại D và E (khác B và C) (H.5.24).

a) Chứng tỏ rằng ba cung nhỏ BD , DE và EC bằng nhau. Tính số đo mỗi cung ấy.

b) Tính diện tích của hình viên phân (xem Ví dụ 2) giới hạn bởi dây BD và cung nhỏ BD .



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
- Tiếp tuyến - Tiếp điểm - Hai tiếp tuyến cắt nhau	- Mô tả và vẽ hình biểu thị ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: cắt nhau, tiếp xúc nhau, không giao nhau. - Nhận biết tiếp tuyến của đường tròn dựa vào định nghĩa hoặc dấu hiệu nhận biết. - Áp dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong giải toán.


Người ta gieo một đồng xu hình tròn bán kính 1 cm lên một tờ giấy trải phẳng. Trên tờ giấy đó có vẽ những đường thẳng song song cách đều, tức là những đường thẳng song song mà khoảng cách giữa hai đường thẳng bất kì nằm cạnh nhau luôn bằng nhau. Nếu khoảng cách ấy luôn bằng 2 cm thì có thể xảy ra những trường hợp nào sau đây, vì sao?

- Đồng xu đè lên một đường thẳng (đồng xu che khuất một phần của đường thẳng).
- Đồng xu không đè lên đường thẳng nào;
- Đồng xu đè lên nhiều hơn một đường thẳng.

I. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Số điểm chung của đường thẳng và đường tròn

HĐ1 Cho đường thẳng a và điểm O . Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ O xuống a , và A là một điểm thuộc tia OH . Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy vẽ đường tròn $(O; OA)$ và cho biết đường thẳng a và đường tròn $(O; OA)$ có bao nhiêu điểm chung?




Hình 5.25

- Đường thẳng a và đường tròn (O) gọi là **cắt nhau** nếu chúng có đúng hai điểm chung (H.5.26a).
- Đường thẳng a và đường tròn (O) gọi là **tiếp xúc với nhau** nếu chúng có duy nhất một điểm chung H . Điểm chung ấy gọi là **tiếp điểm**. Khi đó, đường thẳng a còn gọi là **tiếp tuyến** của đường tròn (O) tại H (H.5.26b).
- Đường thẳng a và đường tròn (O) gọi là **không giao nhau** nếu chúng không có điểm chung (H.5.26c).

Nhận xét

1) Cho đường thẳng a và đường tròn $(O; R)$. Gọi d là khoảng cách từ O đến a . Từ HĐ1, ta nhận thấy: Đường thẳng a và đường tròn $(O; R)$ cắt nhau khi $d < R$ (H.5.26a), tiếp xúc với nhau khi $d = R$ (H.5.26b) và không giao nhau khi $d > R$ (H.5.26c).



Hình 5.26

2) Nếu đường thẳng a tiếp xúc với đường tròn (O) tại H thì $OH \perp a$.

Luyện tập 1 Cho đường thẳng a và điểm O cách a một khoảng bằng 4 cm. Không vẽ hình, hãy dự đoán xem mỗi đường tròn sau cắt, tiếp xúc hay không cắt đường thẳng a . Tại sao?

- $(O; 3 \text{ cm})$;
- $(O; 5 \text{ cm})$;
- $(O; 4 \text{ cm})$.

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc với nhau khi nào?


HĐ2 Cho đoạn thẳng OH và đường thẳng a vuông góc với OH tại H .

- Xác định khoảng cách từ O đến đường thẳng a .
- Nếu vẽ đường tròn $(O; OH)$ thì đường tròn này và đường thẳng a có vị trí tương đối như thế nào?

Định lý 1 (Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến)

Nếu một đường thẳng đi qua một điểm nằm trên một đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn.

Ví dụ 1 Cho AB là một dây không đi qua tâm của đường tròn (O) . Đường thẳng qua O và vuông góc với AB cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở điểm C . Chứng minh rằng CB là một tiếp tuyến của (O) .



Hình 5.27

Giải (H.5.27)

Gọi D là giao điểm của AB và OC .

Trong tam giác cân AOB ($OA = OB$), đường cao OD (do $OC \perp AB$) cũng là đường phân giác của góc O , suy ra $\widehat{O_1} = \widehat{O_2}$.

Ta có $\triangle AOC = \triangle BOC$ (c.g.c), vì OC là cạnh chung, $\widehat{O_1} = \widehat{O_2}$ và $OA = OB$.

Từ đó $\widehat{OBC} = \widehat{OAC} = 90^\circ$ (do OA là tiếp tuyến), tức là CB vuông góc với bán kính OB tại B .

Do đó theo định lí 1, CB cũng là tiếp tuyến của (O) .

Luyện tập 2 Cho một hình vuông có độ dài mỗi cạnh bằng 6 cm và hai đường chéo cắt nhau tại I . Chứng minh rằng đường tròn $(I; 3 \text{ cm})$ tiếp xúc với cả bốn cạnh của hình vuông.

Thực hành Cho đường thẳng a và điểm M không thuộc a . Hãy vẽ đường tròn tâm M tiếp xúc với a .

Vận dụng Trở lại tình huống mở đầu. Ở đây, ta hiểu đồng xu nằm đè lên một đường thẳng khi đường tròn (hình ảnh của đồng xu) và đường thẳng ấy cắt nhau.

Bằng cách xét vị trí của tâm đồng xu trong một dải nằm giữa hai đường thẳng song song cạnh nhau (cách đều hoặc không cách đều hai đường thẳng đó), hãy chứng minh rằng chỉ xảy ra các trường hợp a và b, không thể xảy ra trường hợp c.

III. HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU CỦA MỘT ĐƯỜNG TRÒN

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

HĐ3 Cho điểm P ở bên ngoài một đường tròn tâm O . Hãy dùng thước và compa thực hiện các bước vẽ hình như sau:

- Vẽ đường tròn đường kính PO cắt đường tròn (O) tại A và B ;
- Vẽ và chứng tỏ các đường thẳng PA và PB là hai tiếp tuyến của (O) .

PA và PB gọi là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn (O) .


HĐ4 (Dựa vào hình vẽ có được sau HĐ3). Bằng cách xét hai tam giác OPA và OPB , chứng minh rằng:

- $PA = PB$;
- PO là tia phân giác của góc APB ;
- OP là tia phân giác của góc AOB .

Định lý 2

Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt nhau tại điểm P thì:


- Điểm P cách đều hai tiếp điểm;
- PO là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến;
- OP là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính qua hai tiếp điểm.



Hình 5.28

Ví dụ 2 Cho hai tiếp tuyến PA và PB của đường tròn $(O; R)$ (A và B là hai tiếp điểm).

- Chứng minh rằng $OP \perp AB$;
- Tính PA và PB , biết $R = 2$ cm và $PO = 4$ cm.



Hình 5.29

Giải (H.5.29)

a) Do OA và OB là hai tiếp tuyến cắt nhau của (O) nên theo Định lý 2, ta có OP là tia phân giác của góc AOB . Trong tam giác cân AOB ($OA = OB$), đường phân giác OP cũng là đường cao nên ta có $OP \perp AB$.

b) Tam giác OAP có $\widehat{OAP} = 90^\circ$ (do PA tiếp xúc với đường tròn (O) tại A) và $OA = R = 2$ cm và $OP = 4$ cm (giả thiết).

Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông OAP ta có $AP^2 + OA^2 = OP^2$.

Từ đó suy ra:

$$AP^2 = OP^2 - OA^2 = 4^2 - 2^2 = 12.$$

Vậy $AP = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ (cm).

Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, ta cũng có $BP = AP = 2\sqrt{3}$ cm.

Thử thách nhỏ Cho góc xPy và điểm A thuộc tia Px . Hãy vẽ đường tròn tâm O tiếp xúc với cả hai cạnh của góc xPy sao cho A là một trong hai tiếp điểm.



BÀI TẬP

5.20. Bạn Thanh cắt 4 hình tròn bằng giấy có bán kính lần lượt là 4 cm, 6 cm, 7 cm và 8 cm để dán trang trí trên một mảnh giấy, trên đó có vẽ trước hai đường thẳng a và b . Biết rằng a và b là hai đường thẳng song song với nhau và cách nhau một khoảng 6 cm (nghĩa là mọi điểm trên đường thẳng b đều cách a một khoảng 6 cm). Hỏi nếu bạn Thanh dán sao cho tâm của cả 4 hình tròn đều nằm trên đường thẳng b thì hình nào đè lên đường thẳng a , hình nào không đè lên đường thẳng a ?

5.21. Cho đường tròn (O) đi qua ba đỉnh A , B và C của một tam giác cân tại A . Chứng minh rằng đường thẳng đi qua A và song song với BC là một tiếp tuyến của (O) .

5.22. Cho góc xOy với đường phân giác Ot và điểm A trên cạnh Ox , điểm B trên cạnh Oy sao cho $OA = OB$. Đường thẳng qua A và vuông góc với Ox cắt Ot tại P . Chứng minh rằng OA và OB là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn $(P; PA)$.

5.23. Cho SA và SB là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn (O) (A và B là hai tiếp điểm). Gọi M là một điểm tùy ý trên cung nhỏ AB . Tiếp tuyến của (O) tại M cắt SA tại E và cắt SB tại F .

a) Chứng minh rằng chu vi của tam giác SEF bằng $SA + SB$.

b) Giả sử M là giao điểm của đoạn SO với đường tròn (O) . Chứng minh rằng $SE = SF$.



LUYỆN TẬP

5.17. Cho đường tròn (O) và điểm P .

a) Giả sử $P \in (O)$. Vẽ đường thẳng a đi qua P và vuông góc với OP . Chứng minh rằng a là tiếp tuyến

của đường tròn (O) tại P .

- b) Giả sử P nằm ngoài (O) . Vẽ đường tròn đường kính OP . Đường tròn vừa vẽ cắt (O) tại A và B . Chứng minh rằng PA và PB là hai tiếp tuyến của (O) .

5.18. Cho đường thẳng a , điểm M thuộc a và số dương R .

Vẽ đường thẳng b đi qua M và vuông góc với a . Trên b xác định điểm A sao cho $AM = R$ (đvdd). Chứng minh rằng đường tròn $(A; R)$ tiếp xúc với a tại M . Ta có thể vẽ được mấy đường tròn như thế?

Chú ý. Hai bài tập trên giới thiệu cách vẽ tiếp tuyến của một đường tròn (bài tập 5.17) và cách vẽ đường tròn tiếp xúc với một đường thẳng cho trước (bài tập 5.18). Các em cần theo cách đó để vẽ hình khi giải toán.

5.19. Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngoài (O) . Từ M kẻ tiếp tuyến MA với (O) , trong đó A là tiếp điểm. Đường thẳng qua A và vuông góc với MO cắt (O) tại B (khác A).

- a) Chứng minh rằng MB là tiếp tuyến của (O) ;

- b) Tính OM và diện tích phần của tam giác AMB nằm bên ngoài (O) , biết bán kính của (O) bằng 3 cm và $\widehat{MAB} = 60^\circ$.

5.20. Cho AM và AN là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn (O) , trong đó M và N là hai tiếp điểm. Gọi E là một điểm thuộc cung nhỏ MN . Tiếp tuyến của (O) tại E cắt AM tại B và cắt AN tại C . Biết $AB = 10$ cm, $AC = 7$ cm và $BC = 6$ cm. Tính độ dài của các đoạn thẳng AM , AN , BM và CN .

5.21. Cho tam giác ABC vuông tại A , có đường cao AH .

- a) Chứng minh rằng BC tiếp xúc với đường tròn (A) bán kính AH ;

b) Gọi M và N là các điểm đối xứng với H lần lượt qua AB và AC . Chứng minh rằng BM và CN là hai tiếp tuyến của (A) ;

c) Chứng minh rằng MN là một đường kính của (A) ;

d) Tính diện tích của tứ giác $BMNC$, biết $HB = 2$ cm và $HC = 4,5$ cm.



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
- Hai đường tròn cắt nhau - Hai đường tròn tiếp xúc nhau - Hai đường tròn không giao nhau. - Tiếp điểm	Nhận biết các vị trí tương đối của hai đường tròn.


- Nguyệt thực là hiện tượng Mặt Trăng bị bóng của Trái Đất che khuất toàn bộ (nguyệt thực toàn phần) hay một phần (H.5.30). Do Mặt Trăng và bóng Trái Đất được xem là có dạng hình tròn nên nguyệt thực cho ta một hình ảnh thực tế về vị trí tương đối của hai đường tròn. Em có thể cắt ra hai hình tròn bằng giấy để mô phỏng hiện tượng nguyệt thực. Nhưng trước hết hãy tìm hiểu về vị trí tương đối của hai đường tròn.
- Sau đây, khi nói hai đường tròn mà không có giải thích gì thêm, ta hiểu đó là hai đường tròn phân biệt.

1. HAI ĐƯỜNG TRÒN CẮT NHAU

Tìm hiểu hai đường tròn cắt nhau

HD1 Cho Hình 5.31, trong đó giả sử $O'A < OA$. Ta có $OA - O'A < OO' < OA + O'A$.

Hãy vẽ hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'A)$ và cho biết hai đường tròn đó có mấy điểm chung?



Hình 5.31


Nếu hai đường tròn có đúng hai điểm chung thì ta nói đó là hai đường tròn cắt nhau. Hai điểm chung gọi là hai giao điểm của chúng.

Nhận xét

Từ HD1 ta thấy hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ cắt nhau khi

$$R - R' < OO' < R + R' \quad (\text{với } R > R').$$

Ví dụ 1 Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 5$ cm. Hãy giải thích tại sao hai đường tròn $(O; 4$ cm) và $(O'; 3$ cm) cắt nhau.



Hình 5.32

Giải

Đặt $R = 4$ cm; $R' = 3$ cm, ta thấy $1 \text{ cm} < 5 \text{ cm} < 7 \text{ cm}$, nên $R - R' < OO' < R + R'$. Do đó, hai đường tròn đã cho cắt nhau.

Luyện tập 1

Cho đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$ và điểm I cách O một khoảng 2 cm. Xác định vị trí tương đối của đường tròn đã cho và đường tròn $(I; r)$ trong mỗi trường hợp sau:

- a) $r = 4$ cm;
- b) $r = 6$ cm.

2. HAI ĐƯỜNG TRÒN TIẾP XÚC NHAU


Tìm hiểu hai đường tròn tiếp xúc nhau.

HĐ2 Trên Hình 5.33a, ta có $OO' = OA + O'A$; trên Hình 5.33b, ta có $OO' = OA - O'A$. Trong mỗi trường hợp, hãy vẽ hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'A)$ và cho biết hai đường tròn đó có mấy điểm chung?



Hình 5.33

Nếu hai đường tròn có duy nhất một điểm chung thì ta nói đó là hai đường tròn tiếp xúc nhau. Điểm chung gọi là tiếp điểm của chúng.



a) Tiếp xúc ngoài

b) Tiếp xúc trong

Hình 5.34

Chú ý

Người ta còn phân biệt hai trường hợp: hai đường tròn tiếp xúc ngoài (H.5.34a) và hai đường tròn tiếp xúc trong (H.5.34b).

Nhận xét

- 1) Từ HĐ2, ta nhận thấy: Hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ tiếp xúc ngoài khi $OO' = R + R'$, và tiếp xúc trong khi $OO' = R - R'$ ($R > R'$).
- 2) Nếu hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì tiếp điểm thẳng hàng với hai tâm.

Ví dụ 2

Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 5$ cm. Giải thích tại sao hai đường tròn $(O; 3$ cm) và $(O'; 2$ cm) tiếp xúc với nhau. Chúng tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài?

Giải

Đặt $R = 3$ cm và $R' = 2$ cm, ta thấy 5 cm $= 3$ cm $+ 2$ cm, nghĩa là $OO' = R + R'$. Vậy hai đường tròn đã cho tiếp xúc ngoài với nhau.

Luyện tập 2

Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 3$ cm. Giải thích tại sao hai đường tròn $(O; 8$ cm) và $(O'; 5$ cm) tiếp xúc với nhau. Chúng tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài?

3. HAI ĐƯỜNG TRÒN KHÔNG GIAO NHAU**Tìm hiểu hai đường tròn không giao nhau**

HĐ3 Trên Hình 5.35a, ta có $OO' > OA + O'B$; trên Hình 5.35b, ta có $OO' < OA - O'B$.

Trong mỗi trường hợp, hãy vẽ hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'B)$ và cho biết hai đường tròn đó có điểm chung nào không.




Hình 5.35

Nếu hai đường tròn không có điểm chung nào thì ta nói đó là hai đường tròn không giao nhau.

Chú ý

Người ta còn phân biệt hai trường hợp: hai đường tròn ngoài nhau (H.5.36a) và đường tròn này đựng đường tròn kia (H.5.36b).



Hình 5.36

Nhận xét

Từ HĐ3 ta nhận thấy:

- Hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ ngoài nhau khi $OO' > R + R'$.
- Đường tròn $(O; R)$ đựng đường tròn $(O'; R')$ khi $R > R'$ và $OO' < R - R'$. Đặc biệt, khi O trùng với O' và $R \neq R'$ thì ta có hai đường tròn đồng tâm.

Ví dụ 3 Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn $(O; 3 \text{ cm})$ và $(O'; 5 \text{ cm})$, biết rằng $OO' > 8 \text{ cm}$.

Giải

Đặt $R = 3 \text{ cm}$ và $R' = 5 \text{ cm}$, ta có $OO' > 8 \text{ cm} = R + R'$.

Vậy $(O; 3 \text{ cm})$ và $(O'; 5 \text{ cm})$ là hai đường tròn ngoài nhau.

Luyện tập 3

Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 2 \text{ cm}$. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$ và $(O'; r)$, biết rằng $r < 3 \text{ cm}$.

Thực hành

Đề mô phỏng nguyệt thực, em hãy cắt hai hình tròn từ giấy: hình tròn thứ nhất màu sáng tượng trưng cho Mặt Trăng, hình tròn thứ hai màu tối (tô hơn và bằng giấy mờ càng tốt) tượng trưng cho bóng Trái Đất. Sắp xếp hai hình tròn đó để:

- Mô phỏng nguyệt thực một phần. Khi đó, hình ảnh của hai đường tròn có vị trí tương đối như thế nào?
- Mô phỏng nguyệt thực toàn phần. Khi đó, hình ảnh của hai đường tròn có vị trí tương đối như thế nào?

Tranh luận

Tròn cho rằng: Nói “hai đường tròn không cắt nhau” cũng có nghĩa là “hai đường tròn không giao nhau”. Theo em, Tròn đúng hay sai?

Ta có bảng tổng kết sau:

Vị trí tương đối của hai đường tròn ($O; R$) và ($O'; R'$) ($R \geq R'$)	Số điểm chung	Hệ thức giữa OO' với R và R'
Hai đường tròn cắt nhau	2	$R - R' < OO' < R + R'$
Hai đường tròn tiếp xúc nhau: - Tiếp xúc ngoài - Tiếp xúc trong	1	$OO' = R + R'$ $OO' = R - R' > 0$
Hai đường tròn không giao nhau: - (O) và (O') ở ngoài nhau - (O) đựng (O')	0	$OO' > R + R'$ $OO' < R - R'$

 BÀI TẬP

5.24. Hình 5.37 cho thấy hình ảnh của những đường tròn qua cách trình bày một số sản phẩm mây tre đan. Bằng cách đánh số các đường tròn, em hãy chỉ ra một vài cặp đường tròn cắt nhau và vài cặp đường tròn không giao nhau.

5.25. Cho hai điểm O và O' cách nhau một khoảng 5 cm. Mỗi đường tròn sau đây có vị trí tương đối như thế nào đối với đường tròn ($O; 3$ cm).

a) Đường tròn ($O'; 3$ cm);

b) Đường tròn ($O'; 1$ cm);

c) Đường tròn ($O'; 8$ cm).

5.26. Cho ba điểm thẳng hàng O , A và O' . Với mỗi trường hợp sau, hãy viết hệ thức giữa các độ dài OO' , OA và $O'A$ rồi xét xem hai đường tròn ($O; OA$) và ($O'; O'A$) tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài với nhau; vẽ hình để khẳng định dự đoán của mình.

a) Điểm A nằm giữa hai điểm O và O' ;

b) Điểm O nằm giữa hai điểm A và O' ;

c) Điểm O' nằm giữa hai điểm A và O .

5.27. Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài với nhau tại A . Một đường thẳng qua A cắt (O) tại B và cắt (O') tại C . Chứng minh rằng $OB \parallel O'C$.

**LUYỆN TẬP**

5.22. Hai đường tròn $(O; 2 \text{ cm})$ và $(O'; 3 \text{ cm})$ có vị trí tương đối như thế nào trong mỗi trường hợp sau:

a) $OO' = 4 \text{ cm}$

b) $OO' = 5 \text{ cm}$

c) $OO' = 6 \text{ cm}$

5.23. Vẽ hình và chứng minh phần b của Ví dụ 2.

5.24. Cho điểm A và đường tròn $(O; R)$ sao cho $R < OA < 3R$.

a) Chứng minh rằng đường tròn $(A; 2R)$ cắt đường tròn $(O; R)$. Gọi B là một trong hai giao điểm của chúng.

b) Gọi C là điểm đối xứng với B qua O . Nối A với C cắt (O) tại D (khác C). Chứng minh rằng $AD = DC$.

5.25. Cho I là trung điểm của đoạn AB . Xét các đường tròn $(I; IB)$ và $(A; AB)$.

a) Hai đường tròn (I) và (A) nói trên có vị trí tương đối như thế nào?

b) Đường thẳng đi qua B , cắt các đường tròn (I) và (A) lần lượt tại C và D . Hãy so sánh các độ dài BC và CD .

5.26. Cho tam giác ABC .

a) Chứng minh rằng hai đường tròn $(B; BA)$ và $(C; CA)$ cắt nhau. Gọi A' là giao điểm khác A của hai đường tròn đó.

b) Chứng minh rằng A và A' đối xứng nhau qua BC .


c) Biết rằng $AA' = 24$ cm, $AB = 15$ cm và $AC = 13$ cm. Tính độ dài BC .

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ cắt nhau tại A và B . Gọi M là điểm đối xứng với A qua O , N là điểm đối xứng với A qua O' .

- Chứng minh rằng $M \in (O)$, $N \in (O')$ và ba điểm M, B, N thẳng hàng.
- Chứng minh rằng đường thẳng MN tiếp xúc với đường tròn đường kính AB .



Hình 5.38

Giải (H.5.38, học sinh tự ghi giả thiết, kết luận)

- Do tính đối xứng của (O) nên từ $A \in (O)$ suy ra $M \in (O)$ (vì M đối xứng với A qua O).

Tam giác ABM có BO là đường trung tuyến và $BO = \frac{1}{2}AM$ (bán kính bằng nửa đường kính) nên là tam giác vuông tại B . Vậy $\angle ABM = 90^\circ$.

Tương tự, ta cũng có $N \in (O')$ và $\angle ABN = 90^\circ$. Từ hai kết quả trên suy ra

$$\angle MBN = \angle ABM + \angle ABN = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ.$$

Điều đó chứng tỏ ba điểm M, B, N thẳng hàng.


- Kết quả câu a còn cho thấy $MN \perp AB$, tức là MN vuông góc với bán kính của đường tròn đường kính AB tại B . Do đó, MN là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB .

Ví dụ 2

Cho hai đường tròn ngoài nhau $(O; R)$ và $(O'; R')$ với giả thiết $R > R'$. Một đường thẳng d tiếp xúc với $(O; R)$ tại A và tiếp xúc với $(O'; R')$ tại B sao cho O và O' nằm cùng phía đối với d . Giả sử d cắt đường thẳng OO' tại điểm P (Hình 5.39).

- Chứng minh rằng $\frac{PO}{PO'} = \frac{R}{R'}$;

- Gọi A' là điểm đối xứng với A qua OO' . Chứng minh rằng đường thẳng PA' tiếp xúc với (O) và với (O') .



Hình 5.39

Giải (H.5.39, học sinh tự ghi giả thiết, kết luận)

- a) Do d tiếp xúc với (O) tại A , tiếp xúc với (O') tại B nên $OA \perp d$ và $O'B \perp d$. Do đó, trong tam giác POA ta có $O'B \parallel OA$, suy ra $\triangle POA \sim \triangle PO'B$. Từ đó, ta có

$$\frac{PO}{PO'} = \frac{OA}{O'B} = \frac{R}{R'}.$$

- b) Do A' đối xứng với A qua OO' và $A \in (O)$ nên $A' \in (O)$ và $OO' \perp AA'$, tức là $OP \perp AA'$.

Tam giác OAA' là tam giác cân (do $OA = OA'$) có $OP \perp AA'$ nên OP là tia phân giác của góc AOA' , suy ra $\angle AOP = \angle A'OP$.

Hai tam giác AOP và $A'OP$ có: $OA = OA'$ (bán kính đường tròn (O)); OP chung và $\angle AOP = \angle A'OP$.

Vậy $\triangle AOP = \triangle A'OP$ (c.g.c), suy ra $\angle PA'O = \angle PAO$ mà $\angle PAO = 90^\circ$ (do PA tiếp xúc với (O)) nên $\angle PA'O = 90^\circ$.

Vậy PA' vuông góc với bán kính OA' của (O) tại A' . Điều đó chứng tỏ PA' tiếp xúc với (O) tại A' . Đối với đường tròn (O') , gọi B' là chân đường vuông góc hạ từ O' xuống PA' . Để khẳng định rằng PA' cũng tiếp xúc với (O') tại B' , ta chỉ cần chứng minh $B' \in (O')$.

Thật vậy, $O'B'$ và OA' cùng vuông góc với PA' nên $O'B' \parallel OA'$, suy ra $\triangle POA' \sim \triangle PO'B'$.

Do đó

$$\frac{OA'}{O'B'} = \frac{PO}{PO'}.$$

Mà theo câu a ta có $\frac{PO}{PO'} = \frac{R}{R'}$ nên

$$\frac{OA'}{O'B'} = \frac{R}{R'},$$

$$\text{hay } \frac{R}{O'B'} = \frac{R}{R'}.$$

Điều này chứng tỏ $O'B' = R'$, nghĩa là $B' \in (O')$.

Vậy PA' tiếp xúc với (O) tại A' và tiếp xúc với (O') tại B' .

**BÀI TẬP**

5.28. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, điểm O nằm trong phần mặt phẳng ở giữa hai đường thẳng đó. Biết rằng khoảng cách từ O đến a và b lần lượt bằng 2 cm và 3 cm.

- a) Hỏi bán kính R của đường tròn $(O; R)$ phải thỏa mãn điều kiện gì để $(O; R)$ cắt cả hai đường thẳng a và b ?

- b) Biết rằng đường tròn $(O; R)$ tiếp xúc với đường thẳng a . Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn $(O; R)$ và đường thẳng b .

5.29. Khi chuyển động, giả sử đầu mũi kim dài của một chiếc đồng hồ vạch nên một đường tròn, kí hiệu là (T_1) , trong khi đầu mũi kim ngắn vạch nên một đường tròn khác, kí hiệu là (T_2) .

- a) Hai đường tròn (T_1) và (T_2) có vị trí tương đối như thế nào?

- b) Giả sử bán kính của (T_1) và (T_2) lần lượt là R_1 và R_2 . Người ta vẽ trên mặt đồng hồ một hoạ tiết hình tròn có tâm nằm cách điểm trục kim đồng hồ một khoảng bằng $\frac{1}{2}R_1$ và có bán kính bằng $\frac{1}{2}R_2$. Hãy cho biết vị trí tương đối của đường tròn (T_3) đối với mỗi đường tròn (T_1) và (T_2) . Vẽ ba đường tròn đó nếu $R_1 = 3$ cm và $R_2 = 2$ cm.

5.30. Cho đường tròn (O) đường kính AB , tiếp tuyến xx' tại A và tiếp tuyến yy' tại B của (O) . Một tiếp tuyến thứ ba của (O) tại điểm P (P khác A và B) cắt xx' tại M và cắt yy' tại N .

- a) Chứng minh rằng $MN = MA + NB$.

- b) Đường thẳng đi qua O và vuông góc với AB cắt NM tại Q . Chứng minh rằng Q là trung điểm của đoạn MN .

- c) Chứng minh rằng AB tiếp xúc với đường tròn đường kính MN .

5.31. Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài với nhau tại A và cùng tiếp xúc với đường thẳng d tại B và C (khác A), trong đó $B \in (O)$ và $C \in (O')$. Tiếp tuyến của (O) tại A cắt BC tại M . Chứng minh rằng:

a) Đường thẳng MA tiếp xúc với (O') ;

b) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BC , từ đó suy ra ABC là tam giác vuông.

EM CÓ BIẾT? (Đọc thêm)

Vẽ chắp nối trơn

Trong những bản tin dự báo thời tiết trên truyền hình, các em có thể bắt gặp hình biểu tượng của đám mây như Hình 5.40.a. Quan sát đường viền của hình này, các em thấy có gì đáng chú ý?


- Thứ nhất, đường viền gồm một đoạn thẳng và 4 cung tròn được chắp nối với nhau như Hình 5.40.b.
- Thứ hai, trên Hình 5.40.b, ta thấy đường viền bị “gãy” tại những điểm C , D và E (đó là những điểm chắp nối giữa hai cung tròn). Trong khi đó tại điểm chắp nối giữa đoạn thẳng AB và cung tròn AqE , đường viền không bị “gãy”. Ta nói rằng đoạn thẳng AB được chắp nối trơn với cung AqE (tại điểm A). Tương tự, cung BmC được chắp nối trơn với đoạn AB (tại điểm B).

Chắp nối trơn có nhiều ứng dụng trong thực tế đời sống. Chẳng hạn, tàu hỏa phải chạy trên đường ray thẳng hoặc đường thẳng chắp nối trơn với đoạn đường cong (H.5.41).

Vậy muốn có chắp nối trơn ta làm thế nào? Trước hết, ta tìm hiểu về vẽ chắp nối trơn. Cách vẽ chắp nối trơn được suy ra từ hai kết luận sau:

- 1) Nếu một đoạn thẳng được chắp nối trơn với một cung tròn thì đoạn thẳng đó nằm trên tiếp tuyến của đường tròn chứa cung tròn đó tại điểm chắp nối.
- 2) Nếu hai cung tròn được chắp nối trơn với nhau thì hai đường tròn chứa hai cung ấy tiếp xúc nhau tại điểm chắp nối.

Để hiểu thêm về vẽ chắp nối trơn, em hãy chuẩn bị thước kẻ và compa để vẽ hình “trái xoan” (H.5.42) theo hướng dẫn sau đây:



Hình 5.42

- Vẽ hình chữ nhật $ABCD$ (kích thước tùy ý).
- Xác định trung điểm I của đoạn AB và trung điểm K của đoạn CD .
- Tìm giao điểm E của AK và DI ; giao điểm F của BK và CI .
- Vẽ 4 cung: DpC (tâm K), AmB (tâm I), BnC (tâm F) và AqD (tâm E).

Bốn cung tròn vừa vẽ tạo nên hình “trái xoan”. Trong hình đó, tâm của hai cung liên tiếp, chẳng hạn, tâm K của cung DpC và tâm F của cung BnC thẳng hàng với điểm chập nối C , chứng tỏ hai đường tròn (K) và (F) tiếp xúc nhau tại điểm C . Điều đó cho phép hai cung này chập nối trơn với nhau tại C .

Em hãy tìm hiểu điều tương tự đối với các cặp cung liên tiếp còn lại để hiểu tại sao các cung tròn đã vẽ đều chập nối trơn với nhau.

Bây giờ em hãy tự mình tìm hiểu và trao đổi với các bạn khác về cách vẽ hai hình sau đây nhé!

Hình “quả trứng” Biểu tượng “gió” trong dự báo thời tiết

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V


A. TRẮC NGHIỆM

5.32. Cho đường tròn $(O; 4 \text{ cm})$ và hai điểm A, B . Biết rằng $OA = \sqrt{15} \text{ cm}$ và $OB = 4 \text{ cm}$. Khi đó:

- (A) Điểm A nằm trong (O) , điểm B nằm ngoài (O) .
- (B) Điểm A nằm ngoài (O) , điểm B nằm trên (O) .
- (C) Điểm A nằm trên (O) , điểm B nằm trong (O) .
- (D) Điểm A nằm trong (O) , điểm B nằm trên (O) .



5.33. Cho Hình 5.43, trong đó BD là đường kính, $\widehat{AOB} = 40^\circ$; $\widehat{BOC} = 100^\circ$. Khi đó:




Hình 5.43

- (A) số đo $\widehat{DC} = 80^\circ$ và số đo $\widehat{AD} = 220^\circ$.
- (B) số đo $\widehat{DC} = 280^\circ$ và số đo $\widehat{AD} = 220^\circ$.
- (C) số đo $\widehat{DC} = 280^\circ$ và số đo $\widehat{AD} = 140^\circ$.
- (D) số đo $\widehat{DC} = 80^\circ$ và số đo $\widehat{AD} = 140^\circ$.



5.34. Cho hai đường tròn $(A; R_1)$, $(B; R_2)$, trong đó $R_2 < R_1$. Biết rằng hai đường tròn (A) và (B) cắt nhau (H.5.44). Khi đó:




Hình 5.44

- (A) $AB < R_1 - R_2$.
- (B) $R_1 - R_2 < AB < R_1 + R_2$.
- (C) $AB > R_1 + R_2$.

(D) $AB = R_1 + R_2$.



5.35. Cho đường tròn $(O; R)$ và hai đường thẳng a_1 và a_2 . Gọi d_1, d_2 lần lượt là khoảng cách từ điểm O đến a_1 và a_2 . Biết rằng (O) cắt a_1 và tiếp xúc với a_2 (H.5.45). Khi đó:



Hình 5.45

(A) $d_1 < R$ và $d_2 = R$.

(B) $d_1 = R$ và $d_2 < R$.

(C) $d_1 > R$ và $d_2 = R$.

(D) $d_1 < R$ và $d_2 < R$.



B. TỰ LUẬN

5.36. Cho đường tròn (O) đường kính BC và điểm A (khác B và C).

- Chứng minh rằng nếu A nằm trên (O) thì ABC là một tam giác vuông; ngược lại, nếu ABC là tam giác vuông tại A thì A nằm trên (O) .
- Giả sử A là một trong hai giao điểm của đường tròn $(B; BO)$ với đường tròn (O) . Tính các góc của tam giác ABC .
- Với cùng giả thiết câu b, tính độ dài cung AC và diện tích hình quạt nằm trong (O) giới hạn bởi các bán kính OA và OC , biết rằng $BC = 6$ cm.

5.37. Cho AB là một dây bất kì (không phải là đường kính) của đường tròn $(O; 4$ cm). Gọi C và D lần lượt là các điểm đối xứng qua A và B qua tâm O .

- Hai điểm C và D có nằm trên đường tròn (O) không? Vì sao?
- Biết rằng $ABCD$ là một hình vuông. Tính độ dài cung lớn AB và diện tích hình quạt tròn tạo bởi hai bán kính OA và OB .

5.38. Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C , sao cho $AB = 2$ cm và $BC = 1$ cm. Vẽ các đường tròn $(A; 1,5$ cm), $(B; 3$ cm) và $(C; 2$ cm). Hãy xác định các cặp đường tròn:


- Cắt nhau;
- Không giao nhau;

c) Tiếp xúc với nhau.

5.39. Cho tam giác vuông ABC ($\widehat{A}$ vuông). Vẽ hai đường tròn $(B; BA)$ và $(C; CA)$ cắt nhau tại A và A' . Chứng minh rằng:

- BA và BA' là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn $(C; CA)$.
- CA và CA' là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn $(B; BA)$.

5.40. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B . Một đường thẳng d đi qua A cắt (O) tại E và cắt (O') tại F (E và F khác A). Biết điểm A nằm trong đoạn EF . Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AE và AF (H.5.46).



Hình 5.46

- Chứng minh rằng tứ giác $OO'KI$ là một hình thang vuông.
- Chứng minh rằng $IK = \frac{1}{2}EF$.
- Khi d ở vị trí nào (d vẫn qua A) thì $OO'KI$ là một hình chữ nhật?

ÔN TẬP CHƯƠNG V



ÔN TẬP CHƯƠNG V

Một số kiến thức đã học thường dùng để giải toán trong chương này:

- Cho đường trung trực d của đoạn thẳng AB . Khi đó:
 - Nếu $M \in d$ thì $MA = MB$;
 - Ngược lại, nếu $MA = MB$ thì $M \in d$.
- Cho tam giác ABC và AM là đường trung tuyến của nó ($M \in BC$).
 - Nếu ABC là tam giác vuông tại A ($\widehat{A} = 90^\circ$) thì $AM = \frac{BC}{2}$.
 - Ngược lại, nếu $AM = \frac{BC}{2}$ thì ABC là tam giác vuông tại A (hay $\widehat{A} = 90^\circ$).
- Cho tam giác ABC . Xét bốn yếu tố: đường cao AH , đường trung tuyến AM , đường phân giác của góc A và đường trung trực của đoạn BC .
 - Nếu tam giác ABC cân tại A thì bốn yếu tố nói trên trùng nhau.
 - Nếu có hai trong bốn yếu tố nói trên trùng nhau thì ABC là tam giác cân tại A .
- Nếu một đường thẳng song song với cạnh BC của tam giác ABC và cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại B', C' thì $\triangle ABC \sim \triangle AB'C'$;
- Trong tam giác vuông ABC ($\widehat{A} = 90^\circ$):

$$\sin B = \frac{AC}{BC}; \quad \cos B = \frac{AB}{BC}; \quad \tan B = \frac{AC}{AB}; \quad \cot B = \frac{AB}{AC}.$$

- Tính chất của tỉ lệ thức: Từ một trong các đẳng thức sau suy ra được các đẳng thức còn lại:

$$ad = bc; \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d}; \quad \frac{a}{c} = \frac{b}{d}; \quad \frac{d}{b} = \frac{c}{a}; \quad \frac{d}{c} = \frac{b}{a} \quad (a, b, c, d \neq 0).$$


- Tính chất của dãy hai tỉ số bằng nhau:

$$\text{Nếu } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ thì } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d} = \frac{a-c}{b-d} \quad (\text{giả thiết các tỉ số đều có nghĩa}).$$

A. CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

- Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(O; \sqrt{5})$, hai điểm $A(-\sqrt{3}; 1)$ và $B(-1; 2)$. Khi đó xảy ra:
 - (A) Điểm A nằm trong (O) , điểm B nằm ngoài (O) .
 - (B) Điểm A nằm trong (O) , điểm B nằm trên (O) .
 - (C) Điểm A nằm trên (O) , điểm B nằm trong (O) .
 - (D) Điểm A nằm ngoài (O) , điểm B nằm trên (O) .

☐
- Cho đường thẳng xy cắt đường tròn (O) tại hai điểm A và B (H.5.10). Khi đó, các điểm thuộc đường thẳng xy và nằm trong đường tròn (O) là:




Hình 5.10

- (A) Các điểm thuộc tia AB .
- (B) Các điểm thuộc tia By .
- (C) Các điểm thuộc đoạn AB .
- (D) Các điểm nằm giữa A và B .



3. Cho Hình 5.11, trong đó tất cả các cung $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$, $\widehat{CD}$, $\widehat{DE}$, $\widehat{EG}$ và $\widehat{GA}$ đều có số đo bằng 60° . Khi đó:



Hình 5.11

- (A) Điểm đối xứng với A qua CG là B .
- (B) Điểm đối xứng với A qua CG là D .
- (C) Điểm đối xứng với A qua CG là E .
- (D) Điểm đối xứng với A qua CG là G .



4. Độ dài L (đơn vị cm) của cung tròn và diện tích S của hình quạt tròn (đơn vị cm^2) có cùng bán kính 9 cm và cùng ứng với cung 280° là:

- (A) $L = 7\pi$ và $S = 63\pi$.
- (B) $L = 14\pi$ và $S = 63\pi$.
- (C) $L = 7\pi$ và $S = 28\pi$.
- (D) $L = 14\pi$ và $S = 28\pi$.



5. Cho góc nhọn xOy và điểm M nằm trong góc đó. Biết rằng M nằm cách Ox một khoảng bằng 3 cm và cách Oy một khoảng bằng 2 cm. Khi đó

- (A) Nếu đường tròn (M) tiếp xúc với Ox thì (M) cắt Oy .
- (B) Nếu đường tròn (M) tiếp xúc với Ox thì (M) cũng tiếp xúc với Oy .
- (C) Nếu đường tròn (M) tiếp xúc với Ox thì (M) không giao nhau với Oy .
- (D) Nếu đường tròn (M) tiếp xúc với Oy thì cắt Ox .




6. Cho hai điểm A và B sao cho $AB = 7$ cm và đường tròn $(B; 4$ cm). Khi đó:

- (A) Hai đường tròn $(A; R)$ và (B) cắt nhau nếu $R < 11$ cm.
- (B) Hai đường tròn $(A; R)$ và (B) cắt nhau nếu $R > 3$ cm.
- (C) Hai đường tròn $(A; R)$ và (B) không giao nhau nếu $R > 11$ cm.
- (D) Hai đường tròn $(A; R)$ và (B) không giao nhau nếu $R \leq 3$ cm.



B. BÀI TẬP

5.27. Cho tam giác ABC có $AB < AC$ và đường cao AH (H.5.12).



Hình 5.12

- a) Trong các điểm B , H và C , điểm nào nằm trong, điểm nào nằm trên và điểm nào nằm ngoài đường tròn $(A; AB)$? Vì sao?
- b) Xác định vị trí của điểm D trên đoạn AC trong mỗi trường hợp sau:
 - Đường tròn (A) và đường tròn $(C; CD)$ tiếp xúc với nhau;
 - Đường tròn (A) và đường tròn $(C; CD)$ cắt nhau;
 - Đường tròn (A) và đường tròn $(C; CD)$ không giao nhau.

5.28. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$).

- a) Chứng minh rằng đường trung trực d của AB cũng là đường trung trực của CD (từ đó suy ra hai điểm A và B đối xứng với nhau, C và D đối xứng với nhau qua d).
- b) Giải thích tại sao nếu một đường tròn đi qua 3 điểm A , B và C thì nó cũng đi qua điểm D .

5.29. Giả sử CD là một dây song song với đường kính AB của đường tròn (O) sao cho $ABCD$ là một tứ giác lồi. Gọi E là trung điểm của đoạn CD .

- a) Chứng minh rằng A đối xứng với B và C đối xứng với D qua đường thẳng OE .
- b) Chứng minh rằng tứ giác $ABCD$ là một hình thang cân.
- c) Biết rằng $AB = 12$ cm và $\widehat{COD} = 100^\circ$. Tính độ dài cung (nhỏ) AD và cung (lớn) ABC .
- d) Với giả thiết ở câu c, tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ BD .

5.30. Cho tam giác vuông ABC ($\widehat{A} = 90^\circ$) có $\widehat{C} = 30^\circ$ và $AB = 3$ cm. Đường phân giác của góc B cắt AC tại D .

- Chứng minh rằng đường tròn $(D; DA)$ tiếp xúc với cạnh BC .
- Tính độ dài cung nằm trong góc BDC của đường tròn $(D; DA)$ và diện tích hình quạt tròn tương ứng với cung ấy.
- Tính diện tích hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn $(D; DA)$ và $(D; DC)$.

5.31. Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O) , kẻ hai tiếp tuyến PA và PB đến đường tròn (A và B là hai tiếp điểm).

- Chứng minh rằng $PO \perp AB$.
- Gọi C là điểm đối xứng với A qua O . Chứng minh rằng $BC \parallel PO$.
- Tính độ dài các cạnh của tam giác PAB , biết $OA = 3$ cm và $OP = 5$ cm.

5.32. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Từ B và từ C kẻ hai đường thẳng tiếp xúc với đường tròn $(A; AH)$ lần lượt tại D và E . Chứng minh rằng:

- Hai điểm D và E đối xứng với nhau qua A ;
- DE tiếp xúc với đường tròn đường kính BC .

5.33. Cho đường tròn (O) , đường thẳng a tiếp xúc với (O) tại A , đường thẳng b tiếp xúc với (O) tại B sao cho $a \parallel b$. Gọi C là một điểm tùy ý thuộc (O) , khác A và B . Tiếp tuyến c của (O) tại C cắt a và b lần lượt tại M và N .

- Chứng minh AB là một đường kính của (O) .
- Gọi D , P và Q lần lượt là các điểm đối xứng với C , M và N qua tâm O . Chứng minh rằng $D \in (O)$, $P \in b$ và $Q \in a$.
- Chứng minh rằng PQ tiếp xúc với (O) tại D .
- Chứng minh tứ giác $MNPQ$ là một hình thoi.

5.34. Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ tiếp xúc ngoài với nhau tại A , hai điểm $B \in (O)$ và $C \in (O')$ sao cho B và C nằm cùng phía đối với đường thẳng OO' và $OB \parallel O'C$.

a) Chứng minh góc BAC là góc vuông.

b) Cho biết $R = 3 \text{ cm}$, $R' = 1 \text{ cm}$ và BC cắt OO' tại D . Tính độ dài đoạn OD .

5.35. Cho đường tròn tâm O , đường kính MN . Một đường tròn (N) cắt (O) tại A và B .

a) Chứng minh rằng MA và MB là hai tiếp tuyến của (N) .

b) Đường thẳng qua N và vuông góc với NA cắt MB tại C . Chứng minh hai điểm M và N đối xứng với nhau qua OC .

c) Đường thẳng qua M và vuông góc với MA cắt NB tại D . Chứng minh ba điểm O , C và D thẳng hàng.