

Secondo le più recenti raccomandazioni scientifiche internazionali, è consigliabile promuovere lo svezzamento dei bambini intorno ai 5 e mezzo-6 mesi d'età.

L'integrazione del latte materno o del latte artificiale con cibi solidi consente di soddisfare le nuove esigenze nutrizionali del lattante, come ad esempio il fabbisogno di ferro. A tale età il bambino, oltre a essere naturalmente interessato a ciò che vede mangiare dai genitori, ha anche maturato tutte quelle funzioni (neuromotorie, digestivo-metaboliche, immunitarie, renali) che gli permettono di impastare in bocca, deglutire e digerire la varietà di cibi consumati comunemente dagli adulti in casa.

Per indicare il momento della prima introduzione del cibo solido utilizzeremo per brevità d'uso il termine svezzamento, anche se può prestarsi a un'interpretazione ambigua in quanto significa "togliere il vizio" (sottintendendo il vizio di allattare al seno), mentre sarebbe più appropriato parlare di alimentazione complementare, dal momento che i primi alimenti solidi vanno solo a completare e non a sostituire l'allattamento naturale (o in sua assenza artificiale) che proseguirà fino all'anno di vita e oltre.

È molto importante il concetto che il primo approccio al cibo solido debba partire dalla richiesta attiva del bambino, che va riconosciuto come soggetto dotato di specifiche competenze e capacità e non come oggetto di rigidi schemi e regole, cui deve corrispondere secondo certe aspettative.

Sostenuto empaticamente dai genitori, che riconoscono e rispettano i suoi segnali di fame e sazietà rafforzando la sua capacità di autoregolazione, il bambino può fare esperienza del sé e dell'ambiente in sintonia con i suoi tempi fisiologici e i suoi bisogni. Da qui le definizioni oggi in uso di alimentazione complementare a richiesta o di alimentazione complementare responsiva

IL BAMBINO SA INDICARCI QUANDO E' PRONTO

I segni che indicano quando il bambino è pronto a mangiare cibo solido appaiono generalmente nell'arco di età compreso fra i 5 e i 7 mesi nei bambini sani nati a termine, mentre nei bambini pretermine compaiono più avanti.

I segnali sono i seguenti:

- mantiene la posizione seduta, da solo o con un minimo sostegno senza doversi appoggiare con le mani, con testa e tronco allineati, così da deglutire efficientemente il bolo alimentare;

- coordina occhio-mano-bocca così da poter localizzare il cibo, afferrarlo e portarselo in bocca da sé;
- apre la bocca, tenendo la lingua appiattita e bassa per accogliere il cucchiaino;
- stringe le labbra attorno al cucchiaino e ne asporta il contenuto con il labbro superiore;
- tiene il cibo in bocca per masticarlo, anche in assenza di denti, e poi sposta il bolo nella parte posteriore della bocca per deglutirlo, invece di sputarlo fuori e farlo colare sul mento;
- afferra con il palmo della mano e stringe nel pugno un alimento a forma di manico e mangia la parte che sporge dal pugno;
- gira la testa dall'altra parte per esprimere il suo dissenso.

Ricordate! Invece di decidere a priori a che età svezzarlo, chiedetevi: a) mantiene da sé la posizione seduta? b) è capace di afferrare il cibo e portarselo in bocca? c) è capace di masticare/deglutire il cibo, anche se non ha ancora i denti?

Potete fare una prova permettendogli di maneggiare un pezzo di banana o un pezzo di carota cotta.

Quando il bambino mostra di avere raggiunto queste tre capacità insieme e dimostra inequivocabilmente di voler partecipare al vostro pasto, mettetelo a tavola con voi, consentendogli di assaggiare ogni tipo di alimento preparato in casa sminuzzato in piccoli pezzi o in pezzi più grossi da impugnare

BAMBINO È CAPACE DI REGOLARSI DA SÉ SU QUANTO MANGIARE

Di fronte all'offerta di cibi semplici e salutarì preparati in casa, i bambini scelgono istintivamente una dieta qualitativamente varia e completa e assumono un'adeguata quantità di calorie. Grazie a questa loro capacità di autoregolazione, se mangiano poco in un pasto compenseranno spontaneamente mangiando di più negli altri pasti della giornata. Inoltre l'appetito dei bambini può variare da un giorno all'altro in funzione di vari fattori (dentizione, malattie febbrili intercorrenti, etc).

Tenete presente che non tutti i bambini sono uguali: vi sono bambini che presentano un grande entusiasmo per il primo cibo solido e si dimostrano dei buoni mangiatori da subito e altri più timorosi e diffidenti che mangiano come un uccellino. In tali casi il vostro pediatra potrà rassicurarvi sull'andamento regolare della crescita o suggerirvi cosa è bene fare qualora si evidenzino un eccessivo aumento di peso, come può accadere in alcuni bambini che hanno una tendenza innata o acquisita a mangiare troppo, o un deficit di crescita.

Se permettiamo al bambino di fare esperienza dei propri segnali interni e dei propri bisogni (aver fame o sete, aver avuto abbastanza, essere sazio) egli imparerà a distinguere in modo differenziato le sue necessità e a comunicarle in modo sempre più efficiente per ottenerne l'appagamento da parte di chi si prende cura di lui. Le risposte adeguate a tali segnali da parte dei genitori accresceranno via via le competenze, l'autonomia e l'autostima del bambino. Se

invece il cibo viene usato impropriamente, ad esempio per calmare vari stati di irrequietezza che non hanno nulla a che fare con il bisogno di mangiare, il bambino può sviluppare una percezione confusa dei suoi segnali interni e la tendenza a cercare cibo come risposta a qualsiasi stato di disagio (rabbia, sonno, noia, desiderio di interazione sociale...). Allo stesso modo, l'uso di forzature e distrazioni varie per spingere il bambino a mangiare di più, come a volergli imporre che deve aver fame per soddisfare le aspettative dei genitori, può ostacolare lo sviluppo dell'autoconsapevolezza e la sua capacità di autoregolazione. È perciò molto importante imparare a riconoscere e rispettare i segnali con i quali ci comunica quando è sazio o quando ha fame.

È buona regola mettere in pratica il cosiddetto principio di divisione di responsabilità alimentare fra genitori e figlio: • voi genitori avete la responsabilità di pianificare: - cosa mangiare: offrite cibi freschi e salutari; - dove e quando: fate partecipare il bambino ai pasti familiari facendolo sedere attorno a una tavola apparecchiata in un contesto sereno. Spegnete la TV ed evitate il ricorso ad altre distrazioni come tablet, smartphone, aeroplanini e simili per indurlo ad aprire la bocca. Mantenete una regolarità degli orari e della durata dei pasti perché il bambino possa imparare presto ad acquisire i vostri stessi ritmi. • al bambino spetta la responsabilità di decidere liberamente se e quanto mangiare ciò che voi genitori gli proponete, senza imposizioni, dando fiducia alla sua capacità di sapersi regolare da sé

Durante il primo anno di vita, è importante riconoscere i segnali di fame e di sazietà che il bambino comunica, in modo da rispondere adeguatamente ai suoi bisogni senza forzarlo o sottoalimentarlo. Ecco come cambiano questi segnali in base all'età:

Bambini tra i 4 e i 6 mesi di età:

- **Segnali di fame:** Il bambino piange o si agita; sorride all'adulto, lo guarda fisso o "tuba" mentre mangia per indicare che ne vuole ancora; muove la testa verso il cucchiaino o cerca di spingere il cibo verso la bocca.
- **Segnali di sazietà:** Il bambino rallenta o interrompe la suzione; sputa fuori il capezzolo o la tettarella; gira la testa dall'altra parte; appare distratto e presta attenzione all'ambiente circostante.

Bambini tra i 5 e i 9 mesi di età:

- **Segnali di fame:** Il bambino afferra con le mani il cucchiaino o il cibo; punta il dito verso il cibo.
- **Segnali di sazietà:** Il bambino comincia a mangiare più lentamente; tiene la bocca chiusa o spinge il cibo lontano da sé.

Bambini tra gli 8 e gli 11 mesi di età:

- **Segnali di fame:** Il bambino raggiunge e afferra il cibo; punta il dito verso il cibo; si eccita quando viene presentato il cibo.

- **Segnali di sazietà:** Il bambino comincia a mangiare più lentamente; spinge via il cibo.

Bambini tra i 10 e i 12 mesi di età:

- **Segnali di fame:** Il bambino esprime preferenze per specifici alimenti con parole o suoni.
- **Segnali di sazietà:** Il bambino agita la testa da una parte all'altra per dire che non ne vuole più.

I GENITORI RAPPRESENTANO IL MODELLO PIÙ IMPORTANTE DA IMITARE

Una provata ed efficace strategia per favorire il consumo da parte dei bambini di alimenti salutarì (frutta fresca, verdura, pesce e legumi) è quello di mostrare al bambino che anche voi genitori li mangiate, facendolo partecipare ai pasti familiari. Mostratevi interessati al suo pasto, incoraggiatelo ad assaggiare i vostri alimenti parlandogli e guardandolo negli occhi, senza mai forzarlo o rimproverarlo se non vuol mangiare. Abituatelo ai nuovi sapori con preparazioni semplici e poco elaborate.

I bambini sono più inclini ad assaggiare un cibo nuovo se vedono che altri di cui si fidano (genitori, nonni, fratelli, insegnanti) lo mangiano, rispetto a quando lo stesso cibo viene proposto solo al bambino. Ciò rassicura il cucciolo d'uomo e contribuisce a confermarli la sua identità e il suo senso di appartenenza al gruppo.

RICORDATEVI CHE LE ABITUDINI ALIMENTARI IMPARATE NEI PRIMI DUE ANNI DI VITA TENDONO A MANTENERSI NEL TEMPO E SARANNO QUINDI LA BASE DELLA SALUTE DA ADULTO: SI RACCOGLIE QUEL CHE SI SEMINA!

QUALI ALIMENTI E IN CHE FORMA?

Verso i 6 mesi di età, quindi, il bambino può iniziare a mangiare liberamente un po' tutto ciò che mangiano i genitori. Pertanto non serve ricorrere agli alimenti dell'industria per l'infanzia, ma basta combinare ogni pasto con la giusta varietà di alimenti: cereali (pane, pasta, riso...), carne o pesce o formaggi o uova o legumi, olio, verdure e frutta.

Preferite alimenti di produzione nazionale e di qualità controllata. Riguardo ai prodotti confezionati si raccomanda di leggere attentamente le etichette e per i prodotti freschi di preferire quelli di produzione integrata o a km zero o da agricoltura e allevamento biologici. Nella scelta del pesce, si consigliano pesci di piccola taglia per ridurre il rischio di un'eccessiva assunzione di mercurio.

Offrite questi cibi variamente sminuzzati, tagliati a pezzi, tritati più o meno finemente con il cucchiaino, ma incoraggiate anche il bambino (se si mostra interessato) a mangiare da sé con le mani, proponendo alimenti tagliati in pezzi a forma di bastoncino di consistenza semisolida e di dimensioni facili da impugnare con il palmo della mano.

Alcuni esempi di finger food domestici per i 6-7 mesi di età possono essere: • fiori di broccoli o cavolfiori con il gambo, bastoncini di carote, patate, zucchini, zucca gialla, cotti a vapore e al dente (se troppo cotti diventano una poltiglia che si scioglie in mano); • strisce di pane, pasta in forme impugnabili; • stick di formaggio; • strisce di carne o pezzi di filetto di pesce senza spine. Più avanti, fra gli 8 e i 10 mesi di età, il cibo da mangiare con le mani può essere proposto a pezzettini dal momento che il bambino sarà in grado di prenderli da sé fra pollice e indice, per portarseli in bocca.

Assecondate la curiosità del bambino all'assaggio senza preoccuparvi delle quantità che assumerà, anche se non corrispondono alle vostre aspettative. Se il bambino all'inizio si rifiuta di assaggiare, non mostratevi in apprensione, potrà completare il suo pasto con il latte. Proverete a riproporre gli alimenti rifiutati a distanza di pochi giorni, anche fino a 10- 15 volte, per favorirne l'accettazione.

Con l'introduzione dei primi cibi solidi si propone anche l'acqua mediante una tazza provvista di manici, in modo che il bambino possa impugnarla e portarla alla bocca con l'aiuto del genitore. La quantità la decide il bambino in quanto è capace di autoregolarsi. Non preoccupatevi se rifiuta di bere perché assume già una buona quantità di acqua attraverso il latte.

Durante il primo anno di vita, il bambino sviluppa progressivamente diverse capacità neuromotorie che gli permettono di acquisire autonomia durante i pasti. Ecco le tappe principali dello sviluppo:

- **Sviluppo dell'uso della Mano e delle Dita:**

- **A 6-7 mesi:** Il bambino con un regolare sviluppo inizia ad afferrare pezzi di cibo a forma di manico usando la "prensione palmare" (ovvero tenendo le ultime 4 dita piegate a gancio sul palmo). Riesce a portare il cibo alla bocca e a mangiare la parte che sporge dal suo pugno.
- **A circa 8-10 mesi:** La presa diventa via via più precisa ed efficiente. Durante l'afferramento inizia a comparire l'opposizione del pollice, che dapprima rimane esteso (creando una "pinza inferiore"). Successivamente, il bambino diventa capace di trattenere un pezzettino di cibo usando solo i polpastrelli del pollice e dell'indice (la cosiddetta "pinza superiore"), muovendoli in modo del tutto indipendente rispetto all'uso delle altre 4 dita.

- **Sviluppo dell'uso di Cucchiaino e Forchetta:**

- **Verso i 6 mesi:** I bambini con un regolare sviluppo sono generalmente capaci di deglutire cibo morbido in purea, oppure sminuzzato/triturato, che viene dato loro con il cucchiaino senza strozzarsi.
- **Verso i 12 mesi (1 anno):** Si raccomanda di dare al bambino l'opportunità di iniziare a usare da sé il cucchiaino e la forchetta.

- **Verso i 16-18 mesi:** Sebbene il bambino possa iniziare a usare le posate da solo a 1 anno, è in questa fascia di età che il loro uso migliora significativamente, permettendogli di mangiare sporcandosi molto meno.
- **Sviluppo dell'uso della Tazza e abbandono del Biberon:**
 - **Verso gli 8-9 mesi:** È importante dare al bambino l'opportunità di usare la tazza per imparare a bere a sorsi. In questa fase, inizia a imparare come usare una tazza aperta e senza beccuccio.
 - **A circa 12 mesi (1 anno):** Il bambino diventa capace di tenere la tazza autonomamente usando due mani. Inoltre, è proprio verso il primo anno di età che l'uso del biberon andrebbe definitivamente eliminato.

ALIMENTI DA EVITARE O LIMITARE

Alcuni alimenti da evitare nel 1° anno di vita sono: • il miele, che può contenere spore di *Clostridium botulinum* con il rischio di intossicazione da tossina botulinica, dal momento che lo stomaco e l'intestino del lattante non contengono acidi in misura adeguata a distruggere queste spore; • il latte vaccino, al posto del latte materno o formulato, per il suo scarso contenuto in ferro e per un eccessivo contenuto proteico. Può essere tuttavia utilizzato in piccole quantità come ingrediente di varie preparazioni o offerto 1-2 volte/ settimana come yogurt o formaggio; • il Te, che contiene sostanze, come il tannino, che legano il ferro e altri minerali riducendone l'assorbimento. Anche la camomilla e varie tisane per lattanti in commercio interferiscono con l'assorbimento di ferro e contengono inoltre zucchero aggiunto; • gli alimenti che comportano un rischio di strozzamento: piccoli, di consistenza dura e di forma arrotondata, scivolosi, collosi, con filamenti (vedi in dettaglio paragrafo specifico).

Alimenti da limitare il più possibile sono invece sale e zucchero e i prodotti che li contengono in misura eccessiva: leggete le etichette! È buona regola che genitori e bambini si abituino a mangiare poco salato. È opportuno utilizzare il sale iodato per tutta la famiglia, in quantità contenute nella cottura degli alimenti (ad esempio pasta, brodo, sughi al pomodoro...) e limitarlo il più possibile come condimento, dando la preferenza alle varie erbe aromatiche per insaporire il cibo (basilico, salvia, origano, ecc.). I prodotti più ricchi di sale sono quelli trasformati (formaggi, salumi, prodotti da forno, carni o pesci in scatola) mentre gli alimenti freschi (frutta, verdure, carne, pesce, latte, uova) ne contengono generalmente basse concentrazioni. Anche nei baby food industriali c'è spesso sale aggiunto in quantità variabile. Se si abituano i bambini al consumo di alimenti poco salati e non troppo dolci, fin dalla primissima - ma infanzia, che è un'età critica per l'apprendimento dei sapori, viene fissata la soglia percettiva del salato e del dolce su livelli più bassi. In tal modo si previene la tendenza a preferire tali alimenti anche più avanti nella crescita.

LE PORZIONI DI CIBO

La capacità innata dei bambini di sapersi regolare da sé su quanto mangiare si rafforza fin dalle loro prime esperienze alimentari grazie alle ripetute conferme che i propri segnali di fame/sazietà sono rispettati dai genitori; tuttavia tale capacità può essere ostacolata da vari fattori – come ad esempio l'esposizione abituale a porzioni eccessive di cibo che potrebbero confondere il bambino, spingendolo a mangiare in eccesso ("il bambino ha gli occhi più grandi della bocca!").

È provato che gli adulti spesso sovrastimano le quantità che un bambino sano dovrebbe normalmente mangiare: tenete presente che il suo stomaco ha un volume pari al suo pugno chiuso! Occorre anche evitare pratiche restrittive imponendogli quantità di cibo troppo scarse per paura che mangi troppo

Dopo un periodo di prova di durata variabile, in cui avrà sperimentato vari assaggi, il bambino spontaneamente aumenterà la quantità e la varietà di cibi solidi che vorrà mangiare e ridurrà la quantità giornaliera di latte.

Porzioni orientative in grammi degli alimenti per bambini da 6 a 24 mesi di età

Le seguenti quantità si riferiscono sempre al peso a crudo dell'alimento. Le porzioni variano in base a due fasce d'età: dai 6 ai 12 mesi, e dall'1 ai 2 anni.

- **Pasta, riso, farina di mais, cous cous (Carboidrati)**
 - *Nota bene:* per la preparazione di brodi, le quantità indicate vanno dimezzate.
 - **Da 6 a 12 mesi:** 20-30 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 35-40 g
- **Carni magre (rosse e bianche)**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 15-20 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 25-30 g
- **Carni stagionate (es. prosciutto, bresaola)**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 10 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 15-20 g
- **Pesce (es. platessa, sogliola, merluzzo, rana pescatrice, alici, sarda, sgombero)**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 20-30 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 30-40 g
- **Formaggi freschi molli (es. ricotta, casatella)**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 25-30 g

- **Da 1 a 2 anni:** 30-35 g
- **Formaggi freschi da taglio (es. caciotta, mozzarella)**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 15-20 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 25-30 g
- **Formaggi a media-alta stagionatura (es. pecorino, parmigiano)**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 10 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 15 g
- **Parmigiano grattugiato (usato per condimento)**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 3-5 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 5 g
- **Legumi secchi**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 15 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 15-20 g
- **Legumi freschi**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 45 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 45-60 g
- **Uova**
 - **Da 6 a 12 mesi:** da mezza a 1 uovo intero
 - **Da 1 a 2 anni:** 1 uovo intero
- **Olio extravergine di oliva**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 5-10 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 5-10 g
- **Verdure crude o cotte non a foglia (es. carote, finocchio, zucchine, patate)**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 50-70 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 80 g
- **Verdure crude a foglia**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 15-20 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 20-25 g
- **Verdure a foglia da cuocere (es. spinaci, bietole, cicoria)**

- **Da 6 a 12 mesi:** 40-60 g
- **Da 1 a 2 anni:** 70 g
- **Verdure miste per zuppe**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 70-80 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 80-100 g
- **Frutta fresca**
 - **Da 6 a 12 mesi:** 50-100 g
 - **Da 1 a 2 anni:** 100-120 g

E SE IL CIBO VA DI TRAVERSO?

Una preoccupazione comune dei genitori, al momento della prima introduzione di alimenti solidi, è che il bambino non sia capace di masticare/deglutire pezzettini di cibo e che rischi di soffocare. Occorre tener presente che i bambini piccoli possiedono il riflesso di espulsione che serve a evitare che oggetti estranei o pezzi di cibo troppo grandi sfuggano posteriormente verso l'ingresso delle vie aeree.

Fino a circa 4 mesi di vita questo riflesso è molto forte e viene sollecitato quando si introduce un oggetto solido (es. un cucchiaino) o un pezzo di cibo nella parte anteriore della bocca: una vigorosa spinta in avanti della lingua proietta fuori dalla bocca l'oggetto e fino a quando il riflesso è così vivace non è possibile dare cibo solido al bambino. Dopo i 4 mesi il riflesso di espulsione si sposta sempre più posteriormente all'interno della bocca e, al contempo, il bambino sviluppa la capacità di masticare giocattoli, le sue dita o altro per scoprire fino a che punto può spingere nel retrobocca il cibo solido. In questo modo il piccolo impara a non riempirsi troppo la bocca, diventando consapevole dei volumi solidi che può gestire in rapporto alle sue capacità. In questa fase è normale che vi siano alcuni conati o qualche piccolo episodio di vomito.

Verso i 6 mesi di vita la maggior parte dei bambini è diventata capace di masticare pezzi di cibo semisolido, (anche in assenza di denti), che viene trasformato in un bolo sicuro da deglutire. Se pezzi di cibo più grossi, (non sufficientemente masticati), raggiungono la parte posteriore della bocca, il riflesso di espulsione li sposta in avanti per essere ulteriormente masticati prima di essere deglutiti, prevenendo il rischio di soffocamento.

I cibi più pericolosi sono quelli che per forma (rotonda o cilindrica) o per dimensioni (tanto piccoli da scivolare giù prima che il bambino li trattienga in bocca o tanto grandi da essere difficili da gestire) entrano più facilmente nelle vie respiratorie e le ostruiscono: noccioline, pezzi di frutta o verdura cruda, wurstel, ciliegie, uva, fagioli etc. Particolarmente pericolosi sono i semi oleosi perché i tessuti dell'apparato respiratorio reagiscono alla loro presenza con un'inflammatione che ne rende più difficile la rimozione.

COME RIDURRE IL RISCHIO DI ASPIRAZIONE DI CIBO NELLE VIE AEREE

- Assaggiare il cibo prima di darlo al bambino: deve essere morbido da impastare con la lingua
- Sorvegliare sempre il bambino mentre mangia
- Non tenere il bambino sdraiato sul dorso durante il pasto e offrigli il cibo solido solo se è in grado di stare seduto e si mostra pronto
- Non esercitare pressioni per infilargli cibo in bocca e aspettate che sia il bambino ad aprire la bocca
- Non distraete il bambino mentre è concentrato a masticare
- Non dategli da bere prima che abbia completato la deglutizione
- Evitate alimenti che per forma e consistenza sono maggiormente a rischio se proposti come tali: - piccoli, duri, tondi, lisci e scivolosi: arachidi e frutta secca oleosa in generale, acini d'uva, piselli, pomodorini, pop corn, olive, caramelle dure o gelatinose...; - cibi che si spezzano senza perdere la consistenza dura come carota cruda, mela cruda...; - cibi con filamenti come finocchio, sedano, prosciutto crudo; - alimenti appiccicosi o collosi. NB: i suddetti alimenti possono essere offerti al bambino solo dopo essere stati adeguatamente trasformati.

E IL RISCHIO DI ALLERGIE?

Le vecchie raccomandazioni secondo cui ritardare l'introduzione nell'alimentazione complementare infantile degli alimenti cosiddetti allergizzanti (uovo, pesce e crostacei, noci e arachidi, pomodoro...) proponendoli uno alla volta secondo un calendario predefinito per prevenire le allergie alimentari, sono ormai ritenute scientificamente superate. Non è stata infatti dimostrata alcuna efficacia preventiva di tale pratica sia nei bambini non a rischio allergico che in quelli con familiarità allergica (figli e fratelli di persone allergiche). È stata anzi prospettata la possibilità che l'introduzione non ritardata degli alimenti allergizzanti possa paradossalmente diminuire il rischio di diventare allergici e pertanto non ci sono motivi per ritardare l'introduzione nella dieta di qualsiasi alimento. Non ci sono nemmeno prove che un'assunzione precoce di alimenti entro i 3-4 mesi di età possa prevenire le allergie nella popolazione generale. Il bambino a rischio allergico dovrebbe introdurre i primi alimenti complementari attorno ai 6 mesi, in modo simile al bambino non a rischio. Su questa linea le più importanti organizzazioni che si occupano di Allergologia pediatrica hanno preso ufficialmente posizione a favore della liberalizzazione e normalizzazione della dieta dei bambini durante l'alimentazione complementare. Tutti gli alimenti possono essere introdotti nella dieta infantile a partire da circa 6 mesi di età con tempi che devono essere dettati essenzialmente dal livello di maturazione psicomotoria, ovvero quando il bambino "si mostra pronto". È stato inoltre definitivamente chiarito che il glutine può essere liberamente introdotto all'inizio dello svezzamento senza che ciò comporti un aumentato rischio di sviluppare la malattia celiaca.

Per garantire un'alimentazione sana e bilanciata, un pasto tradizionale dovrebbe essere composto seguendo questi criteri per ogni singola portata:

- **Primo piatto:** Scegliere cereali come pasta di semola, riso, cous cous, ecc. Per i bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni si consigliano cereali anche semi-integrali,

mentre successivamente si può passare a quelli integrali. I primi piatti vanno conditi preferibilmente con sugo di pomodoro, verdure, oppure serviti in brodo o con passato di verdure. È importante utilizzare olio extravergine d'oliva aggiunto a crudo, evitando grassi saturi come burro, panna e pancetta.

- **Secondo piatto (Frequenze settimanali):** Il secondo piatto costituisce la quota proteica del pasto (pesce, carne magra, legumi, uova o formaggi). Per una corretta distribuzione settimanale, bisogna rispettare queste frequenze:
 - Pesce: 3-4 volte a settimana.
 - Legumi secchi: 3-4 volte a settimana.
 - Carne: 2-3 volte a settimana (avendo cura di alternare carni bianche e carni rosse).
 - Uova: 1-2 volte a settimana.
 - Formaggio: 1-2 volte a settimana.
- **Contorno:** Verdure di stagione, che possono essere servite sia cotte che crude.
- **Condimenti e Complementi:**
 - Usare olio extravergine d'oliva.
 - Usare sale iodato, ma con la regola: meglio poco per tutti!
 - È consentito l'uso di Parmigiano Reggiano grattugiato in piccole quantità.
 - Accompagnare il pasto con del pane.
 - Concludere con frutta fresca di stagione.
 - **Bevande:** L'acqua deve essere considerata come l'unica bevanda del pasto.

L'alternativa nutrizionale: Il Piatto Unico Un'ottima alternativa nutrizionale consiste nel sostituire il classico primo e secondo piatto con il cosiddetto "Piatto Unico". Questo deve essere sempre accompagnato da un contorno di verdure, pane e frutta. Ecco le combinazioni corrette per comporre un piatto unico:

- **Cereali + Legumi:** ad esempio pasta e ceci, polenta con fagioli, ecc.
- **Cereali + Pesce:** ad esempio pasta al sugo di pesce, ecc.
- **Cereali + Carne:** ad esempio maccheroni o lasagne al ragù di carne, ecc.
- **Cereali + Uovo:** ad esempio tagliatelle al sugo d'uovo, ecc.
- **Cereali + Formaggio:** ad esempio pasta con la ricotta, ecc.

Il Piatto del Mangiar Sano (Composizione visiva ideale) Immaginando il pasto come un unico piatto rotondo, la composizione ideale e bilanciata prevede che metà del piatto sia

occupata da Ortaggi e Frutta. L'altra metà deve essere divisa in due parti uguali: un quarto dedicato ai Cereali e un quarto dedicato alle Proteine. Il tutto accompagnato da Acqua come bevanda e Olio EVO come condimento.

Come promuovere l'alimentazione complementare responsiva (In sintesi)

L'alimentazione complementare responsiva è un approccio che rispetta i tempi e i segnali del bambino durante l'introduzione dei primi cibi solidi. Ecco i principi fondamentali per metterla in pratica:

I prerequisiti e il contesto dei pasti:

- **Quando iniziare:** Quando il vostro bambino appare interessato a ciò che mangiate e si mostra "pronto" a mangiare i primi cibi solidi (ovvero sta seduto da sé, raggiunge con la mano il cibo, se lo porta in bocca e mastica), permettetegli di partecipare ai vostri pasti. Generalmente, nel lattante nato a termine, ciò accade intorno ai 6 mesi compiuti.
- **La postazione:** Tenetelo seduto nel seggiolone in modo che ci si possa guardare in faccia.
- **L'ambiente:** Pianificate un contesto alimentare sereno, evitando distrazioni varie.
- **La routine:** Favorite un sano appetito all'ora dei pasti programmati. Prevedete 4-5 pasti al giorno (spuntini compresi), con intervalli di tempo adeguati e offrendo solo acqua negli intervalli.

Il ruolo dei genitori (La regola d'oro dell'offerta):

- **Dare il buon esempio:** Date il buon esempio mangiando cibi salutari e variando la dieta. La regola fondamentale è: decidete voi cosa proporvi da mangiare, ma lasciate che sia il vostro bambino a decidere se e *quanto* mangiare.
- **Cosa offrire:** Offritegli liberamente piccoli assaggi del cibo che state mangiando voi, senza particolari limitazioni. Dal 6° mese qualsiasi alimento può essere offerto senza correre il rischio di favorire le allergie.
- **Nessuna forzatura:** Mostratevi interessati a quel che fa e incoraggiatelo ad assaggiare i vostri alimenti parlandogli e guardandolo negli occhi. Non dovete mai forzarlo o rimproverarlo se non vuol mangiare: all'inizio non è importante *quanto* mangia, perché il latte continua a essere il nutrimento principale con il quale completare il pasto.

L'esplorazione del cibo e la gestione dei rifiuti:

- **Toccare il cibo:** Lasciate che il vostro bambino si diverta a toccare il cibo e a tenerlo in mano. Offritegli all'inizio alimenti semisolidi con forme facilmente impugnabili (a mo' di manico) in modo che possa mangiare la parte che sporge dal pugno.

- **L'uso del cucchiaino:** Quando gli proponete il cibo con il cucchiaino, aspettate che sia lui ad aprire la bocca, rispettando sempre i suoi segnali di fame e sazietà.
- **Come gestire i rifiuti:** Se rifiuta alcuni alimenti, smettete gli assaggi. Riproverete a offrirli più avanti nel tempo per più volte: in un ambiente positivo, possono essere necessari fino a 10-15 assaggi ripetuti a distanza di pochi giorni prima che il bambino impari ad accettare e gradire nuovi alimenti.

Perfetto! Questo testo è una vera miniera d'oro per il tuo database, perché unisce le indicazioni pratiche (cosa fare e non fare a tavola) con la psicologia infantile (come far accettare le verdure).

Ho preso tutto il testo che mi hai incollato e l'ho strutturato in modo logico, dividendo chiaramente le regole comportamentali dai consigli nutrizionali. In questo modo i "chunk" del tuo database vettoriale saranno tematici e precisissimi.

Puoi copiare questo blocco e salvarlo come file .txt (ad esempio Regole_pasto_e_verdure.txt) nella tua cartella data/raw/:

Regole pratiche per il momento del pasto: Cosa fare e cosa evitare

Cosa FARE:

- **L'uso della tazza:** Offrite al bambino acqua utilizzando una tazza provvista di manici, aiutandolo a sostenerla da sé nel portarla alla bocca. Non preoccupatevi se all'inizio non beve, poiché introduce già l'acqua contenuta nel latte.
- **Gestire i pasticci:** Dimostrategli interesse mentre impara a conoscere il cibo e a sviluppare le sue capacità nell'usare mani e bocca. Tollerate, entro certi limiti, che faccia un po' di pasticci durante il pasto. Tuttavia, se il cibo diventa unicamente un gioco, interrompete l'attività.

Cosa NON FARE:

- **Rispetto dei ritmi:** Non cambiate i ritmi e la durata dei vostri pasti; il bambino imparerà presto ad adattarsi.
- **Niente distrazioni:** Non tenete la TV accesa e non impegnatevi in altre distrazioni personali (smartphone, giornali, ecc.) mentre si mangia.
- **Snack fuoripasto:** Non offritegli merendine ipercaloriche fuoripasto, anche se avete paura che abbia mangiato poco al pasto principale.
- **Sicurezza:** Non lasciate mai solo il bambino mentre mangia e non offrite alimenti che presentano un rischio di soffocamento.
- **Nessuna fretta o forzatura:** Non mettete gli fretta e non fatevi tentare dall'infilargli del cibo in bocca sostituendovi a lui. Se non vuole mangiare, interrompete e aspettate il

pasto successivo. Non aspettatevi che mangi qualsiasi alimento le prime volte che lo proponete.

- **Attenzione ai casi speciali:** Non proponete il *finger food* (cibo a pezzi da mangiare con le mani) all'età di 6 mesi se il bambino è nato pretermine o presenta problemi neuromotori: in questi casi, consultate sempre il pediatra.

L'importanza di frutta e verdura e come farle accettare

Quando il vostro bambino è pronto ad assaggiare i primi alimenti diversi dal latte, le verdure rappresentano un eccellente primo cibo da proporre, purché in forme, dimensioni e consistenze adeguate all'età (variamente sminuzzate, cotte e proposte in pezzi morbidi, impugnabili con il palmo).

3 Buone ragioni per consumare frutta e verdura:

1. Aggiungono colore, varietà di sapori e consistenze al pasto.
2. Hanno un elevato contenuto di vitamine, minerali e fibre essenziali.
3. Proteggono contro le malattie da civilizzazione come l'obesità, il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori.

Cosa accade ai primi assaggi (Come interpretare le smorfie): I bambini nascono con una preferenza innata per il sapore dolce. Se vedete qualche strana espressione facciale (di non gradimento) quando il bambino assaggia un nuovo cibo amaro o acidulo per la prima volta, non vuol dire necessariamente che non gli piaccia: probabilmente è solo un'espressione di sorpresa per la scoperta di un sapore non familiare. Imparerà a gradirli attraverso ripetute esperienze di assaggio.

5 Consigli per avere successo nel far accettare le verdure:

1. **Siate persistenti senza forzature:** Se dimostra di non gradire una verdura, riprovate a distanza di pochi giorni. Possono essere necessari fino a 8-10 tentativi prima che la accetti. Offrite una verdura alla volta per farlo abituare ai singoli sapori.
2. **Offrite un'ampia varietà:** Il periodo dello svezzamento è una finestra di opportunità durante la quale il bambino è molto aperto alle novità. Sperimentare sapori diversi aumenta l'accettazione del cibo negli anni successivi.
3. **Siate un buon esempio educativo:** Voi siete il primo modello di riferimento. Condividete queste esperienze mangiando le verdure a tavola con il vostro bambino e mostrando che vi piacciono (le azioni valgono più delle parole).
4. **Favorire un ambiente rilassante:** Mettete il bambino a tavola senza TV e distrazioni. Rispettate i suoi segnali di fame e sazietà: lasciate a lui la possibilità di decidere da sé *quanto* mangiare per sviluppare una sana relazione con il cibo.

5. **Coinvolgete il bambino:** Verso i 2 anni i bambini possono diventare "schizzinosi". Coinvolgeteli nella preparazione dei pasti o nella spesa (es. staccare le foglie di insalata, dare forme divertenti al cibo). Il contatto con il cibo ne favorisce l'accettazione.