

ein støð í Bretlandi kalvar gangandi í alikari, sum teir vænta at fáa rogn og sil undan í ár. Stovnar av tilíkum lívfiski ganga somuleiðis á 3 royndarstøðum í Noregi umframt hjá P/F Fiskaaling í Føroyum.

Í 1983 vórðu 15 kalvaspraggur sleptar í sílabyrgingarnar á Oyrabakka. Bert 3 halda vit eru eftir, men tær liggja nógv niðurgrivnar í sandinum, so eingin veit talið við vissu. Hetta var trolkalvi úr Vestmanna.

Í einum alikari í Niðristovu við Áir ganga nú 15 lívfiskar. Hesir eru fingnir á línu í 1984. Upprunaliga vóru teir 26 í tali. Teir, ið eftir eru, trívast væl, og fleiri eta nú úr hondini.

Nú verður roynt um nakrir av hesum kalvunum eru búnir at gýta. Um so er, verður rogn og sil í fyrstu syftu send við flogfari til Norðsjóarmiðstøðina í Hirtshals.

Klekistøð til kalva

Um eitt ella tvey ár er síðani ætlanin, at Fiskirannsóknarstovan hevur egna klekistøð, ið kann arbeiða víðari áleiðis at loysa gátuna um, hvussu tú fært kalva burtur úr kalvarogni.

Av gýtingarøkjunum flotna kalvarognini eftir øllum at døma upp í sjógvin av 800 til 1000 metra dýpi. Rognkorn eru t.d. funnin á millum 100 og 200 metra dýpi á firðunum í Noregi, og niður á 350 metrar. Yngulin fæst frá vatnskorpuni og 100 metrar niður í sjógvin.

Eitt umhvørvi, sum svarar til hesi viðurskipti, er sum vera man torført at skapa á eini alistøð. Norðmenn hava nú roynt í eini 10 ár.

Torført men ikki ógjørlegt

At tað í 1979 eydnaðist at fáa tveir »smákalvar« undan, sigur okkum tó, at tað ber til, men um tað fara at ganga 2 ella onnur 10 ár, áðrenn smákalvi kann alast fram í stórum nøgdum, veit eingin.

O.u. 10 ára arbeiði lá aftan fyri, áðrenn bretar rættuliga høvdu tamarhald á at ala yngul undan hvasskvoysu, og ikki meira enn o.u. 100 túsund ala teir um árið. Eini 15 ár gingu jú eisini frá tí, at Fiskirannsóknarstovan fyri Júst í Túni í 1966 innflutti fyrstu rognini undan ælabogasli (í hesum umfari), og til gongd av álvara kom á aling av sili og laks í Føroyum.

Livst so spyrst.

Ritgerðir

Smidt, J., 1904: On pelagic post-larval Halibut. Medd. Komm. Danm. Fisk. Havunders. Ser. Fisk. 3 (1) pp. 3-13.

Kalvakanningar við Magnusi Heinasyni

november 1983—januar 1984

Hjalti í Jákupsstovu

Fiskirannsóknarstovan

Inngangur

Vitan hevur leingi verið um, at kalvi gýtur á djúpum vatni uml. 1000 m og djúpari sunnan fyri ryggin, ið bindur saman Skotland, Føroyar, Ísland og Grønland (Joensen 1954). Men kunnleiki hevur ikki verið til nakað ávist øki, har gýting er farin fram.

Um ársskiptið 1982-83 kom Skálaberg, ið royndi eftir ísfiski undir Føroyum, fram á eitt gýtingarøki hjá kalva í ein útnyrðing av Føroya Banka, og gjørdi hann tveir góðar túrar har.

Nógur smáur kalvi verður fiskaður av trolarunum undir Føroyum, serliga teimum, ið trola innan fyri 12 fj. úr landi. Fiskirannsóknarstovan setti tí, at vandi kundi vera fyri kalvastovninum, um trolararnir eisini lögdu seg eftir at fiska stóran kalva á gýtingarøkinum, og heitti á Landsstýrið um í ársskiptinum 1983-84 at steingja økið, har »Skálaberg« hevði fingið gýtingarkalvan árið fyri, fyri allari veiðu við troli og gørnum.

Landsstýrið og løgtingsins fiskivinnunevnd mettu, at grundarlag var fyri steingingini, og við kunngerð nr. 11 frá 20. desember 1983 varð økið avmarkað av koordinatunum

61°40' N—09°45' V,
61°40' N—09°00' V,
60°58' N—09°20' V og
60°58' N—10°00' V

stongt fyri veiðu við troli og gørnum í tíðarskeiðnum 26. desember 1983 til 20. januar 1984.

Umframt fór Fiskirannsóknarstovan undir kanningar av gýtingarøkinum hjá kalva og av kalva yvirhøvur. Kanningarnar fóru fram við Magnus Heinason á trimum túrum í nov., des. 1983 og jan. 1984.

Í hesi frágreiðing verða nøkur av úrslitunum av hesum kanningunum viðgjørd.

Arnold Henriksen frá Fiskirannsóknarstovuni var við Magnusi Heinasyni allar kalvatúrarnar, og hevur hann staðið fyri øllum innsavningararbeiðinum. Hann hevur eisini aldursgreinað allar kalvanyturnar.

Framferð


Kanningarnar fóru fram sum praktiskar fiskiroyndir, har trolað varð á ymsum dýpum á ymsum leiðum. Í talvuni niðanfyrir er víst tíðarskeið fyri hvønn túrin, tal av hálum, tal av kalvum fiskaðir, og veiðan av kalva í ókrúvdari vekt hvønn túrin.

Túr nr.	Tíðarskeið	Tal av hálum	Veiðan í tali	Veiðan í vekt (kg)
I	2-20/11	60	98	534.7
II	9-18/12	36	212	6968.4
III	7-17/ 1	44	297	9784.6
Íalt		140	607	17287.7


Á fyrsta túrinum var lítið av kalva at fáa á gýtingarøkinum. Magnus Heinason fór tí ta seinna helvtina av túrinum at royna eftir gullaksi. Eftir umstøðunum varð roynt eftir kalva við kassatroli, ballóntroli og stjørnutroli, og tá roynt varð eftir gullaksi við ídnaðartroli.

Allur kalvi (eisini tá roynt varð eftir gullaksi) varð mátaður til longstu longd, vigaður bæði krúvdur og ókrúvdur, kannað varð eftir, um tað var ein silja (hann) ella ein rognakalvi (hon), í hvønn mun fiskurin var við at búnast at gýta, og hvussu langt hann var komin í búningini. Eisini var magin vigaður við innihaldi, og nitrurnar tiknar til aldursgreiningar.


Á mynd 1-4 er víst byrjunnar positióin fyri hvørt hál fyri allar túrarnar og fyri hvønn túr sær. Innteknað er eisini stongda økið.




Mynd 1. Byrjunarpositióinir fyri trolhál. Kalvaroyndir Magnus Heinason november 1983-januar 1984.



Mynd 2. Byrjunarpositióinir fyri trolhál. Kalvaroyndir Magnus Heinason november 1983.



Mynd 3. Byrjunarpositióinir fyrri trollhál. Kalvaroyndir Magnus Heinason desember 1983.



Mynd 4. Byrjunarpositióinir fyrri trollhál. Kalvaroyndir Magnus Heinason januar 1984.


ÚRSLIT

Veida per veiðuorku


Í talvuni niðanfyri er meðalveiðan av kalva í kg per troltíma víst fyrri hvønn túr sær, roknað út ávikavíst fyrri allan túrin, fyrri hálini í og uttanfyri kassan.

Túrur	kg/tíma allan túrin	kg/tíma í kassanum	kg/tíma uttanfyri kassan
Novembur	2.7	2.9	2.7
Decembur	53.7	63.3	3.9
Januar	73.9	104.2	38.3


Veiðan pr. troltíma vaks munandi í kassanum frá november til desember og aftur frá desember til januar. Talið av hálum í kassanum var so mikið stórt, at eingin ivi kann vera um, at kalvi ferðaðist til hetta økið í tíðarskeiðnum. Vestanfyri kassan, norður av Bill Bailey og Lousy banka vóru eisini heilt góð hál við kalva gjørd í januar mánaða og helst gýtur kalvi eisini har. Hetta sæst eisini á mynd 5, hvar trolstøðirnar, har veiðan av kalva var meira enn 100 kg, eru settar út.



Mynd 5. Byrjunarpositióinir fyrri trollhál har veiðan av kalva var meira enn 10 kg. Magnus Heinason november 1983-januar 1984.



Mynd 6. Veiða av kalva pr. troltíma móti dýpi fyrri øll hál.
Magnus Heinason november 1983-januar 1984.



Mynd 7. Veiða av kalva pr. troltíma móti dýpi í kalvakassanum.
Magnus Heinason november 1983-januar 1984.

Veiða móti dýpi

Á mynd 6–7 er víst veiða í kg pr. troltíma móti dýpi fyrri allar túrarnar á øllum økjum (mynd 6) og fyrri gýtingarøkið (mynd 7). Báðar myndirnar vísa, at tey bestu hálini vóru á dýpum millum 800 og 1000 m.

Búnaðarstig

Fyrri at kanna búningina fram í móti gýting vóru rogn og sil mett eftir einum stigi frá 0 til 7, har 0 er óbúgvið, 1–5 ymisk stig í búningini, 6 er gýtandi og 7 útgýtt. Í talvuni niðanfyri er víst fyrri ávikavist siljakalva (hannkalvi) og rognakalva (honkalvi) tal av fiski í hvørjum bólki hvønn túr.

Stig	November		December		Januar	
	hann	hon	hann	hon	hann	hon
0	37	50	9	10	4	3
1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0
3	1	2	0	0	0	0
4	13	0	94	94	1	0
5	5	1	5	0	158	106
6	0	0	0	0	25	0
7	0	0	0	0	0	0

Tað mesta av kalva, sum varð fiskað í november, var ungur, óbúgvinn fiskur. Tað, ið fekst av búnandi kalva, var á búnaðarstigi 2–5. Í desember var tann vaksni kalvin á stigi 4 og 5 og í januar tað mesta á stigi 5, men tó vóru nakrir av siljakalvanum klárir til gýtingar og gýtandi. Tað er vanligt hjá nógvum fiskasløgum, at hannfiskurin er klárur at gýta áðrenn honfiskurin. Hannfiskurin er ofta eisini gýtandi aftaná, at honfiskurin er liðugur at gýta.

Búningaraldur

Í talvu 1 er búnaðarstig sett út móti aldri fyrri silja og rognakalva allar túrarnar. Eftir hesari verður nakað av siljakalvanum gýtingarførur, tá hann er 5 ár, og allur tá hann er 9 ár. Av rognakalvanum harafturímóti sýnist búningin at byrja nakað seinni, ávikavist 8 og 11 ár.


TALVA 1.

Búnaðarstig móti aldri á siljakalva

Aldur	Búnaðarstig							
	0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5	0	0	0	0	0	0	0
4	16	0	0	0	0	0	0	0
5	16	0	0	1	11	11	8	0
6	9	0	0	0	29	22	3	0
7	3	0	0	0	16	15	0	0
8	1	0	0	0	18	25	4	0
9	0	0	0	0	5	30	5	0
10	0	0	0	0	5	20	2	0
11	0	0	0	0	2	8	1	0
12	0	0	0	0	3	5	0	0
13	0	0	0	0	4	1	0	0
14	0	0	0	0	6	3	0	0
15	0	0	0	0	5	1	0	0
16	0	0	0	0	0	4	0	0
17	0	0	0	0	1	6	0	0
18	0	0	0	0	0	4	0	0
19	0	0	0	0	1	2	2	0
20	0	0	0	0	0	1	0	0
21	0	0	0	0	0	1	0	0
22	0	0	0	0	1	2	0	0
23	0	0	0	0	0	2	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	1	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0

Búnaðarstig móti aldri á rognakalva

Aldur	Búnaðarstig							
	0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	8	0	0	0	0	0	0	0
4	26	0	0	0	0	0	0	0
5	15	0	0	0	0	0	0	0
6	7	0	0	0	0	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0	0	0
8	1	0	1	0	5	4	0	0
9	4	0	0	0	10	8	0	0
10	0	0	0	1	15	9	0	0
11	1	0	0	0	19	8	0	0
12	0	0	0	1	4	10	0	0
13	0	0	0	0	7	8	0	0
14	0	0	0	0	12	9	0	0
15	0	0	0	0	2	7	0	0
16	0	0	0	0	2	4	0	0
17	0	0	0	0	3	7	0	0
18	0	0	0	0	2	5	0	0
19	0	0	0	0	1	4	0	0
20	0	0	0	0	5	3	0	0
21	0	0	0	0	1	4	0	0
22	0	0	0	0	1	8	0	0
23	0	0	0	0	2	1	0	0
24	0	0	0	0	1	3	0	0
25	0	0	0	0	1	1	0	0
26	0	0	0	0	0	2	0	0
27	0	0	0	0	1	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	1	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	1	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0




Mynd 8. Aldursbýti av kalva veiddur við Magnus Heinason november 1983-januar 1984.

Aldursbýtið


Aldursbýtið fyri allan kalva veiddur undir kannungunum er víst á mynd 8. Vanliga verður aldurin á fiski roknaður at skifta 1. januar, sjálvt um fiskurin er gýttur eina aðra tíð á árinum. Fyri at fáa samanberilig virðir er tó í hesi frágreiðingini roknað við, at aldurskiftið fer fram 1. februar. Á mynd 8 er víst tal av kalva, veitt í hvørjum aldursbólki. Størsti aldursbólkur var 5 ára gamal kalvi. Síðan minkaði talið í hvørjum aldursbólki meira ella minni javnt til 1 kalva sum var 30 ár, tá hann var fiskaður.

Vøkstur

Í talvunum á síðu 41 er sett út meðallongd og meðalvekt fyri hvønn aldursbólka av siljakalva og rognakalva. Á mynd 9 og 10 er longdin fyri hvønn kalva sett út móti vekt fyri ávikavist hannar og honir. Sum tað sæst, veksur rognakalvin skjótari enn siljakalvin, serliga fyri fisk eldri enn 6 ár. Honkalvin verður eisini longri og tilsvareandi yngri. Vakstrarlopið hjá rognakalva frá 6 til 7 ár kemur helst av, at roynt hevur verið meira eftir gýtingarkalva enn óbúnum kalva, og at veiðan av óbúnum rognakalva í aldursbólkunum 6–9 ár hevur verið lutfallsliga ov lítil.



Mynd 9. Longd av siljakalva (hann) sett út móti aldri.



Mynd 10. Longd av rognakalva (hon) sett út móti aldri.

Meðalvekt móti aldri (cm).

Aldur	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rogn	48.4	59.5	67.1	84.3	83.0	134.3	133.5	151.3	159.3
Sil	45.2	57.1	68.7	77.7	82.5	91.0	98.0	105.2	107.9

Aldur	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rogn	164.7	177.3	177.0	182.2	181.5	191.5	198.1	200.0	198.0
Sil	123.6	115.2	124.7	125.3	126.8	135.9	137.5	142.0	157.0

Meðalvekt móti aldri (kg).

Aldur	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rogn	0.84	2.23	3.01	6.29	6.11	25.10	29.05	44.49	51.14
Sil	0.73	1.92	3.33	4.85	5.91	7.94	10.38	12.64	14.23


Aldur	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rogn	58.50	74.37	74.34	80.29	78.58	98.40	102.52	112.47	101.84
Sil	22.38	18.23	24.49	24.28	25.21	31.17	32.68	34.02	45.45

Vekt og longd


Á mynd 11 er vektin hjá hvørjum kalva sett út móti longdini. Hóast rognakalvin veksur skjótari enn siljakalvin, er eingin munur á skapinum. Á myndini eru tí bæði kynini sett saman uttan nakað frámerki.

Veiða av kalva

Tøl fyri heildarveiðuna av kalva, fiskaður undir Føroyum, eru tøk fyri at kalla hvørt ár aftur til 1906 (mynd 12) (Jespersen 1938 og Bulletin Statistique 1947–1982). Í hesum langa tíðarskeiði er veiðan broytt nógv. Fyrst í øldini royndu bretar og skotar nógv við línu eftir kalva og øðrum fiski undir Føroyum. Í tíðarskeiðnum 1906–09 var árliga veiðan oman fyri 2000 tons, men síðan minkaði hon ár undan ári; í 1914 var hon komin niður í 900 tons. Undir fyrra veraldarbardaga var lítil roynd undir Føroyum, men hon vaks síðan aftur. Í 1921 var veiðan aftur omanfyri 2000 tons. Eftir hetta minkaði veiðan aftur hvørt ár til 1929, tá hon var niðan fyri 700 tons. Síðan kom aftur ein vøkstur fram til seinna veraldarbardaga. Eftir hetta vaks veiðan hvørt ár til tíðarskeiðið 1955–61, tá meðal veiðan var umleið 2500 tons árliga. Síðan er árliga veiðan støðugt minkað. Taka vit tíðarskeiðið, síðan fiskimarkið fór út á 200 fj., hevur meðalveiðan av kalva verið undir 700 tons árliga.



Mynd 11. Longd av kalva sett út móti vekt.




Mynd 12. Samlaða veiðan av kalva undan Føroyum 1906-1982.

Gýtingarøkið

Víst er á í hesi grein, at kalvi serliga tykist gýta á einum lítlum øki, (kassin á mynd 1), og ein kann spyrja hví júst hetta økið? Frá øðrum fiskasløgum vita vit, at tað kann vera torført at greina út, hvat tað er, sum ger at fiskur gýtir á einum øki og ikki á øðrum. Hinvegin hevur tað ofta víst seg, at partur av svarinum er at finna í sjóvarhitanum og í streymgongdini. Skal eitt øki vera gott gýtingarstað, so skal fiskurin fyri tað fyrsta vera førur fyri at finna tað. Til tað kann hann nýta hitan, ella hann kann svimja við ella móti einum streymi. Harafrat má streymurin verða so, at gýttu eggini við streyminum verða førd til góð uppvakstrarøki.

Um kalva vita vit enn alt ov lítið til, at nakað kann sigast við vissu, men vert er at leggja til merkis, at hetta økið, har kalvin gýtir, í ávísan mun er heilt sermerkt. Hyggja vit at einum botnkorti (mynd 13), síggja vit, at gýtingarøkið liggur beint við munnan á Bankarennuni, t. v. s. rennuni millum landgrunnin og Føroya



Mynd 13. Dýptarkort fyri økið við Føroyar, kalvakassin og tann kaldi botnstreymurin vestur úr rennuni millum Føroya Banka og landgrunnin.

Banka. Henda renna er djúpasta skarðið, sum er í rygginum, ið gongur frá Skotska meginlandinum til Grønlands yvir Føroyar og Ísland.

Sunnan og vestan fyri henda rygg er heiti Atlantssjógvurin at finna niður á stórt dýpi, men norðan- og eystanfyri kólnar sjógvurin nógv skjótari niðureftir, og undir umleið 500 metra dýpi er hann vanliga kaldari enn 0 stig. Hesin kaldi sjógvur hevur lyndi at floyma út í Atlandshavið gjøgnum skørðini á Rygginum, og gjøgnum Bankarennuna kemur hann mest sum ein á norðureftir yvir botnin. Hetta sæst á mynd 13.

Myndin vísir eisini, at tá kaldi sjógvurin er komin út úr Bankarennuni, bítir hann seg í tvær greinir, har onnur fer móti vestri fram við djúpu hellingini norðan fyri bankarnar. Um hesa grein vita vit ikki nógv, men hin greinin gongur móti Íslandi og heldur seg fyrst á umleið 1000 metra dýpi á vestaru síðu á Rygginum. Komin til Íslands, heldur hon fram vestur eftir undir Suðurlandinum, meðan hon dýpist so hvørt og kemur undir 1500 metra dýpi. Heilt vestur á Reykjanesryggin og suður fram við honum er henda grein fylgd.

Hesar báðar greinirnar føra við sær sjógv, sum er væl kaldari enn umhvørvið, og rákið í teimum er eisini væl harðari. Kalvi frá einum stórum øki kundi tí nýtt tær til at finna á gýtingarøkið. At kalvarnir steðga, tá teir koma til økið, og ikki halda fram inn í Bankarennuna, er eisini skilligt, tí í rennuni er rákið øgiliga hart. Beinleiðis streymmátingar benda á, at kalda botnvatnið í rennuni javnan hevur eina ferð um 2–3 míl.


Tá kalvin hevur gýtt, kunnu eggini fylgja hesum streymgreinum aftur. Hvussu leingi eggini halda sær í kalda botnstreyminum, áðrenn tey flotna upp í ovaru sjóløgin, vita vit ikki, men eisini havstreymarnir í erva kunnu føra eggini langa leið.

Niðurstøða

Tað lívfrøðiliga tilfarið, sum er lagt fram í hesi frágreiðingini, samsvarar í stóran mun við tað, ið aðrir eru komnir til; tað er tí ikki neyðugt at viðgera hetta meira nú.

Vitan hevur verið um, at kalvi gýtir undir Føroyum; hetta er tó fyrstu ferð, at tað hevur verið møguligt at vísa á eitt ávíst øki, har kalvi gýtir. Um hetta er tað einasta gýtingarøkið hjá kalva undir Føroyum, vita vit ikki, men Fiskirannsóknaðstovan fer tey komandi árin at kanna hetta nærri.

Tær stóru broytingarnar í veiðuni av kalva, vit hava sæð í hesi øldini, siga ikki so nógv uttan at kannað verður, hvørjar orsøkirnar eru. Koma broytingarnar t.d. av ymiskari roynd, ella av at stovnurin verður niðurfiskaður ella av, at stovnurin kastar so ymiskliga av sær? Hóast nakrar kanningar av kalva hava verið gjørdar undir Føroyum í hesi øldini (Joensen 1954, Rae 1959, Jespersen 1938), so hava



Mynd 14. Árliga meðalveiðan uppá veiðuorku (kurvar pr. dag úr havn) av kalva undan Føroyum hjá bretskum línubátum 1906-1936.

hesar ikki fyrst og fremst verið miðaðar móti stovnsmetingum. Vit hava sostatt t.d. einki tilfar um árligu tilgongdina av kalva. Eitt sindur av tilfari er tó um veiðuna í mun til veiðuorkuna, og ber tað til út frá hesum at fáa eina ábending um, í hvønn mun tann minkandi veiðan er komin av veiðuávim.

Danski fiskifrøðingurin P. Jespersen viðger kalvaveiðina m.a. undir Føroyum í eini ritgerð frá 1938. Í hesi ger hann upp veiðuna uppá veiðuorku fyri skotskar og bretskar línubátar og trolarar. Í øllum fyra førinum vísir tað seg at vera ein niðurgongd í veiðuni uppá veiðuorku frá 1908 til 1913. Síðan er ein uppgongd aftur aftaná fyrra veraldarbardaga; men heilt skjótt aftur ein støðug minking. Á mynd 14 er árliga meðalveiðan uppá veiðuorku (kurvar pr. dag úr havn) hjá bretskum línubátum víst (eftir Jespersen 1938). Í 1908 fingur teir í meðal 7 1/2 kurv um dagin, í 1913 bert 3 1/2. Í 1919 10 1/2 kurv um dagin og í 1936 bert 1 1/2 kurv. Minkingin í veiðuni uppá veiðuorku hesi bæði tíðarskeiðini við einum vøxturi aftaná at stovnurin hevði fingið frið eina tíð gevur eina góða ábending um, at niðurgongdin er komin av, at stovnurin er minkaður av fiskiávim. Í tíðarskeiðnum beint aftaná seinna veraldarbardaga vaks tann samlaða royndin undir Føroyum eftir øllum fiski. Eisini var ein beinleiðis roynd eftir kalva t.d. av norðmonnum. Nógur smáur kalvi verður fiskaður sum hjáveiða av línubátunum og av trolar-

unum, ið fiska nær landi, og nógvur stórir kalvi av teimum, sum fiska á djúpari vatni. Tann samlaða royndin eftir allarflestu fiskasløgunum er longu ovmikið stór. Hóast vit eingi tøl hava, vísir royndin frá tíðini undan seinna veraldarbardaga, at stovnurin tá minkaði av veiðiávum. Tað eru fleiri grundir til at halda, at tann samlaða royndin eftir kalva nú er minst líka stór sum tá.

Ein nýggjur fiskiskapur eftir kalva á gýtingarøkinum kann tí skjótt vísa seg at vera kalvastovninum til so stóran skaða, at tað bótist ikki aftur í bræði.

Ritgerðir

Jespersen, P., 1938: Statistical survey of the halibut fishery in the waters round the Faroes, Iceland and Greenland. Medd. Komm. Danm. Fisk. Havunders. Ser. Fisk. X, pp. 1–36.

Joensen, J.S., 1954: On the life history of halibut in Faroe Waters. Medd. Danm. Hav. Ny Serie Bd. 1, pp. 3–25.

Rae, Bennet B., 1959. Halibut—Observations on its size at first maturity, sex ratio and length/weight relationship. Marine Research 1959 No. 4. 19 pp.

Yngulkanningar

Andras Kristiansen

Fiskirannsóknarstovan

1. Inngangur:

Kunnleiki um tilgongdina til fiskastovnarnar gevur betri møguleikar fyri eini hollari ráðgeving um, hvussu vit eiga at umsita stovnarnar. Tílíka vitan kunnu yngulkanningar við havrannsóknarskipi í ein ávísan mun geva okkum.

Yngulkanningar, sum fara fram við Føroyar nú um árin, byrjaðu í 1972. Tær vóru tá ein partur av eini regluligari millumlanda yngulkanning, sum fór fram við Føroyar, Ísland og Grønland. Onglendingar vóru teir einastu, sum gjørdur kanningar hetta árið og í 1973. Fiskirannsóknarstovan kom upp í kanningararbeiðið í 1974. Onglendingar hildu fram við teirra kanningum til 1977. Eisini fronsk havrannsóknarskip hava tikið lut í hesum kanningararbeiðnum; tey gjørdur kanningar frá 1976 til 1980. Síðani tá er tað bert Fiskirannsóknarstovan, sum hevur gjørt yngulkanningar við Føroyar. Lagt skal verða afturat, at yngulkanningar javnan hava verið gjørdar við Føroyar áður; dansk havrannsóknarskip gjørdur tílíkar kanningar við Føroyar áðrenn seinna heimsbardaga og hildu fram eftir at kríggið var av. Eisini Fiskirannsóknarstovan hevur áður gjørt yngulkanningar við Føroyar.

Í hesi greinini verða úrslitini frá kanningunum, sum vórðu gjørdar í tíðarskeiðnum 28. juni til 8. august í 1984, lögð fram; hesi verða eisini samanborin við úrslitini árin frammanundan.

2. Framferðarháttur

Í slíkum kanningum sum yngulkanningunum, hvar úrslitini fyri fleiri ár skulu samanberast, ræður um, at farið verður fram á sama hátt ár um ár; um ikki kunnu úrslitini ikki samanberast. Tí hevur sami fiskireiðskapur og sami framferðarháttur verið brúktur øll hesi árin. Tó fór ein broyting viðvíkjandi rannsóknarskipi fram í 1981, tá Fiskirannsóknarstovan fekk MAGNUS HEINASON sum rannsóknar-