

Questão 1

Dados do problema

Questão 3

A demonstração para este exercício consistirá em construir γ de forma a possuir todos os elementos de α e ir 'inserindo' no conjunto também os elementos de β que sejam L.I. com α , dessa maneira chegará um momento em que não há mais elementos em β que sejam L.I. com α e então γ será um conjunto gerador de \mathbb{V} e $\alpha \subset \gamma \subset \beta \cup \alpha$

Lema 1 (Lema da lesma). *Seja \mathbb{V} um espaço vetorial, e $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in \mathbb{V}$, com X linearmente independente de modo que $X \cup \{w\}$ é linearmente dependente, $\forall w \in \mathbb{V}$. Ou seja, X é um conjunto L.I. maximal, que possui o máximo de elementos L.I. de um dado espaço vetorial. Então X gera \mathbb{V} .*

Demonstração. Seja $w \in \mathbb{V}$, então por hipótese $\{w, x_1, \dots, x_n\}$ é L.D., ou seja $\exists a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ com ao menos um dos $a_i \neq 0$ de forma que

$$a_0 w + a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$$

De fato, $a_0 \neq 0$, caso contrário $a_0 = 0 \implies a_i \neq 0, i \neq 0$ mas isso contradiz o fato de X ser L.I.

Portanto podemos reescrever

$$w = \frac{-a_1 x_1}{a_0} + \dots + \frac{-a_n x_n}{a_0}$$

Ou seja, w é uma combinação linear dos elementos de X , como estamos assumindo $\forall w \in \mathbb{V}$, então X gera \mathbb{V} q.e.d.

Questão 4

Dada a hipérbole h

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Podemos fazer a seguinte mudança de variáveis: $\begin{cases} x = au \\ y = bv \end{cases}$

Então teremos:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\ &= \frac{a^2 u^2}{a^2} - \frac{b^2 v^2}{b^2} \\ &= u^2 - v^2 \end{aligned}$$

Então a transformação linear T_1 que leva a hipérbole h na nova hipérbole h_1 , e: $T_1 \cdot (x, y) = (u, v)$

Observando agora que em h_1 temos uma diferença de quadrados, e que em $xy = 1$ temos um produto de dois termos, podemos então pensar na seguinte mudança de variáveis: $\begin{cases} u = \frac{1}{2}(p - q) \\ v = \frac{1}{2}(p + q) \end{cases}$

Dessa maneira:

$$\begin{aligned} u^2 - v^2 &= 1 \\ &= \frac{1}{4}(p - q)^2 - \frac{1}{4}(p + q)^2 \\ &= \frac{1}{4}(\cancel{p^2} - 2pq + \cancel{q^2} - \cancel{p^2} - 2pq - \cancel{q^2}) \\ &= pq \end{aligned}$$

Sendo esta $pq = 1$ a hipérbole h_2 . Então há uma transformação linear T_2 que leva h_1 em h_2 , de forma que $T_2 \cdot (u, v) = (p, q)$

Para encontrar a transformação linear que leva h_0 em h_2 basta:

$$\begin{aligned} T_1 \cdot (x, y) &= (u, v) \\ T_2 \cdot (u, v) &= (p, q) \\ \text{logo:} \\ (p, q) &= T_1 \cdot T_2 \cdot (x, y) \end{aligned}$$

Sendo $D = T_1 \cdot T_2$, esta é a matriz procurada. Para saber quais são as matrizes T_1, T_2 , podemos fazer a matriz jacobiana da mudança de variável:

$$T_1 = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$$

E a matriz T_2

$$T_2 = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial p} & \frac{\partial u}{\partial q} \\ \frac{\partial v}{\partial p} & \frac{\partial v}{\partial q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

E finalmente $D = T_1 \cdot T_2$

$$D = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{a}{2} & -\frac{a}{2} \\ \frac{b}{2} & \frac{b}{2} \end{bmatrix}$$

Verificando:

$$\begin{bmatrix} \frac{a}{2} & -\frac{a}{2} \\ \frac{b}{2} & \frac{b}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \left[\frac{ax}{2} - \frac{ay}{2}, \frac{bx}{2} + \frac{by}{2} \right]$$

Usando essas novas coordenadas em h

$$\frac{\left(\frac{ax}{2} - \frac{ay}{2}\right)^2}{a^2} - \frac{\left(\frac{bx}{2} + \frac{by}{2}\right)^2}{b^2} = 1$$

$$b^2 \left(\frac{a^2 x^2}{4} - \frac{2a^2 xy}{4} + \frac{a^2 y^2}{4} \right) - a^2 \left(\frac{b^2 x^2}{4} + \frac{2b^2 xy}{4} + \frac{b^2 y^2}{4} \right) = b^2 a^2$$

$$a^2 b^2 xy = a^2 b^2$$

$$y = \frac{1}{x}$$

Questão 5

Item a

Lema 2. *Seja $X(t)$ um vetor, se $\|X(t)\| = c, \forall t \in \mathbb{R}, c \neq 0$, ou seja, vetor de módulo constante não nulo, então:*

$$\langle X(t), X'(t) \rangle = 0$$

Demonstração.

$$\langle X(t), X(t) \rangle = c^2$$

Como vale para todo t , podemos derivar

$$\frac{d}{dt} \langle X(t), X(t) \rangle = \frac{d}{dt} c^2 = 0$$

Aplicando a regra da cadeia

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle X(t), X(t) \rangle &= \langle X(t)', X(t) \rangle + \langle X(t), X'(t) \rangle \\ &= 2\langle X(t), X'(t) \rangle = 0 \end{aligned}$$

$$\text{e } 2\langle X(t), X'(t) \rangle = 0 \implies \langle X(t), X'(t) \rangle = 0$$

q.e.d.

Seja então $c(t_0) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ a posição da partícula no tempo t_0 dada pela função $c : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, sabemos que velocidade mede a variação da posição, portanto $\dot{c}(t_0) = (\dot{x}(t_0), \dot{y}(t_0), \dot{z}(t_0))$ é o vetor velocidade no ponto t_0 que é um vetor tangente a curva descrita por $c(t)$ no ponto t_0 . Como $\dot{c}(t_0)$ é não nulo, então $|\dot{c}(t_0)| \neq 0$, podemos então definir um vetor unitário que é tangente a curva:

$$T(t_0) = \frac{\dot{c}(t_0)}{\|\dot{c}(t_0)\|}$$

Então $T(t_0)$ é o vetor que nos dá a direção da velocidade.

Se olharmos para a variação de $T(t)$, temos $T'(t)$ e como $\|T(t)\| = 1$, então pela Lema 2

$$\langle T(t), T'(t) \rangle = 0$$

Tomamos então o vetor unitário na direção de $T'(t_0)$, que continua sendo ortogonal a $T(t_0)$

$$N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|}$$

E este é o vetor na direção Normal.

Aceleração é a variação da velocidade, temos então que aceleração é dada por $\frac{d}{dt} \dot{c}(t) = \ddot{c}(t)$.

Como temos dois vetores ortogonais $T(t_0)$ e $N(t_0)$, podemos decompor as componentes de $\ddot{c}(t_0)$ nestes vetores, de forma que a aceleração será uma combinação linear desses vetores ortogonais.

Sendo x_T a componente aceleração tangencial, e x_N a componente aceleração normal, ambos escalares, temos então definido o vetor de aceleração normal de c em t_0 : $\ddot{c}_N(t_0)$

$$\begin{aligned}\ddot{c}(t_0) &= x_T(t_0)T(t_0) + x_N(t_0)N(t_0) \\ \ddot{c}_T(t_0) &= \frac{\langle \ddot{c}(t_0), T(t_0) \rangle}{\|T(t_0)\|^2} T(t_0) = x_T(t_0)T(t_0) \\ \ddot{c}_N(t_0) &= \frac{\langle \ddot{c}(t_0), N(t_0) \rangle}{\|N(t_0)\|^2} N(t_0) = x_N(t_0)N(t_0)\end{aligned}$$

Item b

Vamos olhar para a velocidade e aceleração de c_1 , aplicando regra da cadeia e derivando em relação a s

$$\begin{cases} \frac{d}{ds}c_1(s) = \frac{d}{ds}c(\alpha(s)) = \frac{d}{ds}c(\alpha(s))\frac{d}{ds}\alpha(s) \\ \frac{d^2}{ds^2}c_1(s) = \frac{d^2}{ds^2}c(\alpha(s)) = \frac{d^2}{ds^2}c(\alpha(s))\frac{d}{ds}\alpha^2(s) + \frac{d}{ds}c(\alpha(s))\frac{d^2}{ds^2}\alpha(s) \end{cases}$$

Como $\alpha(s_0) = t_0$, podemos reescrever:

$$\begin{cases} \frac{d}{ds}c_1(s_0) = \dot{c}(t_0)\frac{d}{ds}\alpha(s_0) \\ \frac{d^2}{ds^2}c_1(s_0) = \ddot{c}(t_0)\frac{d}{ds}\alpha^2(s_0) + \dot{c}(t_0)\frac{d^2}{ds^2}\alpha(s_0) \end{cases}$$

Mas $\frac{d}{ds}\alpha(s_0)$ e $\frac{d^2}{ds^2}\alpha(s_0)$ são escalares, podemos então encontrar a aceleração normal para $c_1(s_0)$

$$\begin{aligned}c''_{1N}(s_0) &= \frac{\langle \alpha'^2(s_0)\ddot{c}(t_0) + \alpha''(s_0)\dot{c}(t_0), N(t_0) \rangle}{\|N(t_0)\|^2} N(t_0) \\ &= \frac{\langle \alpha'^2(s_0)\ddot{c}(t_0), N(t_0) \rangle + \langle \alpha''(s_0)\dot{c}(t_0), N(t_0) \rangle}{\|N(t_0)\|^2} N(t_0) \quad \xrightarrow{0, \text{pelo Lema 2}} \\ &= \alpha'^2(s_0) \frac{\langle \ddot{c}(t_0), N(t_0) \rangle}{\|N(t_0)\|^2} N(t_0) \\ &= \alpha'^2(s_0) \ddot{c}_N(t_0)\end{aligned}$$

E a norma da aceleração normal

$$\|c''_{1N}(s_0)\| = |\alpha'^2(s_0)| \cdot \|\ddot{c}_N(t_0)\|$$

E Vamos calcular o módulo da velocidade de $c_1(s_0)$

$$\|c'_1(s_0)\| = |\alpha'(s_0)| \cdot \|\dot{c}_N(t_0)\|$$

Podemos agora comparar a razão entre norma da aceleração normal e norma da velocidade para c_1 e c

$$\frac{\|\ddot{c}_N(t_0)\|}{\|\dot{c}(t_0)\|^2} = \frac{\|c''_{1N}(s_0)\|}{\|c'_1(s_0)\|^2}$$

$$\frac{\|\ddot{c}_N(t_0)\|}{\|\dot{c}(t_0)\|^2} = \frac{\cancel{|\alpha'^2(s_0)|} \cdot \|\ddot{c}_N(t_0)\|}{\cancel{|\alpha'(s_0)|^2} \cdot \|\dot{c}(t_0)\|^2}$$

$$\frac{\|\ddot{c}_N(t_0)\|}{\|\dot{c}(t_0)\|^2} = \frac{\|\ddot{c}_N(t_0)\|}{\|\dot{c}(t_0)\|^2}$$