

## תשובה 1

א. תנאי התחלה:

$$a_0 = 1 \quad (\text{סדרה ריקה! נוח להיעזר ב-} a_0 \text{ לסעיף ב})$$

$$a_1 = 1 \quad (\text{רק בלוק } 2 \times 1 \text{ עומד אפשרי})$$

$$a_2 = 3 \quad \text{בלוק של } 2 \times 2, \text{ או שני בלוקים } 2 \times 1 \text{ עומדים, או שני בלוקים } 2 \times 1 \text{ שוכבים}).$$

יחס נסיגה: נתבונן בריצוף באורך  $n + 1$ .

\* אם הוא מסתיים בבלוק  $2 \times 1$  עומד, אז לפני הבלוק הזה יכול לבוא כל ריצוף באורך  $n$ , כלומר  $a_n$  ריצופים אפשריים.

\* אם הוא מסתיים בבלוק של  $2 \times 2$ , אז לפני הבלוק הזה יכול לבוא כל ריצוף באורך  $n - 1$ , כלומר  $a_{n-1}$  ריצופים אפשריים.

\* אם הוא מסתיים בבלוק  $2 \times 1$  שוכב, אז בהכרח מדובר בשני בלוקים  $2 \times 1$  שוכבים זה מעל זה. לפניהם יכול לבוא כל ריצוף באורך  $n - 1$ , כלומר  $a_{n-1}$  ריצופים אפשריים.

$$\text{בסה"כ קיבלנו: } a_{n+1} = a_n + 2a_{n-1}$$

$$\text{נבדוק שזה תואם את תנאי ההתחלה שרשמנו: } a_2 = a_1 + 2a_0 = 1 + 2 \cdot 1 = 3.$$

$$\text{ב. המשוואה האפיינית: } \lambda^2 - \lambda - 2 = 0.$$

$$\text{פתרונותיה הם: } \lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2}. \quad \text{כלומר } 2, -1.$$

$$\text{לפיכך } a_n = A \cdot 2^n + B \cdot (-1)^n$$

בהצבת תנאי ההתחלה  $a_1, a_0$  נקבל:

$$2A - B = 1, \quad A + B = 1$$

$$\text{מחיבור שתי משוואות אלה } 3A = 2, \text{ כלומר } A = 2/3. \text{ מכאן } B = 1/3.$$

$$a_n = \frac{2}{3} \cdot 2^n + \frac{1}{3}(-1)^n = \frac{1}{3}(2^{n+1} + (-1)^n)$$

$$\text{ג. מיחס הנסיגה: } a_3 = a_2 + 2a_1 = 5, \quad a_4 = a_3 + 2a_2 = 11.$$

$$a_4 = \frac{1}{3}(2^5 + (-1)^4) = 11 \quad \text{מהנוסחה המפורשת:}$$

## תשובה 2

כמו בפתרון שאלה 4 בממ"ן 15, נניח שהמשתנים הזוגיים הם 3 הראשונים, ונכפול את התוצאה שנקבל ב-  $\binom{6}{3} = 20$ .

מספר פתרונות המשוואה  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 29$  תחת האילוצים הנתונים בשאלה הוא המקדם של  $x^{29}$  בפיתוח הפונקציה  $f(x) = (x^2 + x^4 + x^6 + \dots)^3 (x^3 + x^5 + x^7 + \dots)^3$ .  
 בסוגריים השמאליים נוציא גורם משותף  $x^2$ , שלאחר העלאה בחזקת 3 נותן  $x^6$ .  
 בסוגריים הימניים נוציא גורם משותף  $x^3$ , שלאחר העלאה בחזקת 3 נותן  $x^9$ .  
 קיבלנו

$$f(x) = x^6(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots)^3 \cdot x^9(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots)^3 \\ = x^{15}(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots)^6$$

המקדם של  $x^{29}$  בפונקציה זו הוא המקדם של  $x^{14}$  בפונקציה  $(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots)^6$ .  
 בהצבת  $y = x^2$ , זהו המקדם של  $y^7$  בפונקציה  $(1 + y + y^2 + y^3 + \dots)^6$ .  
 לפי נוסחה (iii) שבסוף הממ"ן, המקדם הזה הוא  $D(6, 7) = \binom{12}{5} = 792$ .  
 כאמור בתחילת הפתרון, את זה עלינו לכפול ב- 20. תשובה סופית:  $792 \cdot 20 = 15,840$ .

## תשובה 3

א. לפי הדיון בעמ' 124 - 127 בספר, הפונקציה היוצרת היא  
 $f(x) = (1 + x + x^2 + x^3)^2(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots)^2$   
 $a_n$  הוא המקדם של  $x^n$  בפיתוח פונקציה זו.

ב. מסעיף א', בעזרת סכום טור הנדסי סופי וסכום טור הנדסי אינסופי נקבל:

$$f(x) = \left(\frac{1-x^4}{1-x}\right)^2 \left(\frac{1}{1-x}\right)^2 = (1-x^4)^2 \frac{1}{(1-x)^4} = (1-2x^4+x^8) \frac{1}{(1-x)^4}$$

לפי נוסחה (iii) שהופיעה בממ"ן (עמ' 11),  
 $\frac{1}{(1-x)^4} = \sum_{i=0}^{\infty} D(4, i) x^i$

מכאן ע"י קיבוץ איברים הנותנים מעלה  $n$  (נוסחה (ii) בממ"ן. השווה גם השאלה הקודמת),  
 המקדם של  $x^n$  ב-  $f(x)$  הוא

$$a_n = D(4, n) - 2D(4, n-4) + D(4, n-8) = \binom{n+3}{3} - 2\binom{n-1}{3} + \binom{n-5}{3}$$

אם  $n < 5$  הביטוי הימני ביותר באגף ימין הוא 0 (מקדמים בינומיים חריגים - ר' עמ' 30) .

בדומה, אם  $n - 1 < 3$  הביטוי האמצעי באגף ימין מתאפס.

נקבל כך את המקרים  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 4$ ,  $a_2 = 10$ , שלא קשה לודא את נכונותם מתנאי השאלה, אך הם אינם מהווים בדיקה טובה לביטוי בשלמותו. מצד שני, אם נניח  $n \geq 5$  ונפתח את הביטוי, לאחר פיתוח וקיבוץ איברים מתקבל הביטוי הפשוט:  $a_n = 16n - 32$  ( $n \geq 5$ ) (תרגיל מומלץ - לחשב זאת). האם מישהו רואה דרך קצרה להגיע ישר לתוצאה זו?

## תשובה 4

א. המקדם של  $x^{2m}$  בפיתוח  $(1+x)^n$  הוא, לפי נוסחת הבינום,  $c_{2m} = \binom{n}{2m}$ . את אגף שמאל של הזהות הנתונה בשאלה נראה כמכפלה של שני גורמים:  $(1-x^2)^n \cdot \frac{1}{(1-x)^n}$ . יהי  $b_i$  המקדם של  $x^i$  בפיתוח  $\frac{1}{(1-x)^n}$ . מנוסחה (iii) בממ"ן,  $b_i = D(n, i)$ . נפתח גם:  $(1-x^2)^n = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \binom{n}{i} (x^2)^i = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \binom{n}{i} x^{2i}$ . נסמן ב-  $a_i$  את המקדם של  $x^i$  בביטוי זה.

מכיוון שמופיעות רק חזקות זוגיות של  $x$ , כל המקדמים בעלי אינדקס אי-זוגי מתאפסים:

$$a_{2i+1} = 0 \quad \text{לכל } i \text{ טבעי.} \quad \text{אנו רואים גם ש-} \quad a_{2i} = (-1)^i \binom{n}{i}$$

שימו לב שזהו  $a_{2i}$  ולא  $a_i$ , למרות שבמקדם הבינומי ובחזקה של  $(-1)$  מופיע  $i$  ולא  $2i$ . כעת ניעזר בנוסחה (ii) שבסוף הממ"ן למציאת המקדמים בכפל פונקציות יוצרות:

$$c_{2m} = \sum_{i=0}^{2m} a_i b_{2m-i}$$

נזכור שעבור ה-  $a$  יש לנו רק מקדמים  $a_{2i}$  ולא  $a_{2i+1}$ , ונוכל לרשום עבור המקרה שלנו:

$$c_{2m} = \sum_{i=0}^m a_{2i} b_{2m-2i}$$

שימו לב לשינוי גבול הסכימה כאן והבינו מדוע הוא נדרש. נציב בשוויון זה את הביטויים שקיבלנו עבור המקדמים:

$$\binom{n}{2m} = \sum_{i=0}^m (-1)^i \binom{n}{i} D(n, 2m-2i)$$

זו הזהות המבוקשת (נקרא למשתנה הסכימה  $k$  במקום  $i$  כדי להתאים לנדרש בשאלה).

**בדיקה:** כאשר  $n = 5, m = 2$ , אגף שמאל הוא  $\binom{5}{4} = 5$ , ואגף ימין הוא

$$\binom{5}{0} D(5,4) - \binom{5}{1} D(5,2) + \binom{5}{2} D(5,0) = \binom{8}{4} - 5 \cdot \binom{6}{2} + 10 \cdot 1 = 70 - 75 + 10 = 5$$

$$. D(j,0) = \binom{j+0-1}{j-1} = \binom{j-1}{j-1} = 1 \quad \text{שימו לב ש-}$$

את הבדיקה השניה אנא השלימו בעצמכם.

איתי הראבן