

פתרון שאלה 4 בממ"ן 11 – 2012

קודם כל, נשים לב לעובדות הבאות:

$$f_1 = n^{\lg \lg \lg n}, \text{ לכן, } \lg(f_1) = \lg n \cdot \lg \lg \lg n; f_1 = (\lg \lg n)^{\lg n}$$

$$; f_3 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2}$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} > \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{i+1} =$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} - \sum_{i=2}^{n+1} \frac{1}{i} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} < 1 + \sum_{i=2}^n \frac{1}{i(i-1)} = 1 + \sum_{i=2}^n \left(\frac{1}{i-1} - \frac{1}{i} \right) = 1 + \sum_{i=2}^n \frac{1}{i-1} - \sum_{i=2}^n \frac{1}{i} =$$

$$1 + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} - \sum_{i=2}^n \frac{1}{i} = 2 - \frac{1}{n} = \frac{2n-1}{n}$$

$$f_3 = \Theta(1), \text{ לכן,}$$

$$f_5 = \Theta(n \lg n) = \Theta(f_6), \text{ לכן, } f_5 = \lg(n^n + n!) = n \cdot \lg n + \lg(n!)$$

$$f_7 = \lg \lg n, \text{ לכן, } \lg(f_7) = \lg \lg \lg n; f_7 = n^{\frac{\lg \lg \lg n}{\lg n}}$$

$$f_{10} = \Theta(n^2)$$

הגענו לסידור החלקי

$$f_9 = O(f_3); f_3 = O(f_7); f_7 = O(f_5); f_5 = \Theta(f_6); f_6 = O(f_{10}); f_{10} = O(f_1)$$

בהמשך, רואים כי:

$$\lg(f_1) = \lg n \cdot \lg \lg \lg n$$

$$\lg(f_2) = \frac{1}{\lg n} \cdot \Theta(n \cdot \lg n) = \Theta(n)$$

$$\lg(f_4) = \sqrt{n}$$

$$\lg(f_8) = n\sqrt{3} = \Theta(n)$$

לפי הנוסחה (3.17) בספר הלימוד (הקירוב של סטירלינג),

$$\lg(f_2) = \frac{1}{\lg n} \cdot \lg(n!) = \frac{1}{\lg n} \cdot (n \lg n - n \lg e + \Theta(\lg n)) = n - \frac{n}{\lg n} + \Theta(1),$$

$$f_2 = o(f_8), \text{ ולכן, } \lg(f_2) < \lg(f_8)$$

הגענו להשלמת הסידור

$$f_1 = O(f_4); f_4 = O(f_2); f_2 = O(f_8)$$