

שאלה 1 (25 נקודות)

(5 נק') א. הוכיחו שאם A ו- B הם מאורעות בלתי תלויים זה בזה, אזי \bar{A} ו- \bar{B} יהיו מאורעות בלתי

תלויים זה בזה (\bar{A} ו- \bar{B} מייצגים את המאורעות המשלימים ל- A ו- B בהתאמה)

(12 נק') ב. יהיו X ו- Y משתנים מקריים פואסוניים בלתי-תלויים עם הפרמטרים λ_X ו- λ_Y , בהתאמה.

הוכיחו שלמשתנה המקרי המותנה X בהינתן $X+Y=n$ יש התפלגות בינומית עם הפרמטרים

$$n \text{ ו- } \frac{\lambda_X}{\lambda_X + \lambda_Y}.$$

(8 נק') ג. הראו שאם משתנה מקרי מתפלגת מעריכית עם פרמטר λ , אז פונקצית היווצרת מומנטים שלו

$$\text{היא } M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t} \text{ כאשר } t < \lambda.$$

פתרון :

א. נתון ש A ו- B בלתי-תלויים, ולכן מתקיים ש: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. כדי להוכיח ש \bar{A} ו-

\bar{B} מאורעות בלתי תלויים זה בזה, נראה שמתקיים: $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B})$.

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) \stackrel{1}{=} 1 - P(A \cup B) \stackrel{2}{=} 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)] =$$

$$\stackrel{3}{=} 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \stackrel{4}{=} 1 - P(A) - P(B)(1 - P(A))$$

$$= (1 - P(A))(1 - P(B)) \stackrel{5}{=} P(\bar{A})P(\bar{B})$$

נימוקים:

- 1 הסתברות למאורע משלים.
- 2 כלל ההכלה וההפרדה.
- 3 תנאי האי תלות בין A ו- B .
- 4 פירוק לגורמים.
- 5 הסתברות למאורע משלים.

- ב. הערכים האפשריים של שני המשתנים הפואסוניים הם כל השלמים האי-שליליים.
 לכן, בהינתן ש- $X + Y = n$, הערכים האפשריים של X הם כל השלמים בין 0 ל- n .
 לפיכך, לכל $i = 0, 1, \dots, n$, מתקיים:

$$\begin{aligned} P\{X = i \mid X + Y = n\} &= \frac{P\{X = i, X + Y = n\}}{P\{X + Y = n\}} \quad [\text{הערכים האפשריים של } X \text{ ו- } Y \text{ שלמים אי-שליליים}] \\ &= \frac{P\{X = i, Y = n - i\}}{P\{X + Y = n\}} = \frac{P\{X = i\}P\{Y = n - i\}}{P\{X + Y = n\}} \quad [X \text{ ו- } Y \text{ בלתי-תלויים}] \\ &= \frac{\cancel{e^{-\lambda_X}} \cdot \frac{\lambda_X^i}{i!} \cdot \cancel{e^{-\lambda_Y}} \cdot \frac{\lambda_Y^{n-i}}{(n-i)!}}{\cancel{e^{-(\lambda_X + \lambda_Y)}} \cdot \frac{(\lambda_X + \lambda_Y)^n}{n!}} \quad [X + Y \text{ מתפלג פואסוני עם } \lambda_X + \lambda_Y] \\ &= \binom{n}{i} \cdot \left(\frac{\lambda_X}{\lambda_X + \lambda_Y} \right)^i \cdot \left(\frac{\lambda_Y}{\lambda_X + \lambda_Y} \right)^{n-i}, \quad i = 0, 1, \dots, n \end{aligned}$$

קיבלנו של- X בהינתן $X + Y = n$ יש פונקציית הסתברות בינומית עם הפרמטרים n ו- $\frac{\lambda_X}{\lambda_X + \lambda_Y}$.
 , ולכן זוהי התפלגותו.

- ג. נבנה את פונקציית יוצרת המומנטים של ההתפלגות המעריכית:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E[e^{tX}] = \int_0^\infty e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^\infty e^{-(\lambda-t)x} dx = \frac{-\lambda e^{-(\lambda-t)x}}{\lambda - t} \Big|_0^\infty \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\lambda e^{-(\lambda-t)x}}{\lambda - t} - \frac{-\lambda e^{-(\lambda-t)0}}{\lambda - t} &= \frac{\lambda}{\lambda - t} \end{aligned}$$

נימוקים:

- 1- לפי הגדרה של פונקציה יוצרת מומנטים.
- 2- לפי תכונות התוחלת של משתנה מקרי רציף.
- 3- כדי שהגבול יתכנס נדרוש $t < \lambda$.

שאלה 2 (25 נקודות)

לאונרד משחק בכל יום במשחק מחשב. יהי X -משך הזמן (בדקות) שהוא מקדיש מדי יום למשחק. X מתפלג לפי פונקציית הצפיפות הבאה:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & x < b \\ a & b \leq x < b+2 \\ 2a & b+2 \leq x < b+3 \\ a & b+3 \leq x < b+5 \\ c & b+5 \leq x \end{cases}$$

כמו כן ידוע ש: $E[X] = 12.5$.


א. (8 נק') חשבו את ערכי הפרמטרים a, b, c .

ב. (7 נק') חשבו את $Var(X)$.

ג. (10 נק') לאונרד החליט שהוא סופר את מספר הימים שעוברים החל מהיום ועד היום בו הוא ישחק יותר מ-13 דקות (היום בו הוא משחק יותר מ-13 דקות לא נספר). משך הזמן שלאונרד מקדיש למשחק בימים שונים בלתי-תלויים. נגדיר את W להיות מספר הימים שיספרו על ידי לאונרד. מצאו את התוחלת והשונות של W .

פתרון:

א. כיוון שסך השטח מתחת לפונקציית הצפיפות שווה ל-1 נקבל ש $c = 0$.
נצייר את פונקציית הצפיפות:



סך השטח מתחת לפונקציית הצפיפות שווה ל-1 ולכן נקבל $2a + 2a + 2a = 1$ כלומר $a = \frac{1}{6}$.

כיוון שפונקציית הצפיפות סימטרית, התוחלת מתקבלת בציר הסימטריה ולכן

$$E[X] = \frac{b+b+5}{2} = b + 2.5 \text{ ומהנתון } E[X] = 12.5 \text{ ניתן להסיק ש } b = 10.$$

ב.

$$E[X^2] = \int_{x=10}^{12} \frac{1}{6} x^2 dx + \int_{x=12}^{13} \frac{1}{3} x^2 dx + \int_{x=13}^{15} \frac{1}{6} x^2 dx = \left[\frac{1}{6} \cdot \frac{x^3}{3} \right]_{10}^{12} + \left[\frac{1}{3} \cdot \frac{x^3}{3} \right]_{12}^{13} + \left[\frac{1}{6} \cdot \frac{x^3}{3} \right]_{13}^{15} = 158$$

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 158 - 12.5^2 = \boxed{1.75}$$

ג. ההסתברות שהמשחק נמשך יותר מ-13 דקות היא השטח של המלבן הימני הקטן שבשרטוט שבסיסו

$$2 \text{ וגובהו } \frac{1}{6} \text{ ולכן, } P(X > 13) = 2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

נסמן ב- R את מספר הימים שיספרו כולל היום שבו המשחק נמשך יותר מ-13 דקות.

$$\text{מתקיים ש- } R \sim G\left(\frac{1}{3}\right) \text{ ולכן } E[R] = \frac{1}{1/3} = 3 \text{ ו- } Var(R) = \frac{2/3}{(1/3)^2} = 6. \text{ כיוון שהמשתנה } W$$

מוגדר ללא היום שבו המשחק נמשך יותר מ-13 דקות מתקיים ש: $W = R - 1$. נשתמש בתכונות

$$\text{התוחלת והשונות ונקבל: } E[W] = E[R - 1] = E[R] - 1 = 3 - 1 = \boxed{2}$$

$$Var(W) = Var(R - 1) = Var(R) = \boxed{6}$$

שאלה 3 (25 נקודות)

16נק') א. יהיו X_1, X_2, \dots, X_{10} משתנים מקריים בלתי-תלויים, שלכולם התפלגות אחידה בדידה בין 0 ל-10. (כלומר, כל אחד מן המשתנים מקבל את הערכים 0, 1, ..., 10 בהסתברויות שוות).

$$(1) \text{ חשב את } P\left\{\min_{i=1,\dots,10} X_i \leq 2\right\}.$$

(2) מה ההסתברות שמבין 10 ה- X_i יהיו בדיוק 5 שיקבלו ערך שאינו עולה על 4 ובדיוק 3 שיקבלו ערך בין 5 ל-8 (כולל 5 וכולל 8)?

9נק') ב. יהיו X_1, X_2, \dots, X_n משתנים מקריים בלתי-תלויים, שלכל אחד מהם תוחלת סופית μ ושונות

$$\sigma^2. \text{ הניחו ש-} \mu \text{ גדול. חשבו קירוב ל- } P\left\{\bar{X} \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} + \mu\right\}.$$

פתרון:

א. לכל $i = 1, \dots, 10$, הערכים האפשריים של X_i הם 0, 1, ..., 10 וכל אחד מהם מתקבל בהסתברות $\frac{1}{11}$.

$$1. \quad P\left\{\min_{i=1,\dots,10} X_i \leq 2\right\} = 1 - P\left\{\min_{i=1,\dots,10} X_i > 2\right\} = 1 - P\{X_1 > 2, X_2 > 2, \dots, X_{10} > 2\}$$

כיוון שהמשתנים הם בלתי תלויים זה בזה מתקיים ש :

$$1 - P\{X_1 > 2, X_2 > 2, \dots, X_{10} > 2\} = 1 - P\{X_1 > 2\} \cdot P\{X_2 > 2\} \cdot \dots \cdot P\{X_{10} > 2\}$$

כיוון שהמשתנים כולם מתפלגים אחיד בין 0 ל-10, מתקיים ש :

$$P\{X_i > 2\} = \frac{8}{11} \quad \forall i = 1, 2, \dots, 10 \text{ ולכן :}$$

$$1 - P\{X_1 > 2\} \cdot P\{X_2 > 2\} \cdot \dots \cdot P\{X_{10} > 2\} = 1 - \left(\frac{8}{11}\right)^{10} = \boxed{0.9586}$$

2. נשתמש בפונקציית ההסתברות המולטינומית, כדי לקבל את ההסתברות המבוקשת :

$$\frac{10!}{5!3!2!} \cdot \left(\frac{5}{11}\right)^5 \cdot \left(\frac{4}{11}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{11}\right)^2 = \boxed{0.0777}$$

ב. נעזר במשפט הגבול המרכזי :

$$P\left\{\bar{X} \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} + \mu\right\} = P\left\{\bar{X} - \mu \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq 2\right\} \cong P\{Z \leq 2\} = \Phi(2) = \boxed{0.9772}$$

שאלה 4 (25 נקודות)

מיכל מסדרת על השולחן בסדר אקראי שורה של 12 כוסות משקה: 2 כוסות שמפנייה, 4 כוסות של יין לבן ו-6 כוסות של יין אדום.

(12 נק') א. נסמן ב- U את מספר הכוסות של יין אדום במקומות 1,2,3. וב- W את מספר הכוסות של יין אדום במקומות 4,7,11.

(1) חשבו את $E[U - W]$.

(2) חשבו את $Var(U + W)$.

(3) חשבו את $Cov(U, W)$.

(5 נק') ב. מצאו את התפלגות מספר הכוסות שנמצאות בין 2 כוסות השמפנייה.

(8 נק') ג. מיכל בוחרת כוס אקראית ושונה אותה. אם הכוס היא כוס שמפנייה היא מספרת 4 בדיחות לחבריה כך שלכל בדיחה יש סיכוי של 0.5 להצחיק את החברים ללא תלות בבדיחה אחרת. אם היא שונה כוס יין היא מספרת 8 בדיחות לחבריה כך שלכל בדיחה יש סיכוי של 0.3 להצחיק את החברים ללא תלות בבדיחה אחרת. מה ההסתברות שבדיוק 4 בדיחות של מיכל יצחיקו את חבריה?

פתרון:

א.

1. לפי הנתונים מתקבל שלשני המשתנים יש אותה התפלגות. עבור שניהם מתקבל $U, W \sim HG(12, 6, 3)$. מכאן ש: $E[U] = E[W]$ ולפי הלינאריות של התוחלת

$$E[U - W] = E[U] - E[W] = \boxed{0}$$

2. המשתנה $U + W$ סופר את מספר כוסות היין האדום בששת המקומות 1,2,3,4,7,11 ולכן $U + W \sim HG(12, 6, 6)$. לפי נוסחת השונות של ההתפלגות ההיפר-גאומטרית:

$$Var(U + W) = 6 \cdot \frac{6}{12} \left(1 - \frac{6}{12} \right) \cdot \frac{12-6}{12-1} = \boxed{\frac{9}{11}}$$

3. לפי נוסחת השונות של ההתפלגות ההיפר-גאומטרית נקבל ש:

$$Var(U) = Var(W) = 3 \cdot \frac{6}{12} \left(1 - \frac{6}{12} \right) \cdot \frac{12-3}{12-1} = \frac{27}{44}$$

$$Var(U + W) = Var(U) + Var(W) + 2COV(U, W) \quad \text{כיוון ש:}$$

נקבל ש:

$$COV(U, W) = 0.5 [Var(U + W) - Var(U) - Var(W)] = 0.5 \left[\frac{9}{11} - \frac{27}{44} - \frac{27}{44} \right] = \boxed{-\frac{9}{44}}$$

ב. נבחר את 2 המקומות של כוסות השמפנייה מתוך השורה. ולכן גודל מרחב המדגם: $|\Omega| = \binom{12}{2} = 66$

הערכים האפשריים של המשתנה המקרי הם: $0, 1, \dots, 10$.

ופונקציית ההסתברות המתקבלת היא: $P(X = k) = \frac{11-k}{66}$

ג. נסמן:

A - המאורע 'מיכל תשתה כוס שמפנייה'.

X מספר הבדיחות שיצחיקו את החברים.

$$X | A \sim B(4, 0.5) \quad X | \bar{A} \sim B(8, 0.3)$$

$$P(A) = \frac{2}{12}$$

ולכן:

$$P(X = 4 | A) = 0.5^4 = 0.0625$$

$$P(X = 4 | \bar{A}) = \binom{8}{4} 0.3^4 (1-0.3)^4 = 0.1362$$

נציב בנוסחת ההסתברות השלמה ונקבל:

$$P(X = 4) = P(X = 4 | A)P(A) + P(X = 4 | \bar{A})P(\bar{A}) = \frac{2}{12} \cdot 0.0625 + \frac{10}{12} \cdot 0.1362 = \boxed{0.1239}$$

שאלה 5 (25 נקודות)

לערך יש 10 גיבורי-על חביבים, ולכן יש לו 20 בובות קטנות של גיבורי-העל – 2 בובות של כל גיבור-על. ערך מסדר את הבובות על 8 מדפים: ב-4 מדפים יש מקום ל-3 בובות וב-4 מדפים יש מקום ל-2 בובות. מדף נחשב מדף-על אם יש עליו 2 בובות של אותו גיבור על.

נסמן ב- X את מספר המדפים שהם מדפי-על מתוך 8 המדפים.

(5 נק') א. מה ההסתברות שמדף גדול (מדף שיש בו מקום ל-3 בובות) יהיה מדף-על?

(8 נק') ב. חשבו את $E[X]$.

(12 נק') ג. חשבו את $Var(X)$.

פתרון:

א. נתייחס רק למדף גדול אחד ונחשב את הסיכוי שיהיו בו 2 בובות של אותו גיבור על. מספר האפשרויות

לניסוי עצמו יהיה: $\binom{20}{3}$ ומתוכם נספור כמה אפשרויות יש למדף על. ראשית נבחר את גיבור העל:

לכך יש $\binom{10}{1}$ אפשרויות ואז נבחר בובה נוספת מאלה שנותרו: $\binom{18}{1}$. כך שנקבל:

$$\frac{\binom{10}{1}\binom{18}{1}}{\binom{20}{3}} = \frac{3}{19}$$

ב. נחשב את התוחלת של X על ידי פירוקו לאינדיקטורים. נגדיר משתנה אינדיקטור באופן הבא:

$$1 \leq i \leq 8 \quad X_i = \begin{cases} 1 & \text{shelf } i \text{ is a super shelf} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$X = \sum_{i=1}^8 X_i \quad \text{וכמו כן}$$

נשים לב שישנם 2 סוגים של מדפים.

נחליט שמדפים 1,2,3,4 הם מדפים של 2 בובות ומדפים 5,6,7,8 הם מדפים של 3 בובות.

עבור מדף של 2 בובות: ישנן $\binom{20}{2}$ אפשרויות לבחור את 2 הבובות, אבל יש $\binom{10}{1}$ אפשרויות לבחור

אותן מאותו גיבור-על. לכן:

$$i \in \{1, 2, 3, 4\} \quad E(X_i) = P(X_i = 1) = \frac{\binom{10}{1}}{\binom{20}{2}} = \frac{1}{19}$$

עבור מדף של 3 בובות : הסיכוי שהמדף יהיה מדף על חושב בסעיף א , ולכן :

$$i \in \{5, 6, 7, 8\} \quad E(X_i) = P(X_i = 1) = \frac{\binom{10}{1} \binom{18}{1}}{\binom{20}{3}} = \frac{3}{19}$$

נסכם ונקבל :

$$E[X] = 4 \cdot \frac{1}{19} + 4 \cdot \frac{3}{19} = \frac{16}{19}$$

ג. ראשית נחשב את שונות האנדיקטורים :

$$i \in \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{Var}(X_i) = \frac{1}{19} \left(1 - \frac{1}{19} \right) = \frac{18}{361}$$

$$i \in \{5, 6, 7, 8\} \quad \text{Var}(X_i) = \frac{3}{19} \left(1 - \frac{3}{19} \right) = \frac{48}{361}$$

בחישוב השונות המשותפות נפריד ל-3 מקרים.

• עבור $i \in \{1, 2, 3, 4\}, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ - זוגות של שונות משותפות, $i \neq j$.

ישנן $\binom{20}{2}$ אפשרויות לבחור בובות למדף i ואז $\binom{18}{2}$ אפשרויות לבחור בובות למדף j . כדי

ששני המדפים יהיו מדפי-על, יש 10 אפשרויות לבחור גיבור-על עבור מדף i וממנו 2 בובות, ו-9

אפשרויות לבחור גיבור-על עבור מדף j וממנו 2 בובות. נקבל :

$$P(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{10 \cdot 9}{\binom{20}{2} \binom{18}{2}} = \frac{1}{323}$$

$$\text{COV}(X_i, X_j) = \frac{1}{323} - \frac{1}{19} \cdot \frac{1}{19} = \frac{2}{6137}$$

- עבור $i \in \{1, 2, 3, 4\}, j \in \{5, 6, 7, 8\}$ - זוגות של שונות משותפות, $i \neq j$.

ישנן $\binom{20}{2}$ אפשרויות לבחור בובות למדף i ואז $\binom{18}{3}$ אפשרויות לבחור בובות למדף j . כדי

ששני המדפים יהיו מדפי-על, יש 10 אפשרויות לבחור גיבור-על עבור מדף i וממנו 2 בובות, 9 אפשרויות לבחור גיבור-על עבור מדף j וממנו 2 בובות, ו-16 אפשרויות לבחור בובה נוספת למדף j . נקבל:

$$P(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 16}{\binom{20}{2} \binom{18}{3}} = \frac{3}{323}$$

$$COV(X_i, X_j) = \frac{3}{323} - \frac{1}{19} \cdot \frac{3}{19} = \frac{6}{6137}$$

- עבור $i \in \{5, 6, 7, 8\}, j \in \{5, 6, 7, 8\}$ - זוגות של שונות משותפות, $i \neq j$.

ישנן $\binom{20}{3}$ אפשרויות לבחור בובות למדף i ואז $\binom{17}{3}$ אפשרויות לבחור בובות למדף j . כדי ששני

המדפים יהיו מדפי-על, יש 10 אפשרויות לבחור גיבור-על עבור מדף i וממנו 2 בובות, 9 אפשרויות לבחור גיבור-על עבור מדף j וממנו 2 בובות, 16 אפשרויות לבחור בובה נוספת למדף i ו-15 אפשרויות לבחור בובה נוספת למדף j . נקבל:

$$P(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 16 \cdot 15}{\binom{20}{3} \binom{17}{3}} = \frac{9}{323}$$

$$COV(X_i, X_j) = \frac{9}{323} - \frac{3}{19} \cdot \frac{3}{19} = \frac{18}{6137}$$

נסכם ונקבל:

$$\begin{aligned} Var(X) &= 4 \cdot \frac{18}{361} + 4 \cdot \frac{48}{361} + \\ &+ 2 \left(\binom{4}{2} \cdot \frac{2}{6137} + \binom{4}{2} \cdot \frac{18}{6137} + 4 \cdot 4 \cdot \frac{6}{6137} \right) = \boxed{\frac{4920}{6137}} \end{aligned}$$