

מטלת מנחה (ממ"ן) 12

הקורס: 20283 - מתמטיקה דיסקרטית

חומר הלימוד למטלה: תורת הקבוצות פרק 2

מספר השאלות: 4

משקל המטלה: 3 נקודות

סמסטר: 2006

מועד אחרון להגשה: יום ו' 21.4.06

אנא שים לב:

מלא בדיוקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה שלפני המטלות.
העתק את מספר הקורס ומספר המטלה הרשומים לעיל

"רלציה" בעברית: יחס.

שאלה 1 (20 נקודות)

א. תהי $S \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ מוגדרת כך: $S \leq \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x = 5, 3, y\}$.

מצאו קבוצות A, B כך ש- $S = A \times B$.

ב. תהי $D \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ מוגדרת כך: $D \leq \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x = y = 5\}$.

הוכיחו שלא קיימות קבוצות A, B כך ש- $D = A \times B$.

הדרכה לסעיף ב: נניח בשלילה שקיימות A, B כאלה... נסו להגיע לסתירה על ידי כך

שתקבלו מתוך הנחת השלילה איברים ב- D , שאינם נמצאים ב- D לפי הנתון.

שאלה 2 (24 נקודות)

תהי $A = \{1, 2, 3\}$, R, S הם יחסים מעל A , ומתקיים $R \subseteq S$.

הוכח או הפוך כל אחת מהטענות הבאות. כדי להפריך טענה - הבא דוגמא נגדית.

לטענות הנכונות - תן הוכחה מסודרת המסתמכת על טענות והגדרות בספר.

א. אם R רפלקסיבי אז S רפלקסיבי.

ב. אם S רפלקסיבי אז R רפלקסיבי.

ג. אם R סימטרי אז S סימטרי.

ד. אם S סימטרי אז R סימטרי.

ה. אם R אנטי-סימטרי אז S אנטי-סימטרי.

ו. אם S אנטי-סימטרי אז R אנטי-סימטרי.

שאלה 3 (24 נקודות)

לכל אחד מהיחסים הבאים ולכל אחת מהתכונות הבאות, בדוק אם היחס מקיים את התכונה. התכונות: רפלקסיביות, סימטריות, אנטי-סימטריות, טרנזיטיביות. בנוסף, אם היחס הוא יחס שקילות - ציין זאת. הוכח כל תשובה.

שים לב שיחס יכול להיות סימטרי ואנטי-סימטרי בעת ובעונה אחת, כך שאם הראית שיחס הוא סימטרי, זה לא מוכיח שהוא אינו אנטי-סימטרי.

היחסים:

- א. היחס R מעל $\mathbb{N} - \{0\}$ המוגדר כך: $(n, m) \in R$ אם n מתחלק ללא שארית ב- m .
- ב. הסגור הסימטרי של היחס R מהסעיף הקודם.
- ג. היחס S מעל קבוצת הממשים השונים מאפס, המוגדר כך: $(x, y) \in S$ אם $x \cdot y > 0$.

שאלה 4 (32 נקודות)

לכל $n \in \mathbb{N}$, יהי D_n היחס הבא מעל $P(\mathbb{N})$:

עבור $(X, Y) \in D_n$, $X, Y \in P(\mathbb{N})$, אם $|X \cap Y| \leq n$.

למשל עבור כל $3 \leq n$ מתקיים $(\{1, 2, 3\}, \{1, 8\}) \in D_n$, כי $\{1, 2, 3\} \cap \{1, 8\} = \{1\}$ היא קבוצה בת 3 איברים.

הגדרנו אפוא סדרה אינסופית של יחסים מעל $P(\mathbb{N})$.

בממ"ן 13 נוכיח באינדוקציה שעבור יחסים אלה, לכל $1 \leq n$, $D_1^n = D_n$.

בינתיים אתם מוזמנים להסתמך על כך ללא הוכחה, זה נחוץ לסעיף ג.

בנוסף, כדאי להסתמך במהלך הפתרון על שאלה מממ"ן 11, ועל משפט 2.16 בעמ' 56 בספר.

- א. (5 נק') הוכח: $D_0 = I_{P(\mathbb{N})}$ (יחס היחידה מעל $P(\mathbb{N})$).
- ב. (3 נק') הוכח: לכל $n \in \mathbb{N}$, $D_n \cap D_{n+1} = D_n$.
- ג. (8 נק') יהי D הסגור הטרנזיטיבי של D_1 . הוכח:
- $(X, Y) \in D$ אם $X \cap Y$ היא קבוצה סופית של טבעיים (ייתכן ריקה).

ד. (8 נק') הוכח ש- D הוא יחס שקילות.

ה. (8 נק') תן דוגמא לקבוצות X, Y של טבעיים, שאף אחת מהן אינה ריקה, אף אחת מהן אינה N , וכך ש- X, Y אינן באותה מחלקת שקילות לגבי יחס השקילות D .