Examen · Del Genoma Crudo a la Clínica (Nutrición Molecular)

100 puntos · 120 minutos

Nombre: _____ Código: _____ Fecha: _____

Examen individual en línea · 2 horas · 100 puntos.

No está permitido usar inteligencia artificial (ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, traductores con IA, extensiones o apps que generen respuestas), ni consultar a otras personas. Puedes usar calculadora y una tabla del código genético.

Las preguntas piden razonar con los datos de cada caso: una respuesta genérica, aunque suene correcta, no obtiene el puntaje.

Instrucciones

- Tiempo límite: **120 minutos** y **un solo intento**. Canvas envía el examen automáticamente al terminar el tiempo.
- **Uso de inteligencia artificial prohibido.** Cualquier respuesta generada o reescrita con IA, o copiada de otra persona, se anula y se reporta conforme al reglamento.
- Permitido: calculadora y tabla del código genético. No necesitas otras fuentes.
- Cálculos: escribe solo el número, con punto decimal y sin unidades.
- Selección múltiple: marca todas las correctas; se da crédito parcial y se descuentan las marcadas de más.
- Casos de respuesta extendida: escribe con tus palabras y usa los datos del caso; se califica el razonamiento, no la extensión.

Distribución sugerida del tiempo

Bloque	Minutos
Bloque 1 · Opción múltiple (10 reactivos, 30 pts)	20
Bloque 2 · Casos clínicos (7 reactivos, 30 pts)	40
Bloque 3 · Bioinformática y geles (6 reactivos, 20 pts)	25
Bloque 4 · Cálculo y troubleshooting (6 reactivos, 20 pts)	25
Revisión final	10

Declaración de integridad académica 0 pts

Declaro que resolveré este examen de forma individual, **sin usar herramientas de inteligencia artificial** ni ayuda de otras personas, y que las respuestas escritas son de mi autoría. Entiendo que incumplir esta declaración anula el examen.


A) Sí, lo declaro y acepto estas condiciones.

Bloque 1 · Fundamentos moleculares y ómicos (30 %)

10 reactivos de opción múltiple, 3 puntos cada uno. Elige la opción mejor justificada.

E1-1 · Lactasa y genotipo: leer los datos 3 pts

Un laboratorio midió la actividad de lactasa en biopsias intestinales de 36 adultos y los genotipificó para *MCM6* −13910 (alelo T = persistencia de lactasa).



¿Qué conclusión apoyan mejor los datos?

A) El genotipo explica toda la actividad de lactasa: ninguna persona se sale de su grupo.

B) La persona 36 demuestra que el alelo T no tiene relación con la actividad de lactasa.

C) C/T tiene exactamente la mitad de actividad que T/T, así que cada alelo aporta lo mismo.

D) Basta una copia del alelo T para mantener la actividad alta (C/T se parece a T/T), y la persona 36 sugiere que otra causa, como daño de la mucosa intestinal, puede bajar la actividad aunque el genotipo sea favorable.

E1-2 · ¿Cuál variante preocupa más? 3 pts

En el gen de una enzima metabólica se encuentran dos variantes en un paciente: (1) un missense que cambia un residuo de la superficie, poco conservado entre especies, Lys→Arg; (2) un cambio sinónimo en el último nucleótido de un exón, junto al sitio donador de splicing. ¿Cuál razonamiento es el más sólido?

A) Ninguna puede tener efecto porque ninguna es nonsense.


B) La 1 es más grave porque todo missense cambia la proteína y todo sinónimo es neutro.

C) Ambas son igual de graves porque las dos están en el mismo gen.

D) La 2 puede ser más dañina: aunque no cambia el aminoácido, puede alterar el reconocimiento del sitio de splicing y causar salto de exón; la 1 es un cambio conservador (ambos básicos) en un sitio poco conservado.

E1-3 · Copias de un gen: lo que el gel no muestra 3 pts

El gen de la amilasa salival (*AMY1*) puede estar repetido: hay personas con 2 copias y otras con más de 10. Un equipo amplificó un fragmento de *AMY1* por PCR de punto final en cuatro personas (P1–P4) y lo corrió en un gel (A). Con otro método, que sí cuenta cuántas copias tiene cada persona, obtuvo la relación del panel B.



¿Por qué las cuatro bandas del gel se ven iguales si P4 tiene siete veces más copias que P1?

A) Porque el gel debió correrse más tiempo para separar las copias.


B) Porque las copias extra de AMY1 no se amplifican por PCR.

C) Porque la PCR de punto final solo dice si el fragmento está y de qué tamaño es: tras muchos ciclos la reacción se satura, y la intensidad final de la banda ya no refleja cuántas copias había al inicio.

D) Porque P1 a P4 tienen en realidad el mismo número de copias; el panel B está mal.

E1-4 · Un alimento funcional y la respuesta de cada persona 3 pts

Una empresa de lácteos desarrolló un yogur con 3 g/día de β-glucano de avena y lo probó durante 4 semanas en 20 voluntarios con LDL limítrofe. La gráfica muestra el cambio de LDL de cada participante.



El área de mercadotecnia quiere poner en la etiqueta: «Reduce tu colesterol LDL 5.5 %». ¿Cuál es la lectura más rigurosa de los datos?

A) Las diferencias se deben a que cada persona recibió una dosis distinta de β-glucano.

B) El promedio esconde respuestas muy distintas: hay hiperrespondedores (bajan más de 12 %), respuestas pequeñas y algunos sin efecto; antes de prometer un número habría que confirmar con un estudio controlado (con placebo y más participantes) y comunicar el efecto como promedio.

C) La frase es correcta: todos los consumidores bajarán 5.5 %.

D) El yogur no funciona, porque cinco personas subieron su LDL.

E1-5 · Un AVI/AVI que percibe el amargo 3 pts

Contexto: el **PROP** (6-n-propiltiouracilo) es un compuesto amargo que se usa en pruebas de gusto: se coloca una tira de papel impregnada en la lengua y la persona califica qué tan amarga la percibe. Tiene el mismo grupo químico (N–C=S) que el PTC y que ciertos compuestos de las crucíferas (brócoli, col), y es detectado por el receptor *TAS2R38*. En promedio, las personas PAV/PAV lo perciben muy amargo y las AVI/AVI casi no lo perciben.

En una práctica, una estudiante con genotipo AVI/AVI califica la tira de PROP como «muy amarga», con un puntaje similar al de compañeros PAV/PAV. ¿Cuál interpretación es la más rigurosa?

A) Las personas AVI/AVI son en realidad las más sensibles al amargo.

B) TAS2R38 explica gran parte de la variación en la percepción del PROP, pero no toda: influyen otros receptores del amargo, el número de papilas gustativas en la lengua y cómo se hizo la prueba. Antes de dudar del genotipo, conviene repetir la prueba con una tira control (sin PROP).

C) El genotipado debe estar mal, porque AVI/AVI siempre es no catador.

D) La percepción del amargo no tiene relación con TAS2R38.

E1-6 · Tamiz neonatal: PKU sí, lactasa no 3 pts

¿Por qué se tamiza fenilcetonuria (*PAH*) en todos los recién nacidos, pero no se tamiza el genotipo de persistencia de lactasa?

A) Porque el genotipo de lactasa no se puede determinar con PCR.

B) Porque la PKU es más frecuente que la no persistencia de lactasa.

C) Porque PKU es una enfermedad de gran efecto con daño neurológico irreversible si no se trata desde las primeras semanas y con un tratamiento eficaz (restricción de fenilalanina); la no persistencia de lactasa es común, aparece después del destete y se maneja según síntomas.

D) Porque la lactasa no tiene base genética.

E1-7 · Del GWAS a la persona 3 pts

En un GWAS de 500 000 personas, cada alelo A de *FTO* rs9939609 se asocia con +0.35 kg/m² de IMC ($p = 10^{-80}$). Una persona AA pregunta si su IMC alto «es culpa del gen». ¿Qué respuesta es más correcta?

A) No: si el efecto es pequeño, la asociación es falsa.

B) El p indica que la asociación es real en la población, pero el efecto por persona es pequeño (≈ 0.7 kg/m² en AA frente a TT); su IMC depende sobre todo de muchos otros genes y del ambiente, y el genotipo no predice bien el IMC de un individuo.

C) Sí: con un p tan pequeño, el gen explica su IMC.

D) Sí: los AA siempre tienen IMC mayor que los TT.

E1-8 · MTHFR en un país que fortifica 3 pts

En una población con fortificación obligatoria de harinas con ácido fólico, la diferencia de homocisteína entre personas *MTHFR* TT y CC es mucho menor que en una población sin fortificación. ¿Qué explica mejor este hallazgo?

A) Es una interacción gen–ambiente: con folato abundante, la enzima termolábil TT recibe suficiente sustrato y se estabiliza, así que el efecto del genotipo se atenúa; con folato bajo, el efecto se hace evidente.


B) Las personas TT dejaron de absorber ácido fólico.

C) La homocisteína no depende del folato.

D) La fortificación cambió el genotipo de la población.

E1-9 · ALDH2: leer las curvas de acetaldehído 3 pts

Se midió el acetaldehído en sangre después de una bebida estándar en personas con los tres genotipos de *ALDH2* rs671. La enzima ALDH2 funciona como un complejo de cuatro subunidades (tetrámero).



Si cada copia normal del gen aportara la mitad de la actividad, el heterocigoto *1/*2 tendría solo un poco más de acetaldehído que *1/*1. ¿Qué indican los datos?

A) El heterocigoto está justo a la mitad entre *1/*1 y *2/*2, así que cada copia aporta lo mismo.


B) Los tres genotipos se comportan igual; las diferencias son ruido.

C) El acetaldehído se acumula porque los portadores de *2 absorben más alcohol.

D) El heterocigoto acumula unas seis veces más acetaldehído que *1/*1: la subunidad mutante «estropea» los complejos que forma con las subunidades normales, así que una sola copia de *2 basta para perder buena parte de la actividad.

E1-10 · Café a las cuatro de la tarde 3 pts

Dos estudiantes toman un café con 200 mg de cafeína a las 16:00. La gráfica muestra la cafeína en plasma según su genotipo *CYP1A2* rs762551.



¿Qué conclusión se apoya en la gráfica?

A) El C/C absorbe más cafeína, por eso su curva es más alta.

B) Ambos alcanzan el mismo máximo, pero el C/C elimina la cafeína más lento: a las 23:00 conserva más del doble que el A/A, lo que puede afectar su sueño; le convendría tomar el café más temprano o una dosis menor.

C) Las curvas son iguales; el genotipo no influye en la cafeína.

D) El A/A tarda más en eliminar la cafeína porque su curva baja primero.

Bloque 2 · Casos clínicos y diagnóstico nutrigenético (30 %)

4 casos de opción múltiple (3 pts c/u), 1 de selección múltiple (4 pts) y 2 casos de respuesta extendida (7 pts c/u).

E2-1 · «Es cultural, no genético» 3 pts

Un chef afirma que el rechazo al cilantro por su sabor «a jabón» es puramente cultural. En una cohorte, una variante cercana al receptor olfatorio *OR6A2* se asocia con esa percepción, pero explica solo una parte pequeña de la variación, y la percepción también cambia con la exposición repetida y con el machacado de las hojas. ¿Qué conclusión es la más equilibrada?

A) Es 100 % genético: quien tiene la variante nunca podrá tolerar el cilantro.

B) Es un rasgo multifactorial: hay un componente genético real (receptor que detecta aldehídos del cilantro) y componentes ambientales (exposición, preparación que modifica los aldehídos); ninguno lo explica solo.

C) El chef tiene razón: si el efecto genético es pequeño, no existe.

D) La variante cambia la composición química del cilantro.

E2-2 · Cafeína antes de competir 3 pts

Una ciclista toma 6 mg/kg de cafeína antes de cada prueba porque «todos los estudios muestran que mejora el rendimiento». Su genotipo *CYP1A2* rs762551 es C/C. En un ensayo con atletas, la cafeína mejoró el tiempo en A/A, tuvo poco efecto en A/C y lo empeoró en C/C. ¿Qué recomendación es la más defendible?

A) Explicar que el efecto ergogénico promedio puede no aplicarse a su genotipo; probar de forma controlada (con y sin cafeína, en orden aleatorio) dosis menores o ninguna, y vigilar efectos adversos y sueño.

B) Mantener la dosis: el promedio de la literatura es positivo.

C) Prohibirle la cafeína para siempre por riesgo cardiaco inmediato.

D) Duplicar la dosis para compensar el metabolismo lento.

E2-3 · C/C pero toma leche sin problema 3 pts

Una mujer mexicana de ascendencia indígena tiene genotipo *MCM6* −13910 C/C (no persistencia según el marcador europeo) y refiere tomar un vaso de leche al día sin síntomas. ¿Cuál explicación es la menos probable?

A) Puede tener hipolactasia y aun así tolerar una dosis moderada de lactosa, gracias a la adaptación de su microbiota colónica y a que la toma con alimentos.

B) Puede portar otra variante de persistencia no incluida en la prueba, porque −13910T es característica de poblaciones europeas.

C) El genotipo C/C le causa alergia a la leche que todavía no se ha manifestado.

D) Puede tener malabsorción sin intolerancia: la lactosa no se absorbe por completo, pero no le causa síntomas con esa dosis.

E2-4 · Rubor con ALDH2 «normal» 3 pts

Un paciente presenta rubor, palpitaciones y náuseas al beber una cerveza desde hace una semana. Su genotipo *ALDH2* rs671 es G/G (*1/*1). Hace 10 días inició un antibiótico para una infección dental. ¿Qué haces primero?

A) Indicar que beba más para generar tolerancia.

B) Revisar el fármaco: algunos medicamentos (p. ej., metronidazol) producen una reacción tipo disulfiram que inhibe el metabolismo del acetaldehído; un genotipo normal no excluye causas adquiridas.

C) Concluir que desarrolló una mutación nueva en ALDH2.

D) Repetir el genotipado, porque debe ser ALDH2*2.

E2-5 · Evaluar un reporte comercial 4 pts

Un reporte nutrigenético de venta directa al consumidor afirma lo siguiente. Selecciona las afirmaciones que **están respaldadas** por la evidencia vista en el curso.

Marca todas las correctas.

A) «Por su genotipo MTHFR TT, debe evitar todo alimento con ácido fólico.»

B) «Por su genotipo APOE ε4, su LDL tiende a responder más a la grasa saturada y al colesterol dietario.»

C) «Por su genotipo TAS2R38 PAV/PAV, es probable que perciba más amargas las crucíferas.»

D) «Por su genotipo FTO AA, ninguna dieta le funcionará para perder peso.»

E) «Por su genotipo ALDH2*1/*2, el alcohol le genera más acetaldehído en sangre y saliva, y beber se asocia con mayor riesgo de cáncer de esófago.»

E2-6 · Caso: intolerancia de inicio reciente 7 pts

Hombre de 31 años que siempre tomó leche sin molestias. Hace 6 semanas tuvo una gastroenteritis por rotavirus; desde entonces presenta distensión y diarrea con cualquier lácteo. Resultados:

Estudio	Resultado
Genotipo *MCM6* −13910	T/T
Prueba de H_2 espirado (25 g de lactosa)	Aumento de 46 ppm (positiva ≥ 20), con síntomas
Anticuerpos para enfermedad celíaca	Negativos
Coprocultivo actual	Negativo

a) ¿Cómo es posible que un T/T tenga malabsorción e intolerancia? Distingue hipolactasia primaria y secundaria. b) Explica qué dice y qué no dice su genotipo sobre la expresión de LCT. c) ¿Qué pronóstico esperas y por qué? d) Propón un manejo nutricional temporal y un criterio para reintroducir lácteos. e) ¿Qué error cometería alguien que interpretara solo el genotipo?

E2-7 · Caso: un hallazgo que no se buscó 7 pts

Mujer de 38 años, ascendencia coreana, IMC 29, LDL 171 mg/dL. Quiere un plan de alimentación «según sus genes». Su reporte:

Gen (variante)	Genotipo
APOE	ε4/ε4
ALDH2 rs671	*1/*2
CYP1A2 rs762551	C/C
TAS2R38	PAV/PAV
FTO rs9939609	A/A

a) Propón tres recomendaciones nutricionales prioritarias y justifícalas con un mecanismo. b) El genotipo APOE ε4/ε4 también se asocia con un riesgo mucho mayor de enfermedad de Alzheimer, y ella no pidió esa información. ¿Qué dilema ético plantea y cómo lo manejarías? c) Su gusto por las verduras es bajo: ¿cómo usarías el resultado de TAS2R38 sin convertirlo en una excusa? d) Señala dos limitaciones de basar el plan solo en este reporte.

Bloque 3 · Bioinformática, PCR *in silico* e interpretación de geles (20 %)

6 reactivos. Ten a mano la tabla del código genético.

E3-1 · Leer la variante de ALDH2 3 pts

Fragmento **ilustrativo** de la secuencia codificante de *ALDH2*, en marco de lectura, con el codón 504 entre corchetes:

Alelo *1: `5´-… GCA [GAA] TAC …-3´`

Alelo *2: `5´-… GCA [AAA] TAC …-3´`

¿Qué cambio ocurre y qué consecuencia funcional es coherente con lo que sabes de ALDH2*2?

A) G→A en la primera posición; Glu→Lys (missense); la subunidad mutante reduce la actividad del tetrámero completo, por eso un heterocigoto ya acumula acetaldehído.

B) G→A que crea un codón de paro; la enzima se trunca.

C) G→A en la tercera posición; Glu→Asp (missense conservador) sin efecto.

D) G→A en la primera posición; Glu→Glu (sinónimo); no hay consecuencia funcional.

E3-2 · Clasificar variantes en una secuencia 4 pts

Marco de lectura abierto ilustrativo (posiciones contadas desde la A del ATG):

`5´-ATG AAA CCG TAC TGT GGA CTT TAA-3´`

Proteína: Met-Lys-Pro-Tyr-Cys-Gly-Leu-Stop

c.6A>G → [w1]

c.12C>G → [w2]

c.14G>A → [w3]

c.20delT → [w4]

c.7_9dupCCG → [w5]

De las cinco, la que con mayor probabilidad elimina la función de la proteína desde ese punto es: [w6]

Opciones para cada espacio:

[w1] sinónima (Lys→Lys) · missense (Lys→Arg) · nonsense · indel con corrimiento del marco

[w2] nonsense (Tyr→Stop) · sinónima (Tyr→Tyr) · missense (Tyr→Cys) · indel sin corrimiento del marco

[w3] missense (Cys→Tyr) · sinónima (Cys→Cys) · nonsense · missense (Cys→Trp)

[w4] indel con corrimiento del marco · indel sin corrimiento del marco · sinónima · CNV

[w5] inserción sin corrimiento del marco (Pro adicional) · indel con corrimiento del marco · nonsense · sinónima

[w6] c.12C>G · c.6A>G · c.7_9dupCCG · c.14G>A

E3-3 · Lectura de gel: Alu PV92 4 pts

Gel de agarosa al 2 % con productos de PCR de PV92 (alelo + con Alu ≈ 731 pb; alelo − sin Alu ≈ 416 pb). M = marcador de 100 pb. «▬» indica banda; «tenue», banda débil; «barrido», mancha continua sin bandas definidas.

Tamaño (pb)	M	Carril 1	Carril 2	Carril 3	Carril 4	Carril 5	Carril 6 (sin DNA)
1000	▬				barrido		
≈ 730	▬ (700)		▬	▬ tenue	barrido	▬	
500	▬				barrido		
≈ 420	▬ (400)	▬		▬	barrido	▬	▬
100	▬				barrido		

Asigna la interpretación de cada carril.

Columna A	Columna B (una opción sobra)
1. Carril 1	A) Heterocigoto +/−; la banda larga se ve débil por amplificación preferencial del alelo corto
2. Carril 2	B) Homocigoto +/+ (inserción en ambos cromosomas)
3. Carril 3	C) Homocigoto −/− (sin inserción)
4. Carril 4	D) Homocigoto +/+ con una tercera inserción
5. Carril 5	E) Contaminación: el control sin DNA amplificó; los resultados de toda la corrida no son confiables
6. Carril 6	F) Heterocigoto +/−
	G) DNA degradado o exceso de templado: repetir extracción o diluir; no se genotipa

E3-4 · Elegir y evaluar la extracción 3 pts

Un proyecto colectará 300 hisopados bucales en escuelas y genotipará varios SNPs. El laboratorio tiene campana de extracción limitada. En una prueba piloto, el DNA extraído por salting-out dio $A_{260/280}$ = 1.52. ¿Cuál es la mejor decisión?

A) Cambiar a fenol-cloroformo para todas las muestras, porque da el DNA más puro.

B) Aumentar el volumen de DNA en la PCR para compensar la impureza.

C) Ignorar el valor: cualquier DNA sirve para PCR.

D) La relación 1.52 sugiere proteína residual: ajustar la precipitación de proteínas (más sal o centrifugado, sin arrastrar la interfase) o usar columnas de sílice o perlas SPRI, que escalan bien, no requieren solventes orgánicos y dan DNA apto para PCR.

E3-5 · Lo que dice el genoma de referencia 3 pts

Al correr los cebadores de PV92 en UCSC In-Silico PCR (GRCh38) se obtiene un solo producto de 416 pb. Un alumno concluye que «la población humana es −/− para PV92». ¿Cuál es el error de razonamiento?

A) UCSC In-Silico PCR solo funciona con mRNA.

B) Ninguno: UCSC refleja a toda la población.

C) El genoma de referencia es una secuencia compuesta que representa un solo alelo en cada sitio; que tenga el alelo − no informa la frecuencia poblacional, que se obtiene genotipando muestras o consultando bases poblacionales.

D) El producto de 416 pb corresponde al alelo +.

E3-6 · Interpretar una entrada del GWAS Catalog 3 pts

En el GWAS Catalog, una variante intergénica aparece asociada al consumo de café con «mapped genes: *CYP1A1 – CYP1A2*», OR por alelo = 1.05 y $p = 2 \times 10^{-30}$, en una muestra de 120 000 europeos. ¿Qué conclusión es la más rigurosa?

A) Existe una asociación robusta pero de efecto pequeño; la variante probablemente marca una región regulatoria del locus CYP1A1–CYP1A2 (metabolismo de cafeína), y su efecto y frecuencia podrían diferir en poblaciones no europeas.

B) La variante causa que las personas tomen café.

C) Como el OR es casi 1, la asociación es falsa.

D) Los genes asignados son siempre los genes efectores.

Bloque 4 · Cálculo químico-enzimático, capacidad antioxidante y troubleshooting (20 %)

3 cálculos, 2 de opción múltiple (2.5 pts c/u) y 1 de selección múltiple (5 pts). Escribe solo el número en los cálculos.

Fórmulas: % inhibición = $[A_{control} - (A_{muestra} - A_{blanco})] / A_{control} \times 100$. Catalasa: U/mL = $(\Delta A_{240}/min) / (43.6 \times l) \times 1000 \times (V_{total}/V_{muestra})$.

E4-1 · Inhibición de DPPH con blanco 3 pts

Extracto de flor de cempasúchil a 40 µg/mL:

Lectura	A_{517}
Control (DPPH + metanol)	0.874
Muestra + DPPH	0.521
Blanco de muestra (extracto sin DPPH)	0.044

Calcula el porcentaje de inhibición (una cifra decimal).

Resultado: _____

E4-2 · IC50 con tabla de absorbancias 4 pts

Extracto de cáscara de tuna roja. A_{517} del control (DPPH + metanol) = 0.912.

µg/mL	A muestra + DPPH	A blanco de muestra
5	0.756	0.008
15	0.553	0.015
30	0.374	0.027
60	0.231	0.049

Calcula el % de inhibición de cada concentración (restando el blanco) y estima la IC_{50} por interpolación lineal entre los dos puntos que rodean al 50 % (µg/mL, una cifra decimal).

Resultado: _____

E4-3 · Actividad específica de catalasa 3 pts

Homogenado de riñón: ΔA_{240}/min = 0.0327 (tramo inicial), cubeta de cuarzo de 1 cm, volumen total 3.0 mL, volumen de muestra 0.10 mL, proteína 1.5 mg/mL. $\varepsilon_{240}(H_2O_2)$ = 43.6 M^{-1} cm^{-1}; 1 U = 1 µmol de H_2O_2 por minuto. Calcula la actividad en U/mg de proteína.

Resultado: _____

E4-4 · Comparar IC50 entre laboratorios 2.5 pts

Tu extracto de jamaica dio IC_{50} = 35 µg/mL con DPPH 0.1 mM y 30 min de reacción. Un artículo reporta IC_{50} = 12 µg/mL para jamaica usando DPPH 0.05 mM y 60 min. ¿Puedes concluir que tu extracto es casi tres veces menos potente?

A) No, porque la jamaica no tiene antioxidantes.

B) Sí: la IC_{50} es una propiedad fija del extracto.

C) Sí, porque el artículo fue publicado y tu experimento no.

D) No directamente: la IC_{50} depende de la concentración de DPPH (con menos radical se necesita menos extracto) y del tiempo de reacción; para comparar hay que usar las mismas condiciones o un patrón común (p. ej., expresar en equivalentes de Trolox medido en paralelo).

E4-5 · Una lectura fuera de la curva 2.5 pts

En FRAP, la curva de Trolox va de 0 a 500 µM (A_{593} de 0.01 a 1.30). Un extracto sin diluir da A_{593} = 2.45. Un compañero extrapola la recta y reporta 940 µM. ¿Qué es lo correcto?

A) Reportar 500 µM, el máximo de la curva.

B) Restar el blanco de reactivo y reportar el resultado así.

C) Diluir el extracto (p. ej., 1:5), volver a leer para que caiga dentro de la curva y multiplicar por el factor de dilución; a absorbancias tan altas la respuesta deja de ser lineal.

D) Aceptar el valor: la recta se puede extender indefinidamente.

E4-6 · Integrar los ensayos de un experimento 5 pts

Ratas con dieta alta en fructosa, con o sin un extracto de chile ancho, frente a un control:

Marcador	Fructosa	Fructosa + extracto
SOD hepática (U/mg)	↑ 40 %	↑ 45 %
Catalasa hepática (U/mg)	↓ 35 %	≈ control
TBARS (MDA)	↑ 70 %	↑ 15 %
TAC sérica	↑ 25 %	↑ 28 %
Ácido úrico sérico	↑ 50 %	↑ 48 %

Selecciona las interpretaciones bien sustentadas.

Marca todas las correctas.

A) Como la TAC sube igual en ambos grupos y el ácido úrico también, la TAC no sirve aquí para distinguir el efecto del extracto.

B) Como la SOD está alta en ambos grupos, el extracto no tuvo ningún efecto.

C) El extracto recuperó la catalasa y redujo la peroxidación, lo que sugiere un efecto protector; un mecanismo posible es la inducción de enzimas antioxidantes (p. ej., vía Nrf2).

D) El aumento de TAC en ambos grupos demuestra que la fructosa es antioxidante.

E) Con fructosa sola hay un desbalance: más H_2O_2 producido (SOD alta) que eliminado (catalasa baja), coherente con más peroxidación (TBARS).