Revisión del preexamen
Del Genoma Crudo a la Clínica

Respuestas explicadas · 44 reactivos · 100 puntos

Nutrición Molecular

Bloque 1
Fundamentos moleculares y ómicos

Ómicas y dogma central · SNP, indels y CNV · Respuesta interindividual · TAS2R38 · PKU frente a lactasa · MTHFR · FTO · ALDH2



30 %

15 reactivos

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-1 · ¿Qué capa ómica responde la pregunta?

Un equipo quiere saber si un yogur fermentado cambia, a las 2 horas de consumirlo, las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos de cadena corta, aminoácidos y ácidos biliares. ¿Qué enfoque responde de forma más directa esa pregunta?

A. Genómica del voluntario (secuenciación de su DNA).

B. Metabolómica plasmática (LC-MS o RMN).

C. Transcriptómica de leucocitos (RNA-seq).

D. Epigenómica de leucocitos (metilación de CpG).

B1-1 · ¿Qué capa ómica responde la pregunta?

B) Metabolómica plasmática (LC-MS o RMN).

Por qué es correcta

Correcta: metabolómica. La pregunta es sobre moléculas pequeñas circulantes a muy corto plazo; la metabolómica las mide directamente y es la capa más cercana al fenotipo y a la dieta.

Por qué fallan las demás

- Genómica: el DNA del voluntario no cambia en 2 horas; describe el potencial, no la respuesta aguda.
- Transcriptómica: mide RNA mensajero, un paso intermedio; un cambio de transcritos no informa la concentración de metabolitos.
- Epigenómica: la metilación cambia en escalas más largas y tampoco cuantifica metabolitos.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-2 · Dogma central y regulación

En adultos con genotipo de no persistencia de lactasa, el promotor de *LCT* en el epitelio intestinal se hipermetila con la edad y baja el mRNA de lactasa. ¿Qué afirmación describe mejor ese fenómeno dentro del dogma central?

A. Es un cambio postraduccional de la lactasa que la inactiva.

B. Es una regulación epigenética: la secuencia no cambia, pero la metilación del promotor reduce la transcripción (DNA → RNA); se detectaría con epigenómica y transcriptómica.

C. Es un cambio en el código genético que hace que el ribosoma no lea el mRNA de lactasa.

D. Es una mutación adquirida del gen *LCT* que cambia la proteína.

B1-2 · Dogma central y regulación

B) Es una regulación epigenética: la secuencia no cambia, pero la metilación del promotor reduce la transcripción (DNA → RNA); se detectaría con epigenómica y transcriptómica.

Por qué es correcta

Correcta: regulación epigenética de la transcripción. La metilación de CpG en promotores reduce el acceso de la maquinaria transcripcional sin alterar la secuencia. El efecto aparece como menos mRNA y menos proteína.

Por qué fallan las demás

- «Mutación adquirida»: la secuencia de LCT no cambia; la metilación es una marca química sobre la citosina.
- «Cambio postraduccional»: actuaría sobre la proteína ya formada; aquí lo que baja es el mRNA.
- «Cambio en el código genético»: el código es universal; la lectura del mRNA no es el paso afectado.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-3 · Un SNP sinónimo

Un SNP cambia el codón CTG por CTA; ambos codifican leucina. Un alumno afirma que, por ser sinónimo, «no puede tener ningún efecto biológico». ¿Cuál es la mejor respuesta?

A. Tiene razón: si el aminoácido no cambia, la proteína es idéntica y no hay efecto posible.

B. No necesariamente: un cambio sinónimo puede alterar sitios de splicing, la estabilidad del mRNA o la velocidad de traducción por uso de codones, aunque la mayoría son neutros.

C. Es incorrecto porque todo SNP sinónimo es en realidad un nonsense.

D. Un SNP sinónimo siempre cambia la proteína porque modifica el marco de lectura.

B1-3 · Un SNP sinónimo

B) No necesariamente: un cambio sinónimo puede alterar sitios de splicing, la estabilidad del mRNA o la velocidad de traducción por uso de codones, aunque la mayoría son neutros.

Por qué es correcta

Correcta: puede tener efecto, aunque casi siempre es neutro. «Sinónimo» describe solo el efecto sobre el aminoácido. El mRNA sí cambia, y eso puede afectar procesamiento o traducción.

Por qué fallan las demás

- «No hay efecto posible»: confunde la secuencia proteica con todo lo que hace el mRNA.
- «Es un nonsense»: nonsense significa crear un codón de paro; CTA codifica leucina.
- «Cambia el marco de lectura»: una sustitución de una base no corre el marco; eso lo hacen los indels que no son múltiplos de 3.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-4 · Nonsense frente a missense

Dos pacientes tienen variantes en el codón 120 de una enzima de 450 aminoácidos: el paciente 1 tiene CAG→CAT (Gln→His) y el paciente 2 tiene CAG→TAG. ¿Qué predicción es más razonable?

A. La del paciente 2 es sinónima, porque TAG también codifica glutamina.

B. Ambas variantes tienen el mismo efecto porque afectan el mismo codón.

C. La del paciente 1 es más grave porque His tiene carga.

D. La del paciente 2 introduce un codón de paro prematuro; lo esperable es una proteína truncada o un mRNA degradado por NMD, con pérdida de función más grave que el cambio Gln→His.

B1-4 · Nonsense frente a missense

D) La del paciente 2 introduce un codón de paro prematuro; lo esperable es una proteína truncada o un mRNA degradado por NMD, con pérdida de función más grave que el cambio Gln→His.

Por qué es correcta

Correcta: nonsense con pérdida de función. TAG es codón de paro. Un paro en el codón 120 de 450 elimina casi toda la proteína y suele activar el decaimiento del mRNA mediado por nonsense (NMD).

Por qué fallan las demás

- «Mismo efecto»: el codón es el mismo, pero el cambio resultante es distinto (missense vs. nonsense).
- «His es más grave»: un missense puede ser grave o neutro según el sitio; no hay base para suponerlo peor que perder la proteína.
- «TAG codifica glutamina»: TAG es uno de los tres codones de paro.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-5 · Indels y marco de lectura

En un exón se encuentran dos deleciones distintas: una de 1 nucleótido y otra de 3 nucleótidos. ¿Qué consecuencia es más probable para cada una?

A. Ambas corren el marco de lectura.

B. La de 3 nt corre el marco y la de 1 nt no.

C. La de 1 nt corre el marco (cambia todos los aminoácidos siguientes y suele crear un paro prematuro); la de 3 nt elimina un aminoácido sin correr el marco.

D. Ninguna afecta la proteína porque los indels solo ocurren en intrones.

B1-5 · Indels y marco de lectura

C) La de 1 nt corre el marco (cambia todos los aminoácidos siguientes y suele crear un paro prematuro); la de 3 nt elimina un aminoácido sin correr el marco.

Por qué es correcta

Correcta: la de 1 nt es frameshift; la de 3 nt es in-frame. El ribosoma lee de 3 en 3; quitar un número de bases que no es múltiplo de 3 desplaza la lectura.

Por qué fallan las demás

- «Ambas corren el marco»: 3 nt es un codón completo.
- «Al revés»: invierte la regla del múltiplo de 3.
- «Solo en intrones»: los indels pueden ocurrir en cualquier región; en exones tienen el mayor efecto.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-6 · Variación en número de copias (CNV)

Las poblaciones con dietas tradicionalmente altas en almidón tienden a tener más copias del gen de amilasa salival *AMY1*, y el número de copias se asocia con la cantidad de amilasa en saliva. ¿Qué tipo de variante es y qué ilustra?

A. Un SNP missense que mejora la enzima.

B. Un indel que corre el marco de lectura de AMY1.

C. Una mutación somática adquirida por comer almidón.

D. Una CNV: el número de copias del gen cambia la dosis de proteína, un ejemplo de variación genética asociada a la dieta.

B1-6 · Variación en número de copias (CNV)

D) Una CNV: el número de copias del gen cambia la dosis de proteína, un ejemplo de variación genética asociada a la dieta.

Por qué es correcta

Correcta: CNV con efecto de dosis. Más copias del gen → más transcripción total → más enzima. Es un ejemplo clásico de variación estructural relacionada con la dieta.

Por qué fallan las demás

- «SNP missense»: un SNP cambia una base; aquí lo que varía es cuántas copias del gen hay.
- «Indel frameshift»: un frameshift anularía la proteína, no la aumentaría.
- «Mutación somática por comer almidón»: la dieta no crea copias génicas en el individuo; la diferencia es heredada y poblacional.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-7 · Hiporrespondedores e hiperrespondedores

En un ensayo, 30 adultos agregan 300 mg/día de colesterol dietario durante 4 semanas. El LDL cambia en promedio +6 mg/dL, pero un tercio sube más de 20 mg/dL y otro tercio no cambia. ¿Qué concepto describe mejor estos resultados?

A. Los hiporrespondedores no absorben colesterol.

B. Error de medición: todos deberían responder igual.

C. El promedio de +6 mg/dL describe bien a todos los participantes.

D. Respuesta interindividual a la dieta: hay hiperrespondedores e hiporrespondedores, en parte por variación genética (p. ej., APOE) y en parte por otros factores.

B1-7 · Hiporrespondedores e hiperrespondedores

D) Respuesta interindividual a la dieta: hay hiperrespondedores e hiporrespondedores, en parte por variación genética (p. ej., APOE) y en parte por otros factores.

Por qué es correcta

Correcta: variabilidad interindividual. El promedio oculta subgrupos con respuestas muy distintas; la nutrigenética busca qué variantes explican parte de esa heterogeneidad.

Por qué fallan las demás

- «Error de medición»: puede contribuir, pero una dispersión sistemática en subgrupos es justamente lo que define respondedores.
- «El promedio describe a todos»: es la falacia que este concepto corrige.
- «No absorben colesterol»: es una sobreinterpretación; la respuesta depende de absorción, síntesis endógena y depuración de LDL.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-8 · Haplotipos de TAS2R38

¿Qué describe correctamente los haplotipos PAV y AVI de *TAS2R38*?

A Son combinaciones de tres SNPs missense (posiciones 49, 262 y 296 de la proteína); PAV forma un receptor funcional (catador de PTC/PROP, «supertaster» en el curso) y AVI uno poco funcional (no catador).

B Son dos genes distintos del cromosoma 7.

C PAV es una deleción y AVI una inserción Alu.

D AVI es el haplotipo catador porque tiene valina.

B1-8 · Haplotipos de TAS2R38

A) Son combinaciones de tres SNPs missense (posiciones 49, 262 y 296 de la proteína); PAV forma un receptor funcional (catador de PTC/PROP, «supertaster» en el curso) y AVI uno poco funcional (no catador).

Por qué es correcta

Correcta: tres SNPs missense en un mismo haplotipo. Pro-Ala-Val en las posiciones 49, 262 y 296 (PAV) da un receptor sensible; Ala-Val-Ile (AVI) da un receptor con muy baja sensibilidad a tioureas como PTC y PROP.

Por qué fallan las demás

- «Dos genes»: es un mismo gen con alelos distintos.
- «Deleción/inserción»: son sustituciones de una base.
- «AVI catador»: es al revés; AVI es el haplotipo no catador.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-9 · Receptores T2R fuera de la boca

Los receptores de sabor amargo T2R también se expresan en células enteroendocrinas del intestino. ¿Qué papel fisiológico es el más aceptado?

A. Detectan compuestos amargos en la luz intestinal y estimulan la liberación de hormonas como GLP-1 o CCK, que informan al cerebro (eje intestino-cerebro) sobre saciedad y motilidad.

B. Solo existen en roedores; en humanos no hay T2R extraorales.

C. Permiten «saborear» el alimento en el intestino de forma consciente.

D. Degradan los compuestos amargos antes de su absorción.

B1-9 · Receptores T2R fuera de la boca

A) Detectan compuestos amargos en la luz intestinal y estimulan la liberación de hormonas como GLP-1 o CCK, que informan al cerebro (eje intestino-cerebro) sobre saciedad y motilidad.

Por qué es correcta

Correcta: quimiosensores que liberan hormonas intestinales. La señal no es una percepción consciente: activa vías endocrinas y vagales hacia el sistema nervioso central.

Por qué fallan las demás

- «Saborear de forma consciente»: la percepción consciente del sabor ocurre en la lengua y la corteza gustativa.
- «Degradan los compuestos»: los receptores detectan, no metabolizan.
- «Solo roedores»: hay evidencia de T2R extraorales en humanos (intestino, vía aérea).

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-10 · Monogénico frente a regulatorio común

¿Qué comparación entre fenilcetonuria (*PAH*) y persistencia de lactasa (*MCM6/LCT*) es correcta?

A. En ambas la dieta no influye en el fenotipo.

B. PKU se debe a una variante del potenciador de PAH y la persistencia de lactasa a una nonsense de LCT.

C. Ambas son rasgos poligénicos de efecto pequeño.

D. PKU es monogénica, recesiva, de gran efecto y con variantes casi siempre raras y codificantes; la persistencia de lactasa depende de variantes comunes en un potenciador regulatorio que cambia la expresión de LCT en el adulto.

B1-10 · Monogénico frente a regulatorio común

D) PKU es monogénica, recesiva, de gran efecto y con variantes casi siempre raras y codificantes; la persistencia de lactasa depende de variantes comunes en un potenciador regulatorio que cambia la expresión de LCT en el adulto.

Por qué es correcta

Correcta: gran efecto codificante frente a variante regulatoria común. En PKU la pérdida de función de la fenilalanina hidroxilasa es casi determinante; en lactasa, la variante cambia cuándo y cuánto se expresa una enzima normal.

Por qué fallan las demás

- «Ambas poligénicas»: PKU es el modelo de enfermedad monogénica.
- «Al revés»: invierte el tipo de variante de cada caso.
- «La dieta no influye»: en ambos casos la dieta es central (restricción de Phe en PKU; consumo de lactosa en hipolactasia).

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-11 · ¿Dónde está la variante –13910?

La variante −13910C>T (rs4988235), asociada a persistencia de lactasa en europeos, se localiza en el intrón 13 del gen *MCM6*, unos 14 kb río arriba de *LCT*. ¿Cómo actúa?

A. Cambia un aminoácido de la proteína MCM6.

B. Elimina el gen MCM6, lo que libera a LCT.

C. Forma parte de un potenciador: el alelo T favorece la unión de factores de transcripción (como Oct-1) y mantiene la transcripción de *LCT* en el adulto, sin cambiar la secuencia de la lactasa.

D. Cambia un aminoácido de la lactasa y la hace más activa.

B1-11 · ¿Dónde está la variante –13910?

C) Forma parte de un potenciador: el alelo T favorece la unión de factores de transcripción (como Oct-1) y mantiene la transcripción de *LCT* en el adulto, sin cambiar la secuencia de la lactasa.

Por qué es correcta

Correcta: potenciador regulatorio a distancia. Un intrón de un gen vecino puede contener elementos que regulan a otro gen; por eso el «gen asignado» en una base de datos no siempre es el gen efector.

Por qué fallan las demás

- «Cambia un aminoácido de MCM6»: los intrones no se traducen.
- «Cambia un aminoácido de la lactasa»: la variante no está en LCT y la enzima es la misma; cambia su cantidad.
- «Elimina MCM6»: es un SNP, no una deleción del gen.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-12 · Hipolactasia, malabsorción e intolerancia

¿Cuál conjunto de definiciones es correcto?

A Hipolactasia: baja actividad de lactasa en el borde en cepillo. Malabsorción: la lactosa no se absorbe por completo (se demuestra, p. ej., con prueba de hidrógeno espirado). Intolerancia: aparición de síntomas tras ingerir lactosa.

B Hipolactasia es una alergia a la proteína de la leche.

C Intolerancia es la causa genética, malabsorción el síntoma e hipolactasia la prueba de laboratorio.

D Son sinónimos.

B1-12 · Hipolactasia, malabsorción e intolerancia

A) Hipolactasia: baja actividad de lactasa en el borde en cepillo. Malabsorción: la lactosa no se absorbe por completo (se demuestra, p. ej., con prueba de hidrógeno espirado). Intolerancia: aparición de síntomas tras ingerir lactosa.

Por qué es correcta

Correcta: son tres niveles distintos: enzima, absorción y síntomas. Una persona puede tener hipolactasia y malabsorción sin síntomas (sin intolerancia), según la dosis de lactosa y su microbiota.

Por qué fallan las demás

- «Sinónimos»: confundirlos lleva a diagnósticos erróneos.
- «Intolerancia = causa genética»: la genética explica la hipolactasia; la intolerancia es clínica.
- «Alergia a la proteína»: la alergia a proteínas de leche es inmunológica y distinta de la hipolactasia.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-13 · MTHFR C677T

¿Qué describe correctamente la variante *MTHFR* C677T?

A. Es nonsense: produce una enzima truncada sin actividad.

B. Es sinónima y no tiene efecto.

C. Es missense (Ala222Val): produce una enzima termolábil con menor actividad; con folato bajo, los homocigotos TT tienden a tener homocisteína más alta.

D. Aumenta la actividad de MTHFR y baja la homocisteína.

B1-13 · MTHFR C677T

C) Es missense (Ala222Val): produce una enzima termolábil con menor actividad; con folato bajo, los homocigotos TT tienden a tener homocisteína más alta.

Por qué es correcta

Correcta: missense termolábil con interacción gen–folato. El efecto del genotipo depende del estado de folato (y de riboflavina, precursora del FAD que usa MTHFR).

Por qué fallan las demás

- «Nonsense»: no crea codón de paro.
- «Sinónima»: cambia alanina por valina.
- «Aumenta la actividad»: la reduce.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-14 · FTO rs9939609

¿Qué afirmación sobre el alelo A de *FTO* rs9939609 está mejor sustentada?

A. Cada copia del alelo A se asocia con más masa grasa y mayor riesgo de obesidad, con un efecto modesto (del orden de 1–1.5 kg por alelo) que se atenúa en personas físicamente activas.

B. Explica la mayor parte de la variación del IMC en la población.

C. Los homocigotos AA desarrollan obesidad con certeza.

D. Es una variante nonsense que elimina la proteína FTO.

B1-14 · FTO rs9939609

A) Cada copia del alelo A se asocia con más masa grasa y mayor riesgo de obesidad, con un efecto modesto (del orden de 1–1.5 kg por alelo) que se atenúa en personas físicamente activas.

Por qué es correcta

Correcta: asociación real pero de efecto pequeño. Es la variante común de mayor efecto descrita para IMC, pero explica una fracción mínima de la varianza y su efecto se modifica con la actividad física.

Por qué fallan las demás

- «Obesidad con certeza»: es un factor de riesgo probabilístico.
- «Nonsense»: está en un intrón y actúa por mecanismos regulatorios.
- «La mayor parte de la variación»: el IMC es poligénico y muy influido por el ambiente.

Bloque 1 · 2 pts | Opción múltiple

B1-15 · ALDH2 y acetaldehído

¿Por qué los portadores del alelo *ALDH2**2 (rs671, Glu504Lys) presentan rubor facial tras beber alcohol?

A. Porque producen más ALDH2 y oxidan el acetaldehído demasiado rápido.

B. Porque tienen alergia al alcohol.

C. Porque metabolizan el etanol más lento y se acumula etanol.

D. Porque la enzima ALDH2 mutante, que actúa como tetrámero, pierde actividad (efecto dominante negativo); el acetaldehído se acumula y causa vasodilatación.

B1-15 · ALDH2 y acetaldehído

D) Porque la enzima ALDH2 mutante, que actúa como tetrámero, pierde actividad (efecto dominante negativo); el acetaldehído se acumula y causa vasodilatación.

Por qué es correcta

Correcta: acumulación de acetaldehído por pérdida de función dominante negativa. Basta una copia de ALDH2*2 para reducir mucho la actividad, porque las subunidades mutantes contaminan el tetrámero.

Por qué fallan las demás

- «Se acumula etanol»: el paso afectado es acetaldehído → acetato, después de ADH.
- «Alergia»: no es un mecanismo inmunológico.
- «Más ALDH2»: es al revés; la actividad baja.

Bloque 2
Casos clínicos y diagnóstico nutrigenético

Percepción sensorial (TAS2R38, OR6A2, OR2M7) · CYP1A2 y café · ALDH2 · APOE × alcohol · FTO · Lactosa: hipolactasia, malabsorción e intolerancia



30 %

10 reactivos

Bloque 2 · 2 pts | Opción múltiple

B2-1 · Niño que rechaza el brócoli

Un niño de 8 años con genotipo *TAS2R38* PAV/PAV rechaza brócoli, col y coles de Bruselas. Su madre pide un «suplemento para que le guste». ¿Qué recomendación es la mejor fundamentada?

A. Cambiar el diagnóstico a alergia alimentaria.

B. Indicar un suplemento de PROP para desensibilizar el receptor.

C. No hay nada que hacer: su genotipo le impedirá comer crucíferas toda la vida.

D. Explicar que percibe más intenso el amargor de los glucosinolatos; usar exposición repetida, cocciones que reducen el amargor y combinaciones con grasas o sabores dulces/salados, y asegurar otras fuentes de verduras.

B2-1 · Niño que rechaza el brócoli

D) Explicar que percibe más intenso el amargor de los glucosinolatos; usar exposición repetida, cocciones que reducen el amargor y combinaciones con grasas o sabores dulces/salados, y asegurar otras fuentes de verduras.

Por qué es correcta

Correcta: intervención conductual y culinaria informada por el genotipo. El genotipo explica una mayor sensibilidad, no una imposibilidad; la aceptación de alimentos se modifica con exposición y preparación.

Por qué fallan las demás

- «No hay nada que hacer»: el genotipo es un factor, no un destino.
- «Suplemento de PROP»: no existe evidencia de desensibilización así, y PROP es un compuesto de prueba.
- «Alergia»: rechazo por sabor no es una reacción inmunológica.

Bloque 2 · 2 pts | Opción múltiple

B2-2 · «El cilantro sabe a jabón»

Una paciente dice que el cilantro le sabe a jabón y lo evita en todas las salsas. Su prueba genética muestra el alelo de riesgo en una variante cercana a *OR6A2*. ¿Qué interpretación es la mejor?

A. El sabor a jabón se debe a que el cilantro contiene detergente.

B. OR6A2 codifica un receptor olfatorio que detecta aldehídos presentes en el cilantro; su variante se asocia a percibir ese olor como «jabonoso». Es una variación normal; basta sustituir el cilantro por otras hierbas sin consecuencias nutricionales relevantes.

C. Tiene una enfermedad del gusto que requiere tratamiento.

D. Debe forzarse a comer cilantro porque su genotipo es un error.

B2-2 · «El cilantro sabe a jabón»

B) OR6A2 codifica un receptor olfatorio que detecta aldehídos presentes en el cilantro; su variante se asocia a percibir ese olor como «jabonoso». Es una variación normal; basta sustituir el cilantro por otras hierbas sin consecuencias nutricionales relevantes.

Por qué es correcta

Correcta: variación normal de un receptor olfatorio. La percepción del sabor de las hierbas depende mucho del olfato; el cilantro contiene aldehídos con notas jabonosas que algunas personas perciben con más intensidad.

Por qué fallan las demás

- «Enfermedad»: es variación común, no patología.
- «Forzarlo»: no hay beneficio nutricional que lo justifique.
- «Contiene detergente»: son aldehídos naturales de la planta.

Bloque 2 · 2 pts | Opción múltiple

B2-3 · Orina después de espárragos

Dos hermanos comen espárragos. Uno nota un olor sulfuroso en su orina y el otro asegura que no huele nada. ¿Qué explicación es más completa?

A. Ambos deberían tener el mismo fenotipo porque son hermanos.

B. Es un signo de insuficiencia renal.

C. Hay variación en dos pasos: producir los compuestos azufrados y percibirlos. Una variante cercana a *OR2M7* se asocia a anosmia específica para ese olor; para saber cuál paso falla, habría que pedirle que huela la orina del hermano.

D. El hermano que no huele nada no produce los compuestos azufrados.

B2-3 · Orina después de espárragos

C) Hay variación en dos pasos: producir los compuestos azufrados y percibirlos. Una variante cercana a *OR2M7* se asocia a anosmia específica para ese olor; para saber cuál paso falla, habría que pedirle que huela la orina del hermano.

Por qué es correcta

Correcta: distinguir producción de percepción. Es una buena lección de diseño: una sola observación («no huelo nada») tiene dos explicaciones posibles, y un experimento simple las separa.

Por qué fallan las demás

- «No produce»: posible, pero no es la única explicación; podría producirlos y no percibirlos.
- «Mismo fenotipo por ser hermanos»: comparten en promedio la mitad de las variantes.
- «Insuficiencia renal»: es un fenómeno común y benigno.

Bloque 2 · 2 pts | Opción múltiple

B2-4 · Café y metabolismo lento

Hombre de 42 años, presión arterial limítrofe, toma 4 tazas de café al día. Su genotipo *CYP1A2* rs762551 es C/C («metabolizador lento»). ¿Qué recomendación es más coherente con la evidencia?

A Considerar reducir a 1–2 tazas/día: en metabolizadores lentos la cafeína permanece más tiempo en circulación, y se ha descrito mayor riesgo cardiovascular con consumo alto en ese genotipo; vigilar presión arterial.

B Ninguna: el café es igual para todos.

C Aumentar el café porque los metabolizadores lentos se benefician más de la cafeína.

D Suspender toda fuente de cafeína de inmediato porque su genotipo es patogénico.

B2-4 · Café y metabolismo lento

A) Considerar reducir a 1–2 tazas/día: en metabolizadores lentos la cafeína permanece más tiempo en circulación, y se ha descrito mayor riesgo cardiovascular con consumo alto en ese genotipo; vigilar presión arterial.

Por qué es correcta

Correcta: moderar la dosis según el metabolismo. CYP1A2 hace la mayor parte del metabolismo de la cafeína; la variante condiciona cuánto tiempo está expuesto el organismo a la misma dosis.

Por qué fallan las demás

- «Igual para todos»: ignora la variabilidad farmacocinética documentada.
- «Aumentar el café»: el beneficio descrito con café se observa sobre todo en metabolizadores rápidos.
- «Suspender de inmediato, genotipo patogénico»: es una variante común, no una enfermedad; la recomendación es de moderación.

Bloque 2 · 2 pts | Opción múltiple

B2-5 · Rubor y «tolerancia»

Una estudiante de ascendencia japonesa (*ALDH2**1/*2) se pone roja al beber. Dice que «va a entrenar su tolerancia» bebiendo más seguido hasta que deje de ponerse roja. ¿Qué le explicas?

A. Debe tomar antihistamínicos para quitarse el rubor y seguir bebiendo.

B. El rubor es una señal de acumulación de acetaldehído, un carcinógeno; en portadores de ALDH2*2 beber con frecuencia se asocia con mayor riesgo de cáncer de esófago, aunque el rubor disminuya. Conviene reducir el consumo.

C. Su genotipo la protege de cualquier daño por alcohol.

D. Es buena idea: la tolerancia elimina el riesgo.

B2-5 · Rubor y «tolerancia»

B) El rubor es una señal de acumulación de acetaldehído, un carcinógeno; en portadores de ALDH2*2 beber con frecuencia se asocia con mayor riesgo de cáncer de esófago, aunque el rubor disminuya. Conviene reducir el consumo.

Por qué es correcta

Correcta: el rubor es la alarma, no el problema.
Quitar la señal (por adaptación o fármacos) no elimina la exposición al acetaldehído en la mucosa.

Por qué fallan las demás

- «La tolerancia elimina el riesgo»: el acetaldehído sigue acumulándose.
- «La protege»: el efecto aversivo puede reducir el consumo, pero si bebe, su riesgo es mayor.
- «Antihistamínicos»: enmascaran la señal y facilitan beber más.

Bloque 2 · 2 pts | Opción múltiple

B2-6 · APOE ε4 y alcohol

Hombre de 50 años, *APOE* ε3/ε4, LDL 168 mg/dL, bebe 3 cervezas diarias. Su cuñado (ε2/ε3) bebe lo mismo y tiene LDL de 110 mg/dL. ¿Qué interpretación se apoya en la evidencia de interacción gen–dieta?

A. La diferencia entre ambos se debe solo al alcohol.

B. En portadores de ε4 se ha descrito que el consumo de alcohol se asocia con LDL más alto, mientras que en portadores de ε2 se asocia con LDL más bajo; en este paciente, reducir el alcohol es una medida razonable junto con el resto del tratamiento.

C. El alcohol baja el LDL en todos por igual.

D. El genotipo ε4 obliga a iniciar estatinas sin cambios de estilo de vida.

B2-6 · APOE ε4 y alcohol

B) En portadores de ε4 se ha descrito que el consumo de alcohol se asocia con LDL más alto, mientras que en portadores de ε2 se asocia con LDL más bajo; en este paciente, reducir el alcohol es una medida razonable junto con el resto del tratamiento.

Por qué es correcta

Correcta: interacción APOE × alcohol sobre LDL. El mismo hábito puede asociarse con efectos opuestos según el genotipo; por eso la recomendación individual considera ambos.

Por qué fallan las demás

- «Baja el LDL en todos»: es justamente lo que la interacción contradice.
- «Solo al alcohol»: beben lo mismo; la diferencia sugiere el genotipo (y otros factores).
- «Estatinas sin estilo de vida»: el genotipo no sustituye la evaluación clínica ni elimina la intervención dietaria.

Bloque 2 · 3 pts

Selección múltiple: marca todas las correctas

B2-7 · Interpretar un reporte de FTO

Mujer de 29 años, IMC 33, *FTO* rs9939609 AA. Un laboratorio comercial le recomienda «una dieta especial para su genotipo FTO». Selecciona las afirmaciones bien sustentadas.

A. Una «dieta para FTO» tiene eficacia superior demostrada frente a una dieta saludable estándar.

B. Su genotipo se asocia con mayor riesgo de obesidad, pero no la determina.

C. Las personas AA pierden en promedio un peso similar a las TT en intervenciones de dieta y ejercicio, así que el genotipo no es una razón para no intentarlo.

D. Si fuera TT, no tendría riesgo de obesidad.

E. La actividad física atenúa el efecto del alelo A sobre el IMC.

B2-7 · Interpretar un reporte de FTO

B) Su genotipo se asocia con mayor riesgo de obesidad, pero no la determina.
C) Las personas AA pierden en promedio un peso similar a las TT en intervenciones de dieta y ejercicio, así que el genotipo no es una razón para no intentarlo.
E) La actividad física atenúa el efecto del alelo A sobre el IMC.

Explicación

Por qué son correctas: FTO aumenta el riesgo de forma modesta; la actividad física lo atenúa, y los metaanálisis no muestran peor respuesta a la pérdida de peso en portadores del alelo A.

Bloque 2 · 3 pts

Selección múltiple: marca todas las correctas

B2-8 · Un hiperrespondedor que quizá no lo es

En consulta, una paciente sube su LDL de 120 a 150 mg/dL tras dos semanas comiendo 3 huevos diarios, y la etiquetan como «hiperrespondedora genética». Selecciona las afirmaciones correctas.

A. Una sola medición antes y después no basta: el LDL varía entre días, y parte del cambio podría ser variabilidad intraindividual.

B. Para clasificarla habría que repetir mediciones o repetir el reto dietario.

C. Los hiporrespondedores no tienen ninguna base genética.

D. Si es hiperrespondedora, todos sus familiares también lo serán.

E. El genotipo APOE (p. ej., ε4) es uno de los factores asociados con mayor respuesta del LDL al colesterol dietario.

B2-8 · Un hiperrespondedor que quizá no lo es

A) Una sola medición antes y después no basta: el LDL varía entre días, y parte del cambio podría ser variabilidad intraindividual.
B) Para clasificarla habría que repetir mediciones o repetir el reto dietario.
E) El genotipo APOE (p. ej., ε4) es uno de los factores asociados con mayor respuesta del LDL al colesterol dietario.

Explicación

Por qué son correctas: Clasificar respondedores exige separar la respuesta real del ruido de medición; APOE es uno de los moduladores conocidos.

B2-9 · Caso: «la leche me cae mal»

Mujer de 24 años con distensión, gases y diarrea 1–2 horas después de tomar un vaso grande de leche. Tolera queso madurado y yogur. Resultados:

Estudio	Resultado
Genotipo *MCM6* −13910	C/C
Genotipo *MCM6* −22018	G/G
Prueba de H_2 espirado con 25 g de lactosa	Aumento de 38 ppm sobre el basal (positiva ≥ 20 ppm), con síntomas
Anticuerpos para enfermedad celíaca	Negativos

a) Usa correctamente los términos hipolactasia, malabsorción e intolerancia para describir su caso. b) Explica el mecanismo molecular de su genotipo (potenciador de MCM6, expresión de LCT y metilación del promotor con la edad). c) ¿Por qué tolera queso madurado y yogur? d) Propón un manejo nutricional y di qué riesgo nutricional hay que vigilar. e) Señala una limitación de usar solo el genotipo para diagnosticar.

B2-9 · Caso: «la leche me cae mal»

a) Genotipo C/C y G/G de no persistencia → hipolactasia del adulto (probable); la prueba de H_2 positiva demuestra malabsorción; los síntomas durante la prueba confirman intolerancia.

b) Los alelos −13910T y −22018A, en un potenciador del intrón 13 de MCM6, mantienen la transcripción de LCT en el adulto; con C/C y G/G la expresión de lactasa declina tras el destete, y en el epitelio se acumula metilación del promotor de LCT que refuerza el silenciamiento. La enzima es normal; cambia su cantidad.

c) El queso madurado tiene muy poca lactosa (queda en el suero y se fermenta) y el yogur tiene bacterias con β-galactosidasa que la hidrolizan parcialmente, además de vaciamiento gástrico más lento.

d) No eliminar todos los lácteos: fraccionar la lactosa (dosis pequeñas con comidas), usar productos deslactosados, yogur y quesos madurados, o lactasa exógena; vigilar el aporte de calcio y vitamina D.

e) El genotipo indica la predisposición, no los síntomas; hay personas C/C sin intolerancia con dosis habituales, y otras variantes de persistencia en poblaciones no europeas no se detectan con −13910; además los síntomas podrían tener otras causas (por eso se descartó celiaquía).

Rúbrica 1.5 terminología correcta de los tres niveles; 1.5 mecanismo regulatorio y epigenético; 1 explicación de la tolerancia a fermentados; 1 manejo con vigilancia de calcio/vitamina D; 1 limitación del genotipo.

B2-10 · Caso: reporte nutrigenético integrado

Hombre de 45 años, IMC 31, LDL 162 mg/dL, presión 138/88 mmHg. Toma 4 tazas de café y 3–4 cervezas al día; sedentario. Su reporte comercial incluye:

Gen (variante)	Genotipo
CYP1A2 rs762551	A/C
APOE	ε3/ε4
ALDH2 rs671	G/G (ALDH2*1/*1)
FTO rs9939609	A/T
MTHFR C677T	C/C

a) Interpreta cada resultado en una o dos líneas (qué implica y qué no). b) Ordena por prioridad tres recomendaciones y justifica cada una con un mecanismo. c) Explica por qué un resultado «normal» en ALDH2 no significa que el alcohol sea seguro para él. d) Menciona dos limitaciones de este tipo de reportes.

B2-10 · Caso: reporte nutrigenético integrado

a) CYP1A2 A/C: portador del alelo C, metabolismo de cafeína más lento que A/A; con presión limítrofe conviene moderar el café. APOE ε3/ε4: mayor LDL y mayor respuesta del LDL a grasa y colesterol dietarios; además, en ε4 el alcohol se asocia con LDL más alto. ALDH2*1/*1: oxida el acetaldehído con normalidad; no tiene rubor que lo «avise». FTO A/T: un alelo de riesgo, efecto modesto y atenuable con actividad física. MTHFR C/C: sin la variante termolábil; no requiere medidas específicas.

b) 1) Reducir el alcohol: actúa sobre LDL (interacción con ε4), presión, peso y riesgo de cáncer. 2) Actividad física regular y patrón dietario con menos grasa saturada: baja LDL (relevante en ε4), atenúa el efecto de FTO y ayuda a la presión. 3) Bajar a 1–2 tazas de café: menor exposición a cafeína dada su metabolización más lenta y su presión limítrofe.

c) Sin la variante, el acetaldehído no se acumula de forma aguda, pero el etanol sigue siendo tóxico (hígado, presión, cáncer, LDL en ε4) y la falta de rubor puede facilitar beber más.

d) Las variantes explican una fracción pequeña del riesgo y casi todas provienen de asociaciones (GWAS), no de pruebas de causalidad individual; la evidencia de que dietas guiadas por genotipo sean superiores a una dieta saludable estándar es limitada; y los reportes suelen no considerar la ascendencia de la persona.

Rúbrica 2 interpretación correcta de los cinco genotipos; 2 priorización con mecanismo; 1 argumento sobre ALDH2 normal; 1 dos limitaciones pertinentes.

Bloque 3
Bioinformática, PCR in silico e interpretación de geles

Lectura de secuencias · Gel de Alu PV92 · Ciclo de PCR · Columnas de sílice y extracción · UCSC, BLAST, Primer-BLAST · GWAS Catalog



20 %

9 reactivos

Bloque 3 · 2 pts | Opción múltiple

B3-1 · Leer una variante en la secuencia (MTHFR)

Fragmento **ilustrativo** de la secuencia codificante de *MTHFR*, en marco de lectura, con el codón 222 entre corchetes:

Referencia: `5'-… GGA [GCC] GAC …-3'`

Paciente: `5'-… GGA [GTC] GAC …-3'`

¿Qué cambio ocurre y cómo se clasifica?

A. C→T que crea un codón de paro; nonsense.

B. C→T en la segunda posición; Ala→Ala; sinónimo.

C. C→T en la segunda posición del codón; Ala→Val; missense (corresponde a C677T).

D. C→T en la primera posición del codón; Ala→Ser; missense.

B3-1 · Leer una variante en la secuencia (MTHFR)

C) C→T en la segunda posición del codón; Ala→Val; missense (corresponde a C677T).

Por qué es correcta

Correcta: GCC (Ala) → GTC (Val), cambio en la segunda base del codón: missense. Es la variante C677T: alanina 222 por valina, que vuelve termolábil a la enzima.

Por qué fallan las demás

- «Primera posición, Ala→Ser»: la primera base (G) no cambió; Ser sería TCC o AGC.
- «Sinónimo»: GTC codifica valina, no alanina.
- «Nonsense»: GTC no es codón de paro (TAA, TAG, TGA).

Bloque 3 · 3 pts

Completa cada espacio

B3-2 · Clasificar variantes en una secuencia

Marco de lectura abierto ilustrativo (los números indican la posición del nucleótido desde la A del ATG):

`5'-ATG GCT TGG CAG GAA CTG AAA TAA-3'`

Proteína: Met-Ala-Trp-Gln-Glu-Leu-Lys-Stop

Clasifica cada variante:

c.6T>C → [v1]

c.9G>A → [v2]

c.14A>T → [v3]

c.17delT → [v4]

c.10_12delCAG → [v5]

[v1] sinónima (Ala→Ala) · missense (Ala→Pro) · nonsense · indel con corrimiento del marco

[v2] nonsense (Trp→Stop) · sinónima (Trp→Trp) · missense (Trp→Cys) · indel sin corrimiento del marco

[v3] missense (Glu→Val) · sinónima (Glu→Glu) · nonsense · missense (Glu→Asp)

[v4] indel con corrimiento del marco · indel sin corrimiento del marco · sinónima · nonsense directo en ese codón

[v5] indel sin corrimiento del marco (pierde Gln) · indel con corrimiento del marco · nonsense · CNV

B3-2 · Clasificar variantes en una secuencia

[v1] sinónima (Ala→Ala)
[v2] nonsense (Trp→Stop)
[v3] missense (Glu→Val)
[v4] indel con corrimiento del marco
[v5] indel sin corrimiento del marco (pierde Gln)

Explicación

Clave: c.6T>C: GCT→GCC, ambos Ala (sinónima). c.9G>A: TGG→TGA, paro (nonsense). c.14A>T: GAA→GTA, Glu→Val (missense). c.17delT: se pierde 1 nt de CTG y se corre el marco desde el codón 6. c.10_12delCAG: se pierde el codón 4 completo (Gln) sin correr el marco.

Distractores: Ala→Pro requeriría CCT; Trp tiene un solo codón (TGG), así que no hay cambio sinónimo posible; Glu→Asp requeriría GAT o GAC; una CNV es un cambio en el número de copias de un segmento grande, no la pérdida de 3 nt.

Bloque 3 · 3 pts | Relaciona columnas

B3-3 · Lectura de gel: Alu PV92

Gel de agarosa al 2 % con productos de PCR de PV92 (alelo + con Alu ≈ 731 pb; alelo − sin Alu ≈ 416 pb). M = marcador de 100 pb. «▬» indica banda y «▬ tenue» una banda débil.

Tamaño (pb)	M	Carril 1	Carril 2	Carril 3	Carril 4	Carril 5	Carril 6
1000	▬						
≈ 730	▬ (700)	▬	▬				
500	▬						
≈ 420	▬ (400)		▬	▬		▬	
100	▬						
< 80						▬ tenue	

El carril 6 es el control sin DNA.

Asigna el genotipo o la interpretación de cada carril.

Columna A

1. Carril 1
2. Carril 2
3. Carril 3
4. Carril 4
5. Carril 5
6. Carril 6

Columna B (una opción sobra)

A) Homocigoto −/− (sin inserción)

B) Heterocigoto +/−

C) Homocigoto +/+ (inserción en ambos cromosomas)

D) Heterocigoto con dos inserciones Alu distintas

E) Control negativo correcto: confirma que no hubo contaminación

F) Homocigoto −/−; la banda menor de 80 pb son dímeros de cebador

G) Sin producto: no se puede genotipar; repetir la PCR

B3-3 · Lectura de gel: Alu PV92

1–C Carril 1 → Homocigoto +/+ (inserción en ambos cromosomas)
2–B Carril 2 → Heterocigoto +/−
3–A Carril 3 → Homocigoto −/− (sin inserción)
4–G Carril 4 → Sin producto: no se puede genotipar; repetir la PCR
5–F Carril 5 → Homocigoto −/−; la banda menor de 80 pb son dímeros de cebador
6–E Carril 6 → Control negativo correcto: confirma que no hubo contaminación

Explicación

Clave: 1 = +/+ (solo 731); 2 = +/− (731 y 416); 3 = −/− (solo 416); 4 = sin banda en una muestra: falla de extracción o de PCR, no se asigna genotipo; 5 = −/− con dímeros de cebador (artefacto de < 100 pb que no corresponde a ningún alelo); 6 = control sin DNA limpio. El distractor no tiene sentido: en un locus hay a lo sumo un sitio de inserción por cromosoma, y el gel solo muestra dos tamaños posibles.

Bloque 3 · 2 pts | Cálculo

B3-4 · Frecuencia alélica a partir del gel del grupo

El grupo completo (30 estudiantes) genotipó PV92: 12 son +/+, 10 son +/− y 8 son −/−. Calcula la frecuencia del alelo + (dos cifras decimales).

B3-4 · Frecuencia alélica a partir del gel del grupo

0.57 (se acepta ± 0.01)

Explicación

Alelos + = 2 × 12 + 10 = 34 de 60 alelos → p = 34/60 = **0.57**. Con Hardy–Weinberg se esperarían 2pq × 30 ≈ 14.7 heterocigotos y se observaron 10: hay un déficit que con n = 30 puede ser azar, pero que también podría indicar heterocigotos mal leídos (amplificación preferencial del alelo corto).

B3-5 · El ciclo térmico de la PCR

En cada ciclo, la mezcla se calienta a [p1] para separar las hebras; luego se baja a una temperatura de alineamiento que se elige [p2]; finalmente se sube a [p3], donde la [p4] extiende los cebadores en dirección [p5].

[p1] 94–95 °C · 72 °C · 55 °C · 37 °C

[p2] unos grados por debajo de la Tm de los cebadores · siempre a 72 °C · por encima de 95 °C · igual a la temperatura ambiente

[p3] 72 °C · 95 °C · 4 °C · 60 °C fijos para cualquier enzima

[p4] Taq polimerasa · transcriptasa reversa · ligasa · enzima de restricción

[p5] 5′→3′ · 3′→5′ · en ambas direcciones a la vez · del extremo 3′ del molde al 5′ del cebador

B3-5 · El ciclo térmico de la PCR

[p1] 94–95 °C
[p2] unos grados por debajo de la Tm de los cebadores
[p3] 72 °C
[p4] Taq polimerasa
[p5] 5′→3′

Explicación

Clave: 94–95 °C (desnaturalización) → alineamiento unos grados bajo la Tm de los cebadores → 72 °C, temperatura óptima de la Taq, que sintetiza 5′→3′. Si el alineamiento es demasiado bajo aparecen productos inespecíficos y dímeros; si es demasiado alto, el cebador no se une y no hay producto.

B3-6 · Columna de sílice: bind-wash-elute

El lisado se mezcla con un buffer que contiene sales caotrópicas de [s1] y se agrega [s2]; en esas condiciones el DNA se une a la sílice. Los lavados con buffer etanólico eliminan [s3]. Antes de eluir se hace un [s4], porque el etanol residual [s5]. Finalmente el DNA se eluye con [s6].

[s1] guanidina · sodio a baja concentración · magnesio · Tris

[s2] etanol · fenol · agua destilada · SDS

[s3] sales, proteínas y otros contaminantes · el DNA unido · la sílice · los cebadores de PCR

[s4] centrifugado en seco (dry spin) · lavado con agua · calentamiento a 95 °C · agregado de fenol

[s5] inhibe la PCR y dificulta la elución · mejora el rendimiento · es necesario para la elución · protege al DNA de las nucleasas

[s6] buffer de baja fuerza iónica (TE o agua, pH ≈ 8) · buffer con guanidina concentrada · etanol al 70 % · cloroformo

B3-6 · Columna de sílice: bind-wash-elute

[s1] guanidina
[s2] etanol
[s3] sales, proteínas y otros contaminantes
[s4] centrifugado en seco (dry spin)
[s5] inhibe la PCR y dificulta la elución
[s6] buffer de baja fuerza iónica (TE o agua, pH ≈ 8)

Explicación

Clave: las sales de guanidina deshidratan el DNA y rompen la capa de agua de la sílice, y el etanol favorece la unión; el lavado etanólico quita sales y proteínas sin despegar el DNA; el dry spin elimina el etanol, que inhibe la polimerasa y evita que el DNA se rehidrate; un buffer de baja fuerza iónica a pH ligeramente básico rehidrata el DNA y lo libera.

Bloque 3 · 2 pts | Opción múltiple

B3-7 · Comparar métodos de extracción

Un DNA extraído con columna de sílice da $A_{260/280}$ = 1.84 y $A_{260/230}$ = 0.55, y la PCR falla. ¿Cuál es la explicación más probable y qué harías?

A. Contaminación con proteínas; repetir con fenol-cloroformo.

B. Arrastre de sales de guanidina (absorben cerca de 230 nm) por un lavado insuficiente; repetir el lavado etanólico, hacer el dry spin y volver a eluir, o purificar con perlas SPRI.

C. Contaminación con RNA; agregar RNasa y la PCR funcionará.

D. El DNA está demasiado puro; diluirlo en agua.

B3-7 · Comparar métodos de extracción

B) Arrastre de sales de guanidina (absorben cerca de 230 nm) por un lavado insuficiente; repetir el lavado etanólico, hacer el dry spin y volver a eluir, o purificar con perlas SPRI.

Por qué es correcta

Correcta: arrastre de guanidina. Una relación 260/280 cercana a 1.8 indica poca proteína; la relación 260/230 muy baja señala sales caotrópicas u otros compuestos que absorben a 230 nm y que inhiben la polimerasa.

Por qué fallan las demás

- «Proteínas»: bajarían la relación 260/280 (por debajo de ~1.7). Fenol-cloroformo, además, añade el riesgo de arrastrar fenol (absorbe ~270 nm).
- «RNA»: subiría la relación 260/280 hacia ~2.0 y no explica el 260/230 bajo.
- «Demasiado puro»: no existe ese problema; los valores indican contaminación.

Bloque 3 · 2 pts | Opción múltiple

B3-8 · Herramientas in silico

Un equipo diseña cebadores para genotipar *ALDH2* rs671. UCSC In-Silico PCR da un producto de 214 pb en el cromosoma 12, pero Primer-BLAST con el genoma de referencia reporta además un segundo producto de 214 pb en otro cromosoma. ¿Qué interpretación y acción son correctas?

A. El segundo producto es el alelo variante de rs671.

B. Los cebadores pueden amplificar también una secuencia muy parecida (un parálogo o pseudogén); como el producto es del mismo tamaño, el gel no lo distinguiría y podría falsear el genotipo. Hay que rediseñar al menos un cebador en una región única y verificarlo con BLAST.

C. Primer-BLAST solo funciona con mRNA, así que hay que ignorarlo.

D. Ningún problema: UCSC ya confirmó el producto, así que Primer-BLAST se equivoca.

B3-8 · Herramientas in silico

B) Los cebadores pueden amplificar también una secuencia muy parecida (un parálogo o pseudogén); como el producto es del mismo tamaño, el gel no lo distinguiría y podría falsear el genotipo. Hay que rediseñar al menos un cebador en una región única y verificarlo con BLAST.

Por qué es correcta

Correcta: riesgo de amplificación inespecífica. UCSC exige coincidencia casi perfecta y puede no reportar sitios con desapareamientos; Primer-BLAST evalúa la especificidad contra todo el genoma permitiendo algunos desapareamientos.

Por qué fallan las demás

- «Primer-BLAST se equivoca»: las herramientas son complementarias; UCSC no está diseñada para buscar todos los sitios parecidos.
- «Es el alelo variante»: un SNP no se ubica en otro cromosoma; ambos alelos se amplifican en el mismo locus.
- «Solo con mRNA»: Primer-BLAST permite elegir el genoma de referencia como base de datos.

Bloque 3 · 2 pts | Opción múltiple

B3-9 · Leer el GWAS Catalog

En el GWAS Catalog, rs4988235 aparece asociado a «lactase persistence» y a niveles de calcio, con «mapped gene: *MCM6*» y $p = 3 \times 10^{-200}$. Un alumno concluye que *MCM6* codifica la lactasa y que la variante causa directamente cambios de calcio. ¿Cuál es la mejor corrección?

A. Un valor p tan pequeño prueba que el efecto es grande.

B. El alumno tiene razón: el gen asignado es siempre el gen que codifica el fenotipo.

C. El GWAS Catalog solo incluye variantes missense.

D. El «mapped gene» es el gen donde cae la variante, no necesariamente el gen efector: la variante está en un potenciador de MCM6 que regula LCT. Además, una asociación muy significativa no demuestra causalidad directa; el efecto en calcio puede ser indirecto (consumo de lácteos).

B3-9 · Leer el GWAS Catalog

D) El «mapped gene» es el gen donde cae la variante, no necesariamente el gen efector: la variante está en un potenciador de MCM6 que regula LCT. Además, una asociación muy significativa no demuestra causalidad directa; el efecto en calcio puede ser indirecto (consumo de lácteos).

Por qué es correcta

Correcta: gen asignado ≠ gen efector, y asociación ≠ causalidad. El umbral de significancia genómica es $p < 5 \times 10^{-8}$; un p muy pequeño indica alta certeza estadística (por tamaños de muestra enormes), no un efecto grande ni un mecanismo.

Por qué fallan las demás

- «Gen asignado = gen del fenotipo»: es el error que la variante de lactasa ilustra mejor.
- «p pequeño = efecto grande»: el p depende también del tamaño de muestra; el efecto se lee en el OR o beta.
- «Solo missense»: la mayoría de las variantes de GWAS son no codificantes.

Bloque 4
Cálculo químico-enzimático, capacidad antioxidante y troubleshooting

DPPH con blanco · IC_{50} · FRAP · Catalasa · SOD · Troubleshooting de laboratorio



20 %

10 reactivos

Bloque 4 · 2 pts | Cálculo

B4-1 · Porcentaje de inhibición de DPPH

Extracto de jamaica a 50 µg/mL:

Lectura	A_{517}
Control (DPPH + metanol)	0.950
Muestra + DPPH	0.512
Blanco de muestra (extracto sin DPPH)	0.037

Calcula el porcentaje de inhibición (una cifra decimal).

B4-1 · Porcentaje de inhibición de DPPH

50.0 (se acepta ± 0.5)

Explicación

A muestra corregida = 0.512 − 0.037 = 0.475. % = (0.950 − 0.475)/0.950 × 100 = **50.0 %**. Sin restar el blanco saldría 46.1 %: las antocianinas absorben cerca de 517 nm y harían parecer al extracto menos activo.

B4-2 · IC50 con tabla de absorbancias

Extracto de cáscara de granada. A_{517} del control (DPPH + metanol) = 0.880.

µg/mL	A muestra + DPPH	A blanco de muestra
10	0.681	0.012
20	0.557	0.020
40	0.405	0.035
80	0.264	0.062

Calcula el % de inhibición de cada concentración (restando el blanco) y estima la IC_{50} por interpolación lineal entre los dos puntos que rodean al 50 % (µg/mL, una cifra decimal).

B4-2 · IC50 con tabla de absorbancias

31.6 (se acepta ± 0.6)

Explicación

% corregidos: 10 → 24.0; 20 → 39.0; 40 → 58.0; 80 → 77.0. El 50 % está entre 20 y 40 µg/mL. IC_{50} = 20 + (50 − 39.0)/(58.0 − 39.0) × 20 = **31.6 µg/mL**. Sin restar el blanco se obtendría ≈ 35.4 µg/mL: el error sobreestima la IC_{50} y subestima la potencia.

B4-3 · Capacidad antioxidante por FRAP

Curva de Trolox en FRAP: $A_{593} = 0.0031 \cdot C + 0.008$ (C en µM). Se extraen 0.5 g de amaranto en 10 mL; el extracto se diluye 1:10 y da $A_{593} = 0.597$. Calcula la capacidad antioxidante en µmol de equivalentes de Trolox por gramo (µmol TE/g).

B4-3 · Capacidad antioxidante por FRAP

38.0 (se acepta ± 0.5)

Explicación

1) C = (0.597 − 0.008)/0.0031 = 190 µM en la dilución. 2) × 10 = 1,900 µM = 1.90 µmol/mL en el extracto. 3) 1.90 × 10 mL = 19 µmol en 0.5 g → **38 µmol TE/g**. En FRAP la absorbancia sube con más poder reductor.

B4-4 · Actividad específica de catalasa

Homogenado de hígado: ΔA_{240}/min = 0.0436 (tramo inicial), cubeta de cuarzo de 1 cm, volumen total 3.0 mL, volumen de muestra 0.05 mL, proteína 3.0 mg/mL. $\varepsilon_{240}(H_2O_2)$ = 43.6 $M^{-1}\,cm^{-1}$; 1 U = 1 µmol de H_2O_2 descompuesto por minuto. Calcula la actividad en U/mg de proteína.

B4-4 · Actividad específica de catalasa

20.0 (se acepta ± 0.3)

Explicación

U/mL = 0.0436/43.6 × 1000 × (3.0/0.05) = 0.001 × 1000 × 60 = 60 U/mL. Actividad específica = 60/3.0 = **20 U/mg**.

B4-5 · Unidades de SOD

Ensayo de SOD con NBT (lectura del formazán a 560 nm). Blanco (reacción completa sin muestra): ΔA/min = 0.090. Con 15 µL de muestra: ΔA/min = 0.054. Con la curva de varios volúmenes, el 50 % de inhibición se alcanza con **25 µL**. Proteína: 4.0 mg/mL. 1 U = cantidad que inhibe el 50 %. Calcula la actividad en U/mg de proteína.

B4-5 · Unidades de SOD

10.0 (se acepta ± 0.2)

Explicación

Con 15 µL la inhibición es (0.090 − 0.054)/0.090 = 40 %, pero las unidades salen del volumen que da 50 %: 1 U en 0.025 mL = 40 U/mL; 40/4.0 = **10 U/mg**. No se escala el 40 % proporcionalmente porque la relación no es lineal.

Bloque 4 · 1.5 pts | Opción múltiple

B4-6 · Inhibición negativa

Con un extracto concentrado de betabel, la absorbancia de «muestra + DPPH» a 517 nm es mayor que la del control y el cálculo da −15 % de inhibición. ¿Qué pasó?

A. El DPPH se degradó por la luz.

B. Las betalaínas del betabel absorben cerca de 517 nm y suman su color; falta restar el blanco de muestra (extracto sin DPPH), o diluir el extracto.

C. El betabel es prooxidante y genera DPPH•.

D. La IC_{50} del betabel es negativa.

B4-6 · Inhibición negativa

B) Las betalaínas del betabel absorben cerca de 517 nm y suman su color; falta restar el blanco de muestra (extracto sin DPPH), o diluir el extracto.

Por qué es correcta

Correcta: interferencia de pigmentos. Es el mismo problema de las antocianinas: el color propio del extracto se lee como si fuera DPPH• sin reaccionar.

Por qué fallan las demás

- «Genera DPPH•»: el radical solo viene del reactivo; un extracto no lo crea.
- «DPPH degradado»: bajaría la absorbancia del control, no subiría la de la muestra.
- «IC_{50} negativa»: una concentración no puede ser negativa; el resultado es un artefacto.

Bloque 4 · 1.5 pts | Opción múltiple

B4-7 · Un control que baja

Durante la sesión, la A_{517} del control de DPPH bajó de 0.92 (9:00 h) a 0.71 (11:30 h). El frasco quedó destapado junto a la ventana. ¿Qué haces?

A. El control bajó porque el metanol se contaminó con antioxidantes del laboratorio.

B. El DPPH se degradó por la luz; preparar reactivo fresco, protegerlo de la luz y leer un control junto a cada serie de muestras. Los datos calculados con el control de 0.92 para muestras leídas más tarde están sesgados.

C. Ajustar todas las muestras con el control de las 9:00 h.

D. Nada: el control no se usa en el cálculo.

B4-7 · Un control que baja

B) El DPPH se degradó por la luz; preparar reactivo fresco, protegerlo de la luz y leer un control junto a cada serie de muestras. Los datos calculados con el control de 0.92 para muestras leídas más tarde están sesgados.

Por qué es correcta

Correcta: degradación fotoquímica del DPPH. El control es el denominador del cálculo; si cambia durante la sesión, todas las inhibiciones calculadas con un control viejo quedan mal.

Por qué fallan las demás

- «No se usa»: es el término $A_{control}$ de la fórmula.
- «Usar el de las 9:00»: precisamente introduce el sesgo.
- «Metanol contaminado»: es mucho menos probable que la luz, con el frasco destapado junto a la ventana.

Bloque 4 · 1.5 pts | Opción múltiple

B4-8 · Catalasa fuera de rango

Al iniciar el ensayo de catalasa, la A_{240} inicial (antes de agregar muestra) es 1.85. ¿Cuál es la causa más probable y la corrección?

A. El H_2O_2 está demasiado concentrado o se usó una cubeta de plástico que absorbe en el UV; verificar la concentración de H_2O_2 por A_{240}, diluirlo y usar cubeta de cuarzo.

B. La catalasa ya está actuando.

C. Falta agregar más H_2O_2.

D. Es lo esperado; con más absorbancia el ensayo es más sensible.

B4-8 · Catalasa fuera de rango

A) El H_2O_2 está demasiado concentrado o se usó una cubeta de plástico que absorbe en el UV; verificar la concentración de H_2O_2 por A_{240}, diluirlo y usar cubeta de cuarzo.

Por qué es correcta

Correcta: fuera del intervalo lineal del espectrofotómetro. Por encima de ~1 de absorbancia la lectura pierde linealidad; además el plástico común absorbe a 240 nm.

Por qué fallan las demás

- «Más sensible»: a esas absorbancias la relación con la concentración ya no es lineal.
- «La catalasa ya actúa»: aún no se agregó muestra.
- «Más H_2O_2»: subiría todavía más la absorbancia.

Bloque 4 · 1.5 pts | Opción múltiple

B4-9 · ¿Cuál extracto es más potente?

Tres extractos dieron IC_{50} en DPPH: A = 18 µg/mL, B = 65 µg/mL y C = «no alcanzó 50 % a 200 µg/mL». ¿Qué conclusión es correcta?

A. B es el más potente porque su IC_{50} es mayor.

B. C es el más potente porque no se pudo medir.

C. A es el mejor antioxidante para el organismo.

D. A es el más potente en este ensayo porque necesita menos extracto para inhibir el 50 %; para C se reporta IC_{50} > 200 µg/mL, sin extrapolar.

B4-9 · ¿Cuál extracto es más potente?

D) A es el más potente en este ensayo porque necesita menos extracto para inhibir el 50 %; para C se reporta IC_{50} > 200 µg/mL, sin extrapolar.

Por qué es correcta

Correcta: menor IC_{50} = mayor potencia en el ensayo.

La IC_{50} es una concentración: cuanto menos extracto se necesita, más activo es.

Por qué fallan las demás

- «B porque es mayor»: es el error más frecuente; invierte la lógica.
- «C porque no se pudo medir»: no alcanzar 50 % indica menor actividad en ese intervalo.
- «Mejor para el organismo»: DPPH es un ensayo químico in vitro; no considera absorción ni metabolismo.

Bloque 4 · 3 pts

Selección múltiple: marca todas las correctas

B4-10 · Leer los ensayos en conjunto

Ratas con dieta alta en grasa durante 8 semanas, frente al control:

Marcador	Cambio
SOD hepática (U/mg)	↑ 55 %
Catalasa hepática (U/mg)	↓ 30 %
TBARS (MDA)	↑ 80 %
TAC sérica	↑ 20 %, con ácido úrico ↑ 45 %

Selecciona las interpretaciones bien sustentadas.

A Conviene confirmar con otra vía de eliminación de H_2O_2 (glutatión peroxidasa) antes de concluir.

B La TAC alta demuestra que la dieta alta en grasa es antioxidante.

C El aumento de TAC sérica no indica menos estrés oxidativo: el ácido úrico aporta buena parte de la TAC plasmática.

D Se produce más H_2O_2 del que se elimina; el H_2O_2 acumulado puede generar radical hidroxilo por Fenton, coherente con el aumento de TBARS.

E Más SOD significa que el estado antioxidante mejoró.

B4-10 · Leer los ensayos en conjunto

A) Conviene confirmar con otra vía de eliminación de H_2O_2 (glutatión peroxidasa) antes de concluir.
C) El aumento de TAC sérica no indica menos estrés oxidativo: el ácido úrico aporta buena parte de la TAC plasmática.
D) Se produce más H_2O_2 del que se elimina; el H_2O_2 acumulado puede generar radical hidroxilo por Fenton, coherente con el aumento de TBARS.

Explicación

Por qué son correctas: SOD alta con catalasa baja es un desbalance: cambia una especie reactiva ($O_2\bullet^-$) por otra (H_2O_2) que no se elimina; las TBARS confirman daño lipídico.

Seis ideas que más se repiten en el examen

1

Genotipo ≠ destino

Las variantes comunes cambian probabilidades; la dieta y el ambiente modulan su efecto.

2

Gen asignado ≠ gen efector

−13910 está en MCM6 pero regula LCT: lee el mecanismo, no solo la etiqueta.

3

Asociación ≠ causalidad

Un p de GWAS diminuto indica certeza estadística, no un efecto grande.

4

Resta siempre el blanco

Los pigmentos absorben cerca de 517 nm y falsean la inhibición y la IC_{50}.

5

Menor IC_{50} = más potencia

Es una concentración: cuanto menos extracto se necesita, más activo es.

6

Más enzima ≠ más salud

SOD alta con catalasa baja acumula H_2O_2; integra todos los ensayos.