

1) sea la funcion ... para $0 \leq x \leq 1$ aproxime f con un polinomio de grado 2. Grafique.

$$g(x) = (1 + x^2)^{\frac{-1}{1+x^2}} \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1$$

$$a = 0$$

$$b = 1$$

$$f_1(x) = 1 + x \quad \text{elegir función}$$

$$f_2(x) = x^2 \quad \text{funcion de grado 2.}$$

Valores de Y: Producto interno de g(x) con f1(x) y g(x) con f2(x)

$$\int_0^1 g(x)f_1(x)dx = 1.8354$$

$$\int_0^1 g(x)f_2(x)dx = 0.43927$$

Valores de Fila 1-A: Producto interno de f1(x) con f1(x) y de f1(x) con f2(x):

$$\int_0^1 f_1(x)f_1(x)dx = 2.3333$$

$$\int_0^1 f_1(x)f_2(x)dx = 0.58333$$

Valores de Fila 2-A: Producto interno de f2(x) con f1(x) y f2(x) con f2(x):

$$\int_0^1 f_2(x)f_1(x)dx = 0.58333$$

$$\int_0^1 f_2(x)f_2(x)dx = 0.2$$

Armar la matriz A y la matriz Y:

$$A = \begin{bmatrix} 2.3333 & 0.58333 \\ 0.58333 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1.8354 \\ 0.43927 \end{bmatrix}$$

Producto de la inversa de A con Y


$$X = A^{-1}Y = \begin{bmatrix} 0.877 \\ -0.36155 \end{bmatrix}$$

Entonces la funcion f(x) que aproxima mejor a g(x) en el intervalo [0,1] es:

$$f(x) = 0.877(1 + x) - 0.36155x^2$$

$$f1(x)*\text{fila1}(X) + f2(x)*\text{fila2}(X)$$

$g(x)$



$$A = \begin{bmatrix} \int_a^b f_1|f_1 & \int_a^b f_1|f_2 & \int_a^b f_1|f_3 \\ \int_a^b f_2|f_1 & \int_a^b f_2|f_2 & \int_a^b f_2|f_3 \\ \int_a^b f_3|f_1 & \int_a^b f_3|f_2 & \int_a^b f_3|f_3 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} \int_a^b f_1|f_1 \\ \int_a^b f_1|f_2 \\ \int_a^b f_1|f_3 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1}Y$$

2) Aproxime la funcion del ejercicio 1 usando los polinomios de CHEBICHEV hasta grado 2.

$$f(x) = (1 + x^2)^{-\frac{1}{1+x^2}} \quad \text{intervalo: } [0, 1]$$

$$a = 0$$

$$b = 1$$

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = x$$

$$T_2 = 2x^2 - 1$$

Inventar si no las da, desde 0 hasta el grado de dato.

!!!!Formula:

$$g(x) = \frac{1}{b-a}(2x - a - b) = \frac{1}{1-0}(2x - 0 - 1) = 2x - 1$$

1- Reemplazar $g(x)$ en los T .

$$T_{g(x)0} = 1$$

$$T_{g(x)1} = 2x - 1$$

$$T_{g(x)2} = 2(2x - 1)^2 - 1$$

2- Calcular los C . La integral va siempre de 0 a π .

$$c_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi f\left(\frac{1}{2}(b-a)\cos(\theta) + \frac{a+b}{2}\right) \cos(0\theta) d\theta = 1.1990$$

$$c_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f\left(\frac{1}{2}(b-a)\cos(\theta) + \frac{a+b}{2}\right) \cos(1\theta) d\theta = 0.22785$$


$$c_2 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f\left(\frac{1}{2}(b-a)\cos(\theta) + \frac{a+b}{2}\right) \cos(2\theta) d\theta = 6.0214 \times 10^{-3}$$

3- Hacer el polinomio h . !!Usar la formula de $h(x)$

$$h(x) = c_0(T_{g(x)0}) + c_1(T_{g(x)1}) + c_2(T_{g(x)2})$$

$$h(x) = 1.1990(1) + 0.22785(2x - 1) + 6.0214 \times 10^{-3}(2(2x - 1)^2 - 1)$$

$f(x)$



$$S = \{(1,1)(2,1)(3,2)(4,4)\}$$

$$A = \{1, x, x^2\}$$

Forma que tiene que tener el polinomio resultante:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

1- Columna 1: Reemplazamos cada valor de x con A={1}

2- Columna 2: Reemplazamos cada valor de x con A={x}

3- Columna 3: Reemplazamos cada valor de x con A={x²}

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{bmatrix}$$

4- Columna: Valores de Y en S.

$$Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

5- Calculamos la transpuesta de A

$$A, \text{ transpose: } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \end{bmatrix}$$

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \end{bmatrix}$$

Le cambiamos el nombre

!!Cuidado con el orden

6- Calculamos producto de A(transpuesta) x A:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.0 & 10.0 & 30.0 \\ 10.0 & 30.0 & 100.0 \\ 30.0 & 100.0 & 354.0 \end{bmatrix}$$

7- Calculamos producto de A(transpuesta) x Y:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8.0 \\ 25.0 \\ 87.0 \end{bmatrix}$$

8- Calculamos la inversa de C x D:

$$R = \begin{bmatrix} 4.0 & 10.0 & 30.0 \\ 10.0 & 30.0 & 100.0 \\ 30.0 & 100.0 & 354.0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 8.0 \\ 25.0 \\ 87.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.0 \\ -1.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{matrix}$$

9- Reemplazamos R con en la f(x) con los a sub n.

$$A = \{1, x, x^2\}$$

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

$$f(x) = 2 - 1.5x + 0.5x^2$$

3- Sea la ecuación diferencial de primer orden $y' = \frac{1-xy^y}{1+y^2}$ para

$$0 \leq x \leq 1 \quad y \quad y(0) = 1$$

Use el método de Newton para determinar el conjunto de puntos

$S = \{(x_i, y_i)\}_{i=0}^5$ Aproxime estos puntos con un polinomio de grado 2. Grafiqueeee.

$$y' = \frac{1-xy^y}{1+y^2} \quad \text{para} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad y \quad y(0) = 1$$

$$n = 5$$

$$h = \frac{1-0}{5} = 0.2 \quad \text{Es la distancia entre los puntos.}$$

$$x_i = a + ih$$

$$x_i = 0 + i(0.2) \quad i \text{ es la posición, multiplicar por el } h$$

$$f(x, y) = \frac{1-xy^y}{1+y^2}$$

El primer y_k , lo tenemos como dato $y(0)(x)=1(y)$

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k)$$

$$y_{k+1} = 1 + 0.2(f(0, 1)) = 1.1$$

$$y_{k+1} = 1.1 + 0.2(f(0.2, 1.1)) = 1.1361$$

$$y_{k+1} = 1.1361 + 0.2(f(0.4, 1.1361)) = 1.1146$$


$$y_{k+1} = 1.1146 + 0.2(f(0.6, 1.1146)) = 1.0407$$

$$y_{k+1} = 1.0407 + 0.2(f(0.8, 1.0407)) = 0.91925$$

| x_k | y_k |
|-------|---------|
| 0 | 1 |
| 0.2 | 1.1 |
| 0.4 | 1.1361 |
| 0.6 | 1.1146 |
| 0.8 | 1.0407 |
| 1 | 0.91925 |

Entonces:

$$S(x, y) = \{(0, 1), (0.2, 1.1), (0.4, 1.1361), (0.6, 1.1146), (0.8, 1.0407), (1, 0.91925)\}$$



Siempre respetar esas formulas...

$$u_{1,k} = hf(x_k, y_k)$$

$$u_{2,k} = hf(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{1}{2}u_{1,k})$$

$$u_{3,k} = hf(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{1}{2}u_{2,k})$$

$$u_{4,k} = hf(x_{k+1}, y_k + u_{3,k})$$

$$u_{1,1} = hf(0.2, 1.1) = 3.6124 \times 10^{-2}$$

$$u_{2,1} = hf(0.2 + \frac{h}{2}, 1.1 + \frac{1}{2}3.6124 \times 10^{-2}) = 7.3175 \times 10^{-3}$$

$$u_{3,1} = hf(0.2 + \frac{h}{2}, 1.1 + \frac{1}{2}7.3175 \times 10^{-3}) = 8.6063 \times 10^{-3}$$

$$u_{4,1} = hf(0.4, 1.1 + 8.6063 \times 10^{-3}) = -1.9027 \times 10^{-2}$$

METODO DE NEWTON

$$\frac{b-a}{n} = h$$

$$\frac{b-a}{h} = n$$

$$n(\text{sub intervalos}) = 1 \rightarrow \frac{1}{2}(x_1 - x_0)[f(x_0) + f(x_1)]$$

$$n = 2 \rightarrow \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

$$n = 3 \rightarrow \frac{3}{8}h[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$

$$n = 1 \text{ cotas} \rightarrow \frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi)$$

$$n = 2 \text{ cotas} \rightarrow \frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$$

METODO DE SIMPSON

1- Calcular la integral de la funcion en el intervalo

$$f(x) = \cos(x) \text{ para } x \in [1, 5]$$

Enunciado

$$\int_1^5 \cos(x)dx = \sin 5 - \sin 1 = -1.800$$

Integral

$$a = 1$$

$$b = 5$$

2- Calcular el h

$$h = \frac{(b-a)-5-1}{n=2} = 2$$

3- Reemplazar en la formula de acuerdo al n(dato) y con el h

$$\frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

x_0 es a, x_2 es b y x_1 tiene que

estar entre medio

$$I_2(f) = \frac{2}{3}[\cos(1) + 4\cos(3) + \cos(5)] = -2.0907$$

4- Cuando el intervalo es muy grande, la aproximacion es mala, si achicamos el intervalo $[a, b]$, la aproximacion sera mejor

Intervalo mas chico: $[1, 1.4]$

5- Integramos funcion original con el intervalo mas chico

$$\int_1^{1.4} \cos(x)dx = 0.14398$$

6- Calculamos el h nuevamente, con el intervalo mas chico

$$h = \frac{(1.4-1)}{2} = 0.2$$

7- Reemplazar en la formula de acuerdo al n(dato) y con el h nuevo

$$\frac{0.2}{3}[\cos(1) + 4\cos(1.2) + \cos(1.4)] = 0.14398$$

Para calcular las cotas tenemos que derivar a f respecto de x,

si la n es igual a 1: derivamos dos veces.

si la n es igual a 2: derivamos cuatro veces.