

# Foglio di Esercizi 4

Metodi Matematici per l'IA

17-10-2024

## Esercizio 1

Consideriamo la funzione periodica  $f(x)$  definita su  $[-\pi, \pi]$  come:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0, \\ -1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

### 1. Calcolo della Serie di Fourier

Calcola la serie di Fourier di  $f(x)$ .

### 2. Analisi della Convergenza Puntuale

Utilizzando il teorema di Dirichlet-Weierstrass, analizza se la serie di Fourier converge puntualmente a  $f(x)$  per tutti gli  $x \in [-\pi, \pi]$ .

A quale valore converge la serie in  $x = 0$ ?

### 3. Esempio di Non-Convergenza

Discuti un esempio in cui una serie di Fourier non converge puntualmente. Basandoti sul teorema di Du Bois-Reymond, mostra che esistono funzioni continue la cui serie di Fourier diverge in alcuni punti. Spiega come questo risultato si relaziona alle proprietà di convergenza delle serie di Fourier e perché alcune funzioni non rispettano la convergenza puntuale nonostante siano continue.

## Esercizio 2

Consideriamo una funzione  $f(x)$  definita e periodica su  $[-\pi, \pi]$ .

### 1. Relazione tra regolarità e decadimento dei coefficienti di Fourier

Supponiamo che  $f(x) \in C^k([-\pi, \pi])$  sia una funzione  $k$ -volte continuamente derivabile. Mostra che i coefficienti di Fourier  $c_n(f)$  della funzione soddisfano la seguente relazione asintotica:

$$c_n(f) = O\left(\frac{1}{|n|^k}\right), \quad \text{quando } |n| \rightarrow \infty.$$

Spiega come la regolarità della funzione influenza il decadimento dei coefficienti di Fourier e dimostra il risultato.

### 2. Decadimento dei coefficienti di Fourier per una funzione specifica

Considera la funzione  $f(x) = x^2$  definita su  $[-\pi, \pi]$  e periodizzata su  $\mathbb{R}$ . Calcola esplicitamente la serie di Fourier di  $f(x)$  e verifica il decadimento dei coefficienti di Fourier  $c_n(f)$ . Qual è la velocità di decadimento dei coefficienti in questo caso? Confronta questo risultato con la regolarità della funzione.

### 3. Effetto della regolarità sulla convergenza della serie

Considera la serie di Fourier:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n!}.$$

Determina se questa serie converge. Analizza la regolarità della funzione risultante e discuti come il rapido decadimento dei coefficienti di Fourier influisce sulla convergenza e sulla regolarità della funzione.

## Esercizio 3

Consideriamo una funzione periodica  $f(x)$  definita su  $[-T/2, T/2]$  e appartenente allo spazio  $L^2(T)$ , lo spazio delle funzioni quadrato-integrabili su  $T$ .

### 1. Dimostrazione del Teorema di Parseval

Dimostra che una serie di Fourier  $S_N(f)$  converge a  $f$  nello spazio  $L^2(T)$  se e solo se è soddisfatta la seguente uguaglianza:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(x)|^2 dx.$$

Questo è noto come il **Teorema di Parseval**. Spiega il significato di questa uguaglianza in termini di conservazione dell'energia e della norma  $L^2$ .

### 2. Convergenza in energia per funzioni discontinue

Sia  $f(x)$  una funzione a tratti continua su  $[-T/2, T/2]$ , ovvero una funzione che ha un numero finito di discontinuità. Mostra che, nonostante le discontinuità, la serie di Fourier converge a  $f$  nello spazio  $L^2(T)$ , anche se non converge necessariamente puntualmente. Spiega come la convergenza in  $L^2$  sia legata alla nozione di *convergenza in energia*.

### 3. Convergenza in $L^2$ per una funzione specifica

Considera la funzione  $f(x) = \sin(x)$  su  $[-\pi, \pi]$ . Calcola la norma  $L^2$  della differenza tra  $f(x)$  e la sua ridotta  $N$ -esima della serie di Fourier,  $S_N(f)$ , e mostra che questa norma tende a zero al tendere di  $N$  all'infinito:

$$\|f - S_N(f)\|_{L^2} \rightarrow 0 \quad \text{quando} \quad N \rightarrow \infty.$$

Spiega come questo risultato conferma la convergenza della serie di Fourier in  $L^2$  per  $f(x) = \sin(x)$ .