

Examen 1 - Métodos numericos
Giovanni Gamaliel López Padilla

Problema 1

Sea $f(x) : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}$ una función continua. Se dice x' es una solución de la ecuación si $f(x') = 0$. Además x' es un cero de multiplicidad $m \geq 1$ de f . Podemos escribir a f como en la ecuación 1.

$$f(x) = (x - x')^m q(x) \quad (1)$$

donde $q(x') \neq 0$.

Inciso a

Muestra que si $f \in C^1[a, b]$ tiene un cero simple en $x' \in (a, b)$, entonces $f'(x') \neq 0$.

Se tiene que $f(x)$ se puede escribir como la ecuacion 1. Como x' es un cero simple, entonces $m = 1$, por lo tanto f es:

$$f(x) = (x - x')q(x)$$

Calculando f' , se tiene que:

$$f'(x) = q(x) - (x - x')q'(x)$$

evaluando $f'(x')$, se obtiene que:

$$f'(x') = q(x')$$

como $q(x') \neq 0$, por lo tanto $f'(x') \neq 0$.

Inciso b

Se cumple que el recíproco del inciso a, es decir, si $f \in C^1[a, b]$, $x' \in (a, b)$, $f(x') = 0$ y $f'(x') \neq 0$ entonces x' es un cero simple de f . Basado en esta afirmación, muestra que si la función $f(x)$ tiene un cero x' de multiplicidad $m > 1$, entonces x' es un cero simple de la función

$$h(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} \quad (2)$$

Se tiene que f puede escribirse como la ecuación 1. Entonces, calculando su derivada se obtiene que:

$$\begin{aligned}
f'(x) &= m(x-x')^{m-1}q(x) + (x-x')^m q'(x) \\
&= (x-x')^m \left[\left(\frac{m}{x-x'} \right) q(x) + q'(x) \right] \\
&= (x-x')^m \left(\frac{mq(x) + q'(x)(x-x')}{x-x'} \right)
\end{aligned}$$

Entonces, escribiendo la ecuación 2. Se obtiene que:

$$\begin{aligned}
h(x) &= \frac{f(x)}{f'(x)} \\
&= \frac{(x-x')^m q(x)}{(x-x')^m \left(\frac{mq(x) + q'(x)(x-x')}{x-x'} \right)} \\
&= \frac{q(x)(x-x')}{mq(x) + (x-x')q'(x)}
\end{aligned}$$

Encontrando los valores para los cuales $h(x) = 0$, se obtiene que:

$$\begin{aligned}
\frac{q(x)(x-x')}{mq(x) + (x-x')q'(x)} &= 0 \\
q(x)(x-x') &= 0 \\
q(x) = 0 \quad x-x' = 0
\end{aligned}$$

En donde se obtiene que un cero de h es x' con multiplicidad 1.

Inciso c

El algoritmo de newton modificado haciendo uso de la ecuación 2 se encuentra en la carpeta [Problema_1](#).

Se uso como ejemplo la ecuación 3. En la tabla 1 se encuentran los parámetros usados para este ejemplo.

$$f(x) = e^{2x-2} - 2x + 1 \quad (3)$$

tol_x	tol_f
10^{-6}	10^{-6}

Tabla 1: Parámetros usados para el ejemplo de la ecuación 3

Los resultados para cada iteración se encuentran en la tabla 2.

Iteración	x	$ f(x) $
1	0.631487	0.215561
2	0.964490	0.002463
3	0.999589	0.000000
4	1.000000	0.000000

Tabla 2: Resultados del programa usando la ecuación 3