

Tarea 12 - Métodos numéricos
Giovanni Gamaliel López Padilla

Problema 1

Problema 2

Sea el siguiente spline cúbico:

$$f(x) = \begin{cases} f_0(x) = ax^3 + bx^2 + c(x-1) & -1 \leq x \leq 0 \\ f_1(x) = d(x-1)^2 + cx & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

- a) Determina los valores de a, b, c, d si f interpola $f(-1) = -4$ y $f(1) = 1$.

Se plantea que f es continua, entonces esta debera cumplir la siguiente condición:

$$f_0(0) = f_1(0)$$

esto es porque f_0 y f_1 son funciones que comparten $x = 0$ en su dominio. Entonces, usando esta condición con las dadas, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} -a + b - 2c &= -4 \\ c &= 1 \\ -c &= d \end{aligned}$$

Por lo tanto, se obtiene que la solución es la siguiente:

$$\begin{aligned} a &\in \mathbb{R} \\ b &= a - 2 \\ c &= 1 \\ d &= -1 \end{aligned}$$

El parámetro a se obtuvo que es un parámetro libre, entonces para observar parte de su comportamiento se evaluó con los valores de $\{-5, 0, 5, 10\}$. En la figura 1 se muestra la función f con los parámetros obtenidos.




Figura 1: Función f con varios parámetros.

- b) Determina los valores de a, b, c, d si f interpola $f'(-1) = 6$ y $f(1) = -1$.

Calculando la primer derivada de f , se obtiene lo siguiente:

$$f'(x) = \begin{cases} f'_0(x) = 3ax^2 + 2bx + c & -1 \leq x \leq 0 \\ f'_1(x) = 2d(x-1) + c & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Como f' debe de ser continua, entonces $f'_0(0) = f'_1(0)$. Contemplando las condicones dadas, entonces se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 3a - 2b + c &= 6 \\ c &= -1 \\ -2d + c &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se obtiene que la solución del sistema de ecuaciones es:

$$\begin{aligned} a &\in \mathbb{R} \\ b &= \frac{3a - 7}{2} \\ c &= -1 \\ d &= 0 \end{aligned}$$

Se obtiene que el parámetro a es un parámetro libre, entonces este puede tomar cualquier valor. Para observar su comportamiento se evaluo con los valores de $\{-5, 0, 5, 10\}$. En la figura 2 se muestra la función f con los parámetros obtenidos.




Figura 2: Función f con varios parámetros.

Problema 3

1. Problema 4

Problema 4

Implementa el algoritmo Spline Natural Cúbico y realiza la interpolación para la ecuación 1 a partir de los siguientes puntos de las ecuaciones 2 y 3.

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2} \quad (1)$$

$$x = \frac{i-8}{2} \quad i = 0, 1, 2, \dots, 16 \quad (2)$$

$$y = f(x) \quad (3)$$




Figura 3: Interpolación de la ecuación 1 dados los puntos generados con las ecuaciones 2 y 3.

Problema 4b