Tarea 2 - Análisis de datos Giovanni Gamaliel López Padilla

Problema 4

• Si A y B son independientes, A y B^c son independientes. Demuéstralo.

Se tiene que:

$$P(B^c|A) = 1 - P(B|A) \tag{1}$$

como A y B son independientes se cumple que:

$$P(B|A) = P(B)$$

entonces, la ecuación 1 puede reescribirse como:

$$P(B^c|A) = 1 - P(B|A)$$
$$= 1 - P(B)$$
$$= P(B^c)$$

por lo tanto

$$P(B^c|A) = P(B^c) \tag{2}$$

La ecuación 2 es valida unicamente si los eventos B^c y A son independientes.

■ Cierto o falso: si A y B son independientes, A^c y B^c son independientes. Demuéstralo

Calculando $P(A^c|B^c)$

$$P(A^c|B^c) = 1 - P(A|B^c) \tag{3}$$

como en el ejercicio anterior se demostro que si A y B son independientes entonces A y B^c son independientes, se tiene que

$$P(A|B^c) = P(A) \tag{4}$$

Usando la ecuación 4 en la ecuación 3 se obtiene que:

$$P(A^c|B^c) = 1 - P(A|B^c)$$
$$= 1 - P(A)$$
$$= P(A)$$

por lo tanto

$$P(A^c|B^c) = P(A) \tag{5}$$

La ecuación 5 es valido unicamente si A^c y B^c son independientes.

Problema 5

En un examen de opción múltiple, se sabe que la probabilidad que alguien sepa la respuesta correcta es 0.4. Si no sabe la respuesta, la persona elige al azar una respuesta. Cada pregunta tiene 4 posibles respuestas. Para una pregunta particular: si alguien da la respuesta correcta, ¿ cuál es la probabilidad que adivinó?

Sea A el evento que un alumno sepa la respuesta correcta y B que conteste correctamente. Entonces la información que se tiene es:

$$P(A) = 0.4$$
$$P(B|A^c) = 0.25$$

Problema 6

Tienes una bolsa con 6 pelotas rojas y 10 pelotas verdes. Eliges al azar una pelota y la sacas de la bolsa. De nuevo, eliges al azar una pelota de la bolsa (ahora con 15 pelotas). Calcula la probabilidad de obtener una pelota roja.

Problema 7

Sea X una variable aleatoria con la siguiente distribución

y $Y \sim X$ e independiente de X. Calcula P(X > 2|Y < 3) y $P(X \neq Y)$.