

Optimización de la búsqueda de parámetros atmosféricos en modelos de transferencia radiativa

- Gamaliel López-Padilla • giovannilopez9808@gmail.com

Modelos de transferencia radiativa




Figure 1: Tropospheric Ultraviolet and Visible (TUV) radiation model. [1]




Figure 2: Simple Model of the Atmospheric Radiative Transfer of Sunshine. [2]



¿Qué hacen estos
modelos?

$$\frac{dE}{dAdt} = I_\nu(\hat{k}, \vec{r}, t) \vec{k} \cdot \vec{n} d\Omega d\nu [3]$$

$$I(t) = \int_{\lambda_0}^{\lambda_i} E(\lambda, t) d\lambda \quad (1)$$

```
# Calculo de la irradiancia solar a partir de los resultados del
# modelo SMARTS
size = np.size(irradiance)
integral = irradiance[0]
for i in range(1, size):
    integral += irradiance[i]*(wavelength[i]-wavelength[i-1])
```

Figure 3: Implementación de la ecuación 1.



Mediciones in situ




Figure 4: Página web de la SEDEMA. [4]



Figure 5: Página web del SIMA. [5]




Figure 6: Mediciones de indice UV en la Ciudad de México. [4]



THANK YOU

NCAR, "Atmospheric chemistry observations & modeling." <https://www2.acom.ucar.edu/modeling/tropospheric-ultraviolet-and-visible-tuv-radiation-model>, 7 2021.

NREL, "Smarts: Simple model of the atmospheric radiative transfer of sunshine."
<https://www.nrel.gov/grid/solar-resource/smarts.html>, 7 2021.

A. Carramiñana, *Transferencia radiativa*, ch. 2, pp. 1–24.

INAOE, 8 2020.

<https://www.inaoep.mx/~alberto/cursos/radiacion/cap2.pdf>.

"Sistema de Monitoreo Atmosférico,Ciudad de México."

<http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27aKBhnml=%27&opcion=bQ==>.

SIMA, "Sistema integral de monitoreo ambiental." <http://aire.nl.gob.mx/>.