



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Mecánica clásica

Tarea 1

Nombres:

Giovanni Lopez

Ivan Pla

Matriculas:

1837522

1837515

17 de octubre de 2020

Índice

1. Resumen	2
2. Objetivo	2
3. Marco teórico	2

1. Resumen

En esta práctica se comprueba experimentalmente la relación entre la energía, la altura y el tiempo de descenso de un cuerpo esférico dispuesto sobre un plano inclinado bajo condición para movimiento de rodamiento puro.

2. Objetivo

- Determinar la relación del tiempo que tarda una esfera sólida en rodar por un riel a una altura determinada.
- Obtener la ecuación empírica y comparar la constante teórica y experimental

3. Marco teórico

Se considera un cilindro uniforme de radio R que rueda sin deslizarse sobre una superficie horizontal. Conforme el cilindro da vueltas a través de un ángulo θ , su centro de masa se mueve una distancia lineal $s = R\theta$. Por lo tanto, la rapidez traslacional del centro de masa para movimiento de rodamiento puro está dado por:

$$v_{cm} = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega \quad (1)$$

donde ω es la rapidez angular del cilindro. La ec. {1} se cumple siempre que un cilindro o esfera rueda sin deslizarse y es la *condición para movimiento de rodamiento puro*. La magnitud de la aceleración lineal del centro de masa para movimiento de rodamiento puro es

$$a_{cm} = \frac{dv_{cm}}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha \quad (2)$$

donde α es la aceleración angular del cilindro. Permaneciendo en un marco de referencia en reposo respecto a CM, el cuerpo se observará en rotación pura alrededor de CM. En ese caso, cada punto del objeto tiene la misma velocidad angular ω . Por lo tanto, la velocidad particular de cada punto viene dada por la ec. {1}, donde R varía en función de la distancia del punto con respecto a CM. Para el caso en el que el objeto no gira, sino que tiene una traslación pura, todos los puntos del objeto se mueven a velocidad constante v CM respecto a un marco de referencia externo. Resulta que en un marco de referencia externo la velocidad instantánea v de cualquier punto del objeto bajo la condición de rodamiento puro viene dada por la suma de las velocidades del mismo punto bajo los casos de rotación pura y traslación pura.

$$\begin{aligned} v_p &= R\omega - v_{cm} = v_{cm} - v_{cm} = 0 \\ v_{cm} &= 0 + v_{cm} = v_{cm} \\ v_q &= R\omega + v_{cm} = 2v_{cm} \end{aligned}$$

Referencias

- [1] F. C. Frank. On Miller–Bravais indices and four-dimensional vectors. *Acta Crystallographica*, 18(5):862–866, 1965.
- [2] Antonio De Ita and De Torre. Indices de Miller. page 74, 2002.
- [3] Lhouari Nourine and Olivier Raynaud. A fast incremental algorithm for building lattices. *Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence*, 14(2-3):217–227, 2002.