



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS**

**Tópicos de Mecánica Cuántica
Examen primer parcial
Enrique Valbuena Ordonez**

Nombre:
Giovanni Gamaliel López Padilla

Matricula:
1837522

20 de octubre de 2020

1. Obtener la ecuación de Schrödinger y su forma compleja conjugada con las ecuaciones de Euler-Lagrange.

Se tiene que la ecuación de Schrödinger normal y compleja conjugada son las siguientes:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi^*} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right)} \right). \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)} \right). \quad (2)$$

Y la densidad lagrangiana de Schrödinger es:

$$\mathcal{L} \left(\psi, \psi^*, \frac{\partial \psi}{\partial x}, \frac{\partial \psi^*}{\partial x}, \frac{\partial \psi}{\partial t}, \frac{\partial \psi^*}{\partial t}, x \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} + i\hbar \left[\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right] - V(x) \psi \psi^*. \quad (3)$$

Para calcular la ecuación de Schrödinger usando 1 con 3, calculando la parte izquierda de la ecuación 1 se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right)} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \psi}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right)} \right) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}. \end{aligned}$$

Calculando la parte derecha de la ecuación 1 se tiene lo siguiente:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi^*} = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} - V(x) \psi$$

por lo tanto, se obtiene lo siguiente:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} - V(x) \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \quad (4)$$

Para calcular la ecuación de Schrödinger usando 2 con 3, calculando la parte izquierda de la ecuación 2 se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)} \right) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2}. \end{aligned}$$

Calculando la parte derecha de la ecuación 1 se tiene lo siguiente:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi^*} = -i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} - V(x)\psi^*$$

por lo tanto, se obtiene lo siguiente:

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} - V(x)\psi^* = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \quad (5)$$

Por lo tanto, la ecuación 4 y 5 son las ecuaciones de Schrödinger normal y compleja conjugada respectivamente.

2. Demostrar que la ecuación de Schrödinger es invariante ante el grupo de transformaciones globales U(1).

Se tiene que las transformaciones U(1) estan definidas como:

$$\psi' = U\psi \equiv e^{i\theta}\psi \quad (6)$$

$$\psi'^* = U\psi^* \equiv e^{-i\theta}\psi^* \quad (7)$$

tal que $\theta \in \mathcal{R}$, entonces realizando el calculo con con la ecuación 3, se tiene que:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \left(\psi', \psi'^*, \frac{\partial \psi'}{\partial x}, \frac{\partial \psi'^*}{\partial x}, \frac{\partial \psi'}{\partial t}, \frac{\partial \psi'^*}{\partial t}, x \right) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \psi'}{\partial x} \frac{\partial \psi'^*}{\partial x} + i\hbar \left[\psi'^* \frac{\partial \psi'}{\partial t} - \psi' \frac{\partial \psi'^*}{\partial t} \right] - V(x)\psi'\psi'^* \\ &= \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial (e^{i\theta})\psi}{\partial x} \frac{\partial (e^{-i\theta})\psi^*}{\partial x} \right) + i\hbar \left[(e^{-i\theta})\psi^* \frac{\partial (e^{i\theta})\psi}{\partial t} - (e^{i\theta})\psi \frac{\partial (e^{-i\theta})\psi^*}{\partial t} \right] - V(x)e^{i\theta}\psi (e^{-i\theta})\psi^* \\ &= (e^{i\theta})(e^{-i\theta}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right) + i\hbar \left[(e^{i\theta})(e^{-i\theta})\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - (e^{i\theta})(e^{-i\theta})\psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right] - V(x)(e^{i\theta})(e^{-i\theta})\psi\psi^* \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} + i\hbar \left[\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right] - V(x)\psi\psi^* \\ &= \mathcal{L} \left(\psi, \psi^*, \frac{\partial \psi}{\partial x}, \frac{\partial \psi^*}{\partial x}, \frac{\partial \psi}{\partial t}, \frac{\partial \psi^*}{\partial t}, x \right) \end{aligned}$$

Por lo tanto, el grupo de las transformaciones U(1) deja invariante a la ecuación de Schrödinger.

3. Calcular la lagrangiana de interacción de Schrödinger en términos del cuadvivector de potencial.
4. Demostrar que la lagrangiana de interacción de Schrödinger es invariante ante transformaciones de norma
5. Calcular la ecuación de Klein-Gordon (para la partícula libre) a partir de la relación energía-momento de Einstein y las definiciones de los operadores en mecánica cuántica.

A partir de la mecánica cuántica elemental conocemos la ecuación de Schrödinger:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_0} \nabla^2 + V(x) \right] \psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} \quad (8)$$

la relación de la energía no relativista en forma de operador corresponde a lo siguiente:

$$E = -\frac{\hat{p}^2}{2m_0} + V(x) \quad (9)$$

donde:

$$\begin{aligned} \hat{p} &= i\hbar \nabla \\ \hat{E} &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \end{aligned}$$

por lo que teniendo definidos los operadores de la energía y momento podemos obtener una ecuación para la onda relativista, es por ello que consideramos a las partículas libres de modo que su relación relativista es la siguiente:

$$p^\mu p_\mu = \frac{E^2}{c^2} - p \cdot p = m_0^2 c^2 \quad (10)$$

por lo tanto, la ecuación de Klein-Gordon para las partículas libres es:

$$p^\mu p_\mu \psi = m_0^2 c^2 \psi \quad (11)$$

tomando en cuenta que:

$$p^\mu p_\mu = -\hbar^2 \frac{\partial}{\partial x_\mu} \frac{\partial}{\partial x^\mu} = -\hbar^2 \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \right) \quad (12)$$

y renombrando a:

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) = \square$$

se tiene que:

$$p^\mu p_\mu = -\hbar^2 \square$$

por lo tanto la ecuación 11 se escribe como:

$$\begin{aligned} p^\mu p_\mu \psi &= m_0^2 c^2 \psi \\ -\hbar^2 \square \psi &= m_0^2 c^2 \psi \\ \square \psi &= -\frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2} \psi \\ \left(\square + \frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi &= 0 \end{aligned}$$

por lo tanto, la ecuación de Klein-Gordon es:

$$\left(\square + \frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi = 0 \tag{13}$$

- 6. Calcular las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon (generalizada sin condiciones a la frontera).**