Question	Answer	Marks	Partial Marks
3(b)	660	**3**	**B2** for 60 or **M2** for 600 + $\frac{600\times2\times5}{100}$ oe or **M1** for $\frac{600\times2[\times5]}{100}$ oe
3(c)	1.55 or 1.549 to 1.550	**3**	**M2** for $\sqrt[12]{\frac{601.35}{500}}$ or **M1** for $500\times(...)^{12}=601.35$
3(d)(i)	26.3 or 26.25 to 26.26	**2**	**M1** for $[k]\left(\frac{100-3}{100}\right)^{10}$ oe
3(d)(ii)	23	**3**	**M2** for a correct trial evaluated with n =22 or n = 23 or **M1** for $[k]\ (0.97)^n < 0.5[k]$ oe soi or for $[k](0.97)^n = 0.5[k]$ oe soi, implied by one correct trial $n > 10$ or for $[k](0.97)^{23}$ oe seen If 0 scored **SC1** for answer 22
4(a)	72 or 72.0 cao nfww	**3**	**M2** for $\frac{x}{360}\times2\times\pi\times7.5=2\times\pi\times1.5$ oe or **M1** for $\frac{x}{360}\times2\times\pi\times7.5$ or for $2\times\pi\times1.5$ oe OR **M2** for $\frac{x}{360}\times\pi\times7.5^2=\pi\times1.5\times7.5$ oe or **M1** for $\frac{x}{360}\times\pi\times7.5^2$ or for $\pi\times1.5\times7.5$ oe
4(b)(i)	$2\times\sqrt{17^2-8^2}$ or $\sqrt{34^2-16^2}$ oe	**M2**	**M1** for $17^2=8^2+d^2$ or $34^2 = 16^2 + k^2$
4(b)(ii)	29.3 or 29.30 to 29.31	**4**	**M3** for $([\pi]\times8^2\times30)\div\frac{4}{3}\times[\pi]\times17^3$ [× 100] oe OR **M1** for $\pi\times8^2\times30$ oe **M1** for $\frac{4}{3}\times\pi\times17^3$ oe

Question	Answer	Marks	Partial Marks
4(c)	12.7 or 12.73 to 12.74	**3**	**B2** for 2.26 or 2.261 to 2.262…. soi or **M2** for $\left(20^2 \times 15 - \frac{4}{3} \times \pi \times 6^3\right) \div 20^2$ oe or for $15 - \left(\frac{4}{3} \times \pi \times 6^3 \div 20^2\right)$ oe or **M1** for $20^2 \times 15 - \frac{4}{3} \times \pi \times 6^3$ oe or $20^2 \times D = \frac{4}{3} \times \pi \times 6^3$ oe If 0 scored, **SC1** for answer 11[.0] or 10.97 to 10.98
5(a)	20	**2**	**M1** for $11x = 10(x + 2)$ oe