


Cognome	##paziente_cognome##	Nome	##paziente_nome##	Letto e stanza	##letto_ricovero ##, ##stanz_a_ricove ro##	Cartella clinica n.	##paziente_cartella##
---------	----------------------	------	-------------------	----------------	---	---------------------	-----------------------

MONITORAGGIO PIAGHE DA DECUBITO

Specifiche III° e IV° stadio

Variante lesione	Medicazione	Cadenza	
Se escara	##escara_pomate_garze ##escara_idrogeli_schiuma idrogeli - schiuma di poliuretano Rimozione Chirurgica: ##escara_rimozione_total Escara - garze	ogni 24 72 ore rinnovo pomate enzimatiche ogni 8 ore	
Alginati - garze sterili	##essud_... ogni 8:24 cre		
idrogeli - schiuma di poliuretano o Placca idrocolloidale: fibra idrocolloidale: placca	##essud_necro_fibri_schi... ##caviti_tampone_schiuma		
Se cavitaria con abbondante essudato	tamponi a schiuma di poliuretano + schiuma di poliuretano ##essud_necro_fibri_fibr... ##caviti_fibra_idro_garz... fibra idrocolloidale: -garza <i>Attenzione No garze iodoformiche</i>	da giorni alterni a 3/4 giorni a_idro_placca_i	
Se lesione granuleggiante	schiuma di poliuterano ##les_gran_placca_idr... placca idrocolloidale	1 volta alla settimana o SO	
Se lesione infetta	fibra idrocolloidale: -garza <i>Attenzione Evitare Occlusione</i> <i>Si consiglia Antibiotico sistematico</i> <i>Consulire fibrologista in Tound Care</i>	Ogni 2 ore	

Infermiere
Responsabile

##infermiere_responsabile##

Data ##data##