






MONITORAGGIO PIAGHE DA DECUBITO

* Criteri di valutazione della lesione principale: valutare inizialmente l'escara (se presente), poi il grado della lesione ed infine l'estensione.

Stadio	Detersione	Medicazione	Cadenza	Area circostante
I e II°	<div> <div></div> <div>x</div> </div> <div> <div>Soluzione fisiologica o ringer lattato</div> <div>##flittene_forare_senza_rimuovere_t</div> </div>	<div> <div></div> <div>pellicola semipermeabile trasparente di poliuretano (I°) o</div> </div> <div> <div></div> <div>idrocolloidi extra sottili (I° II°) o</div> </div> <div> <div></div> <div>schiuma di poliuretano (I°)</div> </div>	1 volta alla settimana o S0	Crema base o emolliente o all'acqua o allo zinco
Flittene	Idem	<div> <div></div> <div>forare senza rimuovere il tetto</div> </div> <div> <div>##flittene_schiuma_poliureta</div> <div><i>Attenzione Intervento aseptico</i></div> </div> <div> <div></div> <div>schiuma di poliuretano</div> </div>	1 volta alla settimana o S0	Idem
III° e IV°	Idem	Vedi Specifiche		Idem

Variente lesione	Medicazione	Cadenza
Se escara	##escara_pomate_enzimatiche ##escara_idrogeli_schiuma ##idrogeli - schiuma di poliuretano Rimozione Chirurgica: ##escara_rimozione_total ##graduale_rimozione_garz	ogni 24-72 ore rinnovo pomate enzimatiche ogni 8 ore
##alginati - garze sterili	ogni 8-24 cre	
##essud_	Ogni 24-72 ore	
##idrogeli - ##schiuma di ... poliuretano o o ##Placca idrocolloidale: ##fibra idrocolloidale_ placca_ ##essud_necro_fibri_schiu ##cavit_tampone_ schiuma idrocoll		x
Se cavitaria con abbondante essudato	##tampone a schiuma di poliuretano + ##essud_necro_fibri_fibra_idro_placca_i schiuma di poliuretano ##cavit_fibra_idro_garza ##essud_necro_fibri_placca_idr ##fibra idrocolloidale: -garza <i>Attenzione No garze iodoformiche</i>	da giorni alterni a 3/4 giorni
Se lesione granuleggiante	##schiuma di poliuterano ##les_gran_placca_idr ##les_gran_schium placca idrocolloidale	1 volta alla settimana o SO
Se lesione infetta	##fibra idrocolloidale: -garza <i>Attenzione Evitare Occlusione</i> <i>Si consiglia Antibiotico sistemico</i> <i>consultare Specialista in Tound Care</i>	Ogni 2 ore