

Mathematik II/B (WI/ET)

Blatt 3

WT 2025

Grenzwerte, Stetigkeit, Ableitungen

Einführende Bemerkungen

- Vermeiden Sie die Verwendung von Taschenrechnern oder Online-Ressourcen.

Aufgabe 3.1: Funktionenlimes

a) Gegeben sei die Funktion

$$f(x) := \frac{x^3 + |x+1| + \operatorname{sign}(x+1)}{\operatorname{sign} x}, \quad x \in D(f) := \mathbb{R}.$$

Bestimmen Sie $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow (-1)+} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow (-1)-} f(x)$.

b) Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \frac{\sinh x}{\cosh(ax)}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Bestimmen Sie $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.

Hinweise:

- Mit der zunächst als bekannt vorausgesetzten Exponentialfunktion e^x gilt

$$\sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{und} \quad \cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

- Die Signum-Funktion liefert das Vorzeichen des Argumentes:

$$\operatorname{sign}(z) = \begin{cases} +1 & , z \geq 0 \\ -1 & , z < 0 \end{cases}$$

Lösung 3.1:

a) i) Für $x > 0$ gilt $\operatorname{sign}(x) = \operatorname{sign}(1+x) = 1$ sowie $|x+1| = x+1$, damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (x^3 + x + 1 + 1) = 2.$$

ii) Für $-1 < x < 0$ gilt $\operatorname{sign}(x) = -1$, $\operatorname{sign}(1+x) = 1$ sowie $|x+1| = x+1$, damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x^3 + x + 1 + 1}{-1} = -2.$$

iii) Für $-1 < x < 0$ gilt $\operatorname{sign}(x) = -1$, $\operatorname{sign}(1+x) = 1$ sowie $|x+1| = x+1$, damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow (-1)+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)+} \frac{x^3 + x + 1 + 1}{-1} = 0.$$

iv) Für $x < -1$ gilt $\operatorname{sign}(x) = \operatorname{sign}(1+x) = -1$ sowie $|x+1| = -(x+1)$, damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow (-1)-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)-} \frac{x^3 - x - 1 - 1}{-1} = 2.$$

b) Die Funktion $f(x)$ ist eine ungerade Funktion:

$$f(-x) = \frac{\sinh(-x)}{\cosh(ax)} = \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{e^{-ax} + e^{-(-ax)}} = -\frac{e^x - e^{-x}}{e^{ax} + e^{-ax}} = -f(x)$$

Daher ist $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ und es genügt einen der beiden Grenzwerte zu berechnen.

Es wird vorausgesetzt, dass e^x stetig ist und dass gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$, somit kann man den Funktionsgrenzwert durch die Substitution $z = e^x$ bestimmen:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^{ax} + e^{-ax}} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z - \frac{1}{z}}{z^a + \frac{1}{z^a}} \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left(\frac{z}{z^a} \cdot \frac{1 - \frac{1}{z^2}}{1 + \frac{1}{z^{2a}}} \right) \end{aligned}$$

Der Grenzwert des ersten Bruches ist

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z^a} = \lim_{z \rightarrow \infty} z^{1-a} = \begin{cases} \infty, & a < 1 \\ 1, & a = 1 \\ 0, & a > 1 \end{cases}.$$

Für den zweiten Bruch hat man

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{z^2}}{1 + \frac{1}{z^{2a}}} = \begin{cases} 0, & a < 0 \\ \frac{1}{2}, & a = 0 \\ 1, & a > 0 \end{cases}.$$

Insgesamt ergibt sich daraus:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \begin{cases} \infty, & 0 \leq a < 1 \\ 1, & a = 1 \\ 0, & a > 1 \end{cases}$$

Für $a < 0$ hat man

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left(\frac{z}{z^a z^{-2a}} \cdot \frac{1 - \frac{1}{z^2}}{z^{2a} + 1} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left(\frac{z}{z^{-a}} \cdot \frac{1 - \frac{1}{z^2}}{z^{2a} + 1} \right) = \begin{cases} 0, & a < -1 \\ 1, & a = -1 \\ \infty, & -1 < a < 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

Aufgabe 3.2: Differentiation

- a) Geben Sie die Konstanten $b, c, d \in \mathbb{R}$ an, damit die Funktion

$$g(x) = \begin{cases} bx^3 + cx^2 + d & \text{für } x \leq 1 \\ \ln x & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

auf \mathbb{R} zweimal differenzierbar ist.

Ist $g(x)$ für diese Wahl auch dreimal differenzierbar?

- b) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & \text{für } x \neq 0, \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

in $x = 0$ stetig ist, aber *nicht* differenzierbar.

Hinweis: Betrachten Sie zur Untersuchung der Differenzierbarkeit die Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $x_n = \frac{1}{n\pi + \pi/2}$.

Lösung 3.2:

- a) Außerhalb des kritischen Punktes $x = 1$ hat man

$$g'(x) = \begin{cases} 3bx^2 + 2cx & \text{für } x < 1 \\ \frac{1}{x} & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

sowie

$$g''(x) = \begin{cases} 6bx + 2c & \text{für } x < 1 \\ -\frac{1}{x^2} & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

Da die Funktion zweimal differenzierbar sein soll, müssen $g(x)$ und $g'(x)$ stetig sein. Im Punkt $x = 1$ muss also gelten:

$$g(1) = b + c + d = \ln 1 = 0 \text{ und } g'(1) = 3b + 2c = \frac{1}{1} = 1.$$

Aus der zweiten Relation erhält man $c = \frac{1-3b}{2}$.

Die linksseitige zweite Ableitung im Punkt $x = 1$ ist

$$\begin{aligned} g''_-(1) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{g'(x) - g'(1)}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{3bx^2 + 2cx - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{3bx^2 + (1 - 3b)x - 1}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{3b(x^2 - x) + x - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} (3bx + 1) = 3b + 1 \end{aligned}$$

und die rechtsseitige zweite Ableitung:

$$\begin{aligned} g''_+(1) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{g'(x) - g'(1)}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{1 - x}{x(x - 1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \left(-\frac{1}{x} \right) = -1 \end{aligned}$$

Beide Grenzwerte müssen übereinstimmen, damit $g''(1)$ sinnvoll definiert ist. Also gilt

$$b = \frac{-2}{3} \Rightarrow c = \frac{3}{2} \Rightarrow d = -b - c = \frac{-5}{6}.$$

Man hat dann

$$g''(x) = \begin{cases} -4x + 3 & \text{für } x < 1 \\ -1 & \text{für } x = 1 \\ -\frac{1}{x^2} & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

Die linksseitige Ableitung dieser Funktion im Punkt $x = 1$ ist

$$\begin{aligned} g'''_-(1) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{g''(x) - g''(1)}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{-4x + 3 - (-1)}{x - 1} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{-4x + 4}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \left(-4 \frac{x - 1}{x - 1} \right) = -4 \end{aligned}$$

und die rechtsseitige Ableitung:

$$\begin{aligned} g'''_+(1) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{g''(x) - g''(1)}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{-\frac{1}{x^2} - (-1)}{x - 1} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x^2 - 1}{x^2(x - 1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x + 1}{x^2} = 2 \end{aligned}$$

Da die beiden Werte nicht übereinstimmen ($-4 \neq 2$), ist g'' im Punkt $x = 1$ nicht differenzierbar.

- b) Die Funktion ist stetig in $x = 0$, denn $|\sin(1/x)| \leq 1$ und somit ist $|f(x) - f(0)| = |f(x)| \leq |x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Der Differenzenquotient in $x_0 = 0$ ist

$$Q(x) := \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{1}{x} f(x) = \sin(1/x).$$

Dieser Ausdruck konvergiert **nicht** für $x \rightarrow 0$. Setzt man zum Beispiel $x_n = \frac{1}{n\pi + \pi/2}$, dann gilt $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ und

$$Q(x_n) = \sin(n\pi + \pi/2) = \begin{cases} +1, & \text{für gerade } n \\ -1, & \text{für ungerade } n \end{cases}$$

Aufgabe 3.3: Stetige Fortsetzung

- a) Untersuchen Sie, ob die folgenden reellen Funktionen im Punkt $x = 0$ stetig sind oder stetig fortgesetzt werden können.

$$f_1(x) = |x|, \quad f_2(x) = \frac{x}{|x|}, \quad f_3(x) = \frac{x^3}{|x|}, \quad f_4(x) = \frac{x^2}{|x|^2}$$

- b) Bestimmen Sie die Definitionslücken der Funktion

$$g(x) = \frac{2x^3 - 12x^2 + 18x}{x^3 - 9x}$$

In welchen dieser Lücken ist die Funktion stetig fortsetzbar?

Lösung 3.3:

- a) i) Sei also x_n eine beliebige Nullfolge, dann ist gemäß Funktionsdefinition

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_1(x_n) - f(0)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - 0| = 0$$

und damit auch

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_1(x) = f_1(0).$$

Also ist f_1 in $x = 0$ stetig.

- ii) Die Funktion f_2 ist in $x = 0$ nicht definiert. Um sie stetig fortzusetzen, müsste die Folge $f_2(x_n)$ für eine beliebige Nullfolge x_n konvergieren. Um dies zu widerlegen, wählen wir die Nullfolge $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$. Damit gilt:

$$f_2(x_n) = \frac{x_n}{|x_n|} = \frac{(-1)^n \cdot 1/n}{1/n} = (-1)^n.$$

Diese Folge $f_2(x_n)$ konvergiert sicher nicht. Damit ist f_2 nicht stetig fortsetzbar in $x = 0$.

- iii) Die Funktion f_3 ist ebenfalls in $x = 0$ nicht definiert, sie lässt sich jedoch durch

$$f_3(0) := 0$$

stetig fortsetzen. Sei dafür eine beliebige Nullfolge x_n . Damit gilt dann:

$$|f_3(x_n) - f_3(0)| = \left| \frac{x_n^3}{|x_n|} - 0 \right| = \frac{|x_n|^3}{|x_n|} = |x_n|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Also konvergiert die Folge $f_3(x_n)$ gegen $f_3(0)$ und die Funktion ist stetig.

- iv) Die Funktion f_4 ist nicht definiert für $x = 0$. Setzt man jedoch $f_4(0) = 1$, so erhält man $f_4(x) = 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Also hat man f_4 stetig fortgesetzt.

In den beiden Fällen f_3 und f_4 wurden die Definitionsbereiche der Funktionen durch das stetige Fortsetzen im Nullpunkt erweitert. Damit erhält man formal eine neue Funktion.

- b) Die Definitionslücken der Funktion g sind gegeben durch die Nullstellen des Nenners:

$$x^3 - 9x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x_1 = 0 \vee x_2 = 3 \vee x_3 = -3.$$

Der Zähler lässt sich schreiben als

$$2x^3 - 12x^2 + 18x = 2 \cdot (x - 0) \cdot (x - 3)^2.$$

Damit hat man dann

$$g(x) = \frac{2 \cdot (x - 0) \cdot (x - 3)^2}{(x - 0)(x - 3)(x - (-3))} = \frac{2(x - 3)}{x + 3}.$$

Man kann also die Definitionslücken $x_1 = 0$ und $x_2 = 3$ durch

$$g(0) = -2 \text{ und } g(3) = 0$$

beheben. Bei $x_3 = -3$ hat man einerseits für $y_j^- = -3 - 1/j \xrightarrow{j \rightarrow \infty} -3$:

$$g(y_j^-) = \frac{2(-3 - 1/j - 3)}{-3 - 1/j + 3} = 2 \frac{6 + 1/j}{1/j} = 12j + 2 > 2$$

und andererseits für $y_j^+ = -3 + 1/j \xrightarrow{j \rightarrow \infty} -3$:

$$g(y_j^+) = \frac{2(-3 + 1/j - 3)}{-3 + 1/j + 3} = 2 \frac{-6 + 1/j}{1/j} = -12j + 2 < -10.$$

Wenn jede einzelne dieser Folgen einen Grenzwert hätte, so würden diese wegen der Schranken 2 und -10 jedenfalls nicht übereinstimmen. Also kann man g im Punkt $x = -3$ nicht stetig fortsetzen.

Aufgabe 3.4: Grenzwerte monotoner Folgen

Es seien $a_1 = \sqrt{2}$ und $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ für $n = 1, 2, 3, \dots$. Zeigen Sie,

- a) dass (a_n) beschränkt ist,
- b) dass (a_n) monoton wächst und
- c) gegen die größte Lösung der Gleichung $x^2 - x - 2 = 0$ konvergiert.

Lösung 3.4:

- a) Null ist sicher eine untere Schranke für alle $a_n > 0$. Eine obere Schranke ist 2. Wir untersuchen dazu das Quadrat der Folge und rechnen nach, dass $a_n^2 \leq 4$ für alle $n \in \mathbb{N}$:

$$a_{n+1}^2 = 2 + a_n \stackrel{!}{\leq} 4$$

Dies ist genau dann erfüllt, wenn bereits $a_n \leq 2$ ist. Das ist für $a_1 = \sqrt{2}$ der Fall und damit auch für alle folgenden a_n .

- b) Es ist zu zeigen, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $a_n \leq a_{n+1}$.

Äquivalent dazu ist $\frac{a_{n+1}^2}{a_n^2} \geq 1$:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}^2}{a_n^2} &\geq \frac{2 + a_n}{2a_n} \quad (\text{wegen } a_n \leq 2) \\ &= \frac{1}{a_n} + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \quad (\text{wegen } a_n \leq 2) \end{aligned}$$

- c) Da a_n beschränkt und monoton ist, muss die Folge einen Grenzwert

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}$$

besitzen. Mit diesem Grenzwert ist

$$\begin{aligned} a^2 - a - 2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}^2 - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - 2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2 + a_n}^2 - a_n) - 2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 - 2 = 0 \end{aligned}$$

Damit muss a eine Nullstelle des Polynoms $p(x) = x^2 - x - 2$ sein.

$p(x)$ ist ein Polynom zweiten Grades, besitzt also zwei Nullstellen. Negative Werte nimmt $p(x)$ nur zwischen den beiden Nullstellen an. Da

$$p(a_1) = p(\sqrt{2}) = -\sqrt{2} < 0$$

ist, liegt a_1 zwischen den beiden Nullstellen. Wegen der Monotonie von (a_n) muss es sich bei a also um die größere der beiden Nullstellen handeln.

Aufgabe 3.5: Kurven im \mathbb{R}^n

Ein Satellit bewege sich auf der Bahn

$$\mathbf{r}(t) = (\sqrt{1+t^2}, 3t)^\top$$

- a) Berechnen Sie die Geschwindigkeit $\dot{\mathbf{r}}(t)$ des Satelliten.
- b) Geben Sie die Grenzwerte (für $t \rightarrow +\infty$ und für $t \rightarrow -\infty$) der Bahnrichtung r_2/r_1 und Geschwindigkeit $\dot{\mathbf{r}}$ des Satelliten an.

Lösung 3.5:

- a) Die Geschwindigkeit ist

$$\dot{\mathbf{r}}(t) = \left(\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, 3 \right)^\top.$$


- b) Es ist

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{r_2}{r_1} &= \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{3 \operatorname{sign}(t)}{\sqrt{\frac{1}{|t|^2} + 1}} = \pm 3 \end{aligned}$$

Die Bahn verläuft also asymptotisch in Richtung der beiden Geraden $\operatorname{span}\{(1, \pm 3)^\top\}$.
Für die Geschwindigkeit gilt passend dazu

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \dot{\mathbf{r}}(t) = (\pm 1, 3)^\top.$$

Der Graph zeigt die Bahnkurve des Satelliten sowie deren Asymptoten.



Aufgabe 3.6: Differenzieren

Bestimmen Sie jeweils die n -te Ableitung der folgenden Funktionen:

a) $n = 4, f(x) = 5 \sin(x) + 3 \cos(x)$

b) $n = 3, f(x) = 2 \sinh(2x) + 3 \cosh(x)$

c) $n = 2, f(x) = x^2 \sin(2x)$

d) $n = 1, f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x^2 + 2x - 3}$

e) $n = 3, f(x) = x^5 \ln(x)$

f) $n = 3, f(x) = \sin^3(x)$

g) $n = 3, f(x) = e^x \sin(x)$

h) $n = 2, f(x) = e^{\tan(x)}$

i) $n = 2, f(x) = \frac{\tan(x)}{x}$

j) $n = 2, f(x) = \frac{x^2}{\sin(x)}$

Lösung 3.6:

a)

$$f'(x) = 5 \cos(x) - 3 \sin(x)$$

$$f''(x) = -5 \sin(x) - 3 \cos(x)$$

$$f'''(x) = -5 \cos(x) + 3 \sin(x)$$

$$f''''(x) = 5 \sin(x) - 3 \cos(x)$$

b)

$$f'(x) = 4 \cosh(2x) + 3 \sinh(x)$$

$$f''(x) = 8 \sinh(2x) + 3 \cosh(x)$$

$$f'''(x) = 16 \cosh(2x) + 3 \sinh(x)$$

c)

$$f'(x) = 2x \sin(2x) + 2x^2 \cos(2x)$$

$$= 2x(\sin(2x) + x \cos(2x))$$

$$f''(x) = 2(\sin(2x) + x \cos(2x)) + 2x(2 \cos(2x) + \cos(2x) - 2x \sin(2x))$$

$$= 2 \sin(2x) + 8x \cos(2x) - 4x^2 \sin(2x)$$

d)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x-2)(x^2+2x-3) - (x^2-2x+3)(2x+2)}{(x^2+2x-3)^2} \\ &= \frac{8x^2 - 12x - 4x^2}{(x^2+2x-3)^2} \\ &= \frac{4x^2 - 12x}{(x^2+2x-3)^2} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5x^4 \ln(x) + x^5 \frac{1}{x} \\ &= 5x^4 \ln(x) + 4x^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= 20x^3 \ln(x) + 5x^4 \frac{1}{x} + 4x^3 \\ &= 20x^3 \ln(x) + 9x^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'''(x) &= 60x^2 \ln(x) + 20x^3 \frac{1}{x} + 27x^2 \\ &= 60x^2 \ln(x) + 47x^2 \end{aligned}$$

f)

$$f'(x) = 3 \sin^2(x) \cos(x)$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= 6 \sin(x) \cos(x) \cos(x) - 3 \sin^3(x) \\ &= 6 \sin(x) \cos^2(x) - 3 \sin^3(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'''(x) &= 6 \cos^3(x) - 6 \sin(x) 2 \cos(x) \sin(x) - 9 \sin^2(x) \cos(x) \\ &= 6 \cos^3(x) - 21 \sin^2(x) \cos(x) \end{aligned}$$

g)

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x \sin(x) + e^x \cos(x) \\ &= e^x (\sin(x) + \cos(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= e^x (\sin(x) + \cos(x) + \cos(x) - \sin(x)) \\ &= 2e^x \cos(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'''(x) &= e^x 2 \cos(x) - e^x 2 \sin(x) \\ &= 2e^x (\cos(x) - \sin(x)) \end{aligned}$$

h)

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= e^{\tan(x)} \frac{1}{\cos^2(x)} \\
 f''(x) &= e^{\tan(x)} \frac{1}{\cos^2(x)} \frac{1}{\cos^2(x)} + 2e^{\tan(x)} \frac{\sin(x) \cos(x)}{\cos^4(x)} \\
 &= e^{\tan(x)} \frac{1}{\cos^4(x)} + e^{\tan(x)} 2 \tan(x) \frac{1}{\cos^2(x)}
 \end{aligned}$$

i)

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{x/\cos^2(x) - \tan(x)}{x^2} \\
 &= \frac{1}{x \cos^2(x)} - \frac{\tan(x)}{x^2} \\
 f''(x) &= \frac{-\cos^2(x) + 2x \cos(x) \sin(x)}{x^2 \cos^4(x)} - \frac{x^2 \cos^2(x) - 2x \tan(x)}{x^4} \\
 &= -\frac{2}{x^2 \cos^2(x)} + \frac{2 \sin(x)}{x \cos^3(x)} + \frac{2 \tan(x)}{x^3} \\
 &= -\frac{2}{x^2 \cos^2(x)} + \frac{2 \tan(x)}{x \cos^2(x)} + \frac{2 \tan(x)}{x^3}
 \end{aligned}$$

j)

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{2x \sin(x) - x^2 \cos(x)}{\sin^2(x)} \\
 &= \frac{2x}{\sin(x)} - \frac{x^2 \cos(x)}{\sin^2(x)} \\
 f''(x) &= \frac{2 \sin(x) - 2x \cos(x)}{\sin^2(x)} - \frac{(2x \cos(x) - x^2 \sin(x)) \sin^2(x) - (x^2 \cos(x) 2 \sin(x) \cos(x))}{\sin^4(x)} \\
 &= \frac{2}{\sin(x)} - \frac{2x \cos(x)}{\sin^2(x)} - \frac{2x \cos(x)}{\sin^2(x)} + \frac{x^2}{\sin(x)} + \frac{2x^2 \cos^2(x)}{\sin^3(x)} \\
 &= \frac{2}{\sin(x)} - \frac{4x \cos(x)}{\sin^2(x)} + \frac{x^2}{\sin(x)} + \frac{2x^2 \cos^2(x)}{\sin^3(x)}
 \end{aligned}$$
