

## Mathematik II/B (WI/ET)

## Blatt 2

WT 2025

Grenzwerte, Stetigkeit, Ableitungen

### Einführende Bemerkungen

- Vermeiden Sie die Verwendung von Taschenrechnern oder Online-Ressourcen.

### Aufgabe 2.1: Funktionenlimes

a) Gegeben sei die Funktion

$$f(x) := \frac{x^3 + |x+1| + \operatorname{sign}(x+1)}{\operatorname{sign} x}, \quad x \in D(f) := \mathbb{R}.$$

Bestimmen Sie  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow (-1)+} f(x)$  und  $\lim_{x \rightarrow (-1)-} f(x)$ .

b) Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \frac{\sinh x}{\cosh(ax)}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Bestimmen Sie  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ .

#### Hinweise:

- Mit der zunächst als bekannt vorausgesetzten Exponentialfunktion  $e^x$  gilt

$$\sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{und} \quad \cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

- Die Signum-Funktion liefert das Vorzeichen des Argumentes:

$$\operatorname{sign}(z) = \begin{cases} +1 & , z \geq 0 \\ -1 & , z < 0 \end{cases}$$

### Lösung 2.1:

a) i) Für  $x > 0$  gilt  $\operatorname{sign}(x) = \operatorname{sign}(1+x) = 1$  sowie  $|x+1| = x+1$ , damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (x^3 + x + 1 + 1) = 2.$$

ii) Für  $-1 < x < 0$  gilt  $\operatorname{sign}(x) = -1$ ,  $\operatorname{sign}(1+x) = 1$  sowie  $|x+1| = x+1$ , damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x^3 + x + 1 + 1}{-1} = -2.$$

iii) Für  $-1 < x < 0$  gilt  $\operatorname{sign}(x) = -1$ ,  $\operatorname{sign}(1+x) = 1$  sowie  $|x+1| = x+1$ , damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow (-1)+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)+} \frac{x^3 + x + 1 + 1}{-1} = 0.$$

iv) Für  $x < -1$  gilt  $\operatorname{sign}(x) = \operatorname{sign}(1+x) = -1$  sowie  $|x+1| = -(x+1)$ , damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow (-1)-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)-} \frac{x^3 - x - 1 - 1}{-1} = 2.$$

b) Die Funktion  $f(x)$  ist eine ungerade Funktion:

$$f(-x) = \frac{\sinh(-x)}{\cosh(ax)} = \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{e^{-ax} + e^{-(-ax)}} = -\frac{e^x - e^{-x}}{e^{ax} + e^{-ax}} = -f(x)$$

Daher ist  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  und es genügt einen der beiden Grenzwerte zu berechnen.

Es wird vorausgesetzt, dass  $e^x$  stetig ist und dass gilt  $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$ , somit kann man den Funktionsgrenzwert durch die Substitution  $z = e^x$  bestimmen:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^{ax} + e^{-ax}} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z - \frac{1}{z}}{z^a + \frac{1}{z^a}} \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left( \frac{z}{z^a} \cdot \frac{1 - \frac{1}{z^2}}{1 + \frac{1}{z^{2a}}} \right) \end{aligned}$$

Der Grenzwert des ersten Bruches ist

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z^a} = \lim_{z \rightarrow \infty} z^{1-a} = \begin{cases} \infty, & a < 1 \\ 1, & a = 1 \\ 0, & a > 1 \end{cases}.$$

Für den zweiten Bruch hat man

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{z^2}}{1 + \frac{1}{z^{2a}}} = \begin{cases} 0, & a < 0 \\ \frac{1}{2}, & a = 0 \\ 1, & a > 0 \end{cases}.$$

Insgesamt ergibt sich daraus:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \begin{cases} \infty, & 0 \leq a < 1 \\ 1, & a = 1 \\ 0, & a > 1 \end{cases}$$

Für  $a < 0$  hat man

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left( \frac{z}{z^a z^{-2a}} \cdot \frac{1 - \frac{1}{z^2}}{z^{2a} + 1} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left( \frac{z}{z^{-a}} \cdot \frac{1 - \frac{1}{z^2}}{z^{2a} + 1} \right) = \begin{cases} 0, & a < -1 \\ 1, & a = -1 \\ \infty, & -1 < a < 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

---

## Aufgabe 2.2: Grenzwert Analyse - Definition

- a) Notieren Sie die Definition des Grenzwertes und zeigen Sie, dass die Folge  $a_n = \frac{1}{n}$  gegen den Grenzwert  $a = 0$  konvergiert.  
(Dies ist gleichbedeutend mit dem Nachweis, dass  $\forall k \in \mathbb{N}$  eine Zahl  $N \in \mathbb{R}$  existiert, so dass für alle  $n \in \mathbb{N}$  mit  $n > N$  gilt:  $|a_n - a| < 10^{-k}$ ).
- b) Berechnen Sie den Grenzwert  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  der untenstehenden Folgen und dokumentieren Sie die Rechenregel, die Sie zur Berechnung des Grenzwertes verwendet haben (Produktregel, Einschließungssatz, Produkt beschränkter Folgen, Produkt von Nullfolgen etc).

$$\text{i)} \quad a_n = \frac{n^2 + 5n}{3n^2 + 1} \quad \text{ii)} \quad a_n = \log_{10}(10n^2 - 2n) - \log_{10}(n^2 + 1)$$

$$\text{iii)} \quad a_n = \frac{(n+1)!}{n! - (n+1)!} \quad \text{iv)} \quad a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n}$$

$$\text{v)} \quad a_n = \frac{\cos n}{n} \quad \text{vi)} \quad a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$$

$$\text{vii)} \quad a_n = \frac{2^n}{n!}$$

## Lösung 2.2:

- a) Es ist zu zeigen:  $\forall k \in \mathbb{N} : \exists N \in \mathbb{R} :$

$$|n^{-1} - 0| < 10^{-k}, \forall n > N.$$

Wählen Sie  $N = 10^k$ , um die Eigenschaft zu zeigen.

- b) Im vorigen Aufgabenteil wurde gezeigt, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Mit dem Ergebnis aus a) gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0, \text{ for all } \alpha \in \mathbb{R}, \alpha > 0.$$

Des Weiteren wird die Stetigkeit der Funktionen vorausgesetzt und ausgenutzt.

- i) Teilen von Zähler und Nenner durch  $n^2$  liefert

$$\frac{1 + \frac{5}{n}}{3 + \frac{1}{n^2}}$$

Der Grenzwert des Zählers ist 1, der Grenzwert des Nenners ist 3. Somit liefert die Quotientenregel für Grenzwerte das Ergebnis  $a = \frac{1}{3}$ .

- ii)

$$\begin{aligned} \log_{10}(10n^2 - 2n) - \log_{10}(n^2 + 1) &= \log_{10} \frac{10n^2 - 2n}{n^2 + 1} \\ &= \log_{10} \frac{10 - \frac{2}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}}. \end{aligned}$$

Der Grenzwert des Arguments  $b$  des Logarithmus-Terms liefert

$$b = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10 - \frac{2}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} = 10.$$

Aufgrund der Stetigkeit der Logarithmus-Funktionen innerhalb ihres Definitionsbereichs auf  $x > 0$ , berechnet sich der Grenzwert zu

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \log_{10} b_n = \log_{10} b = 1.$$

- iii) Umformung des Bruchausdrucks liefert

$$\frac{(n+1)!}{n! - (n+1)!} = \frac{(n+1)n!}{n! - (n+1)n!} = \frac{(n+1)}{-n} = -(1 + \frac{1}{n}).$$

Unter Verwendung der Summenregel ergibt sich der Grenzwert

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n! - (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} -(1 + \frac{1}{n}) = -1.$$

- iv) Es gilt

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n} = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^3$$

Der Grenzwert der Folge  $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  ist genau die Eulersche Zahl  $e$ .

$$b = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Die Produktregel liefert dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b^3 = e^3.$$

Alternativ kann auch die Stetigkeit der Funktion  $x^3$  ausgenutzt werden, um das Ergebnis zu erhalten.

v) Die Folge

$$a_n = \frac{\cos n}{n}$$

kann als Produkt  $a_n = b_n c_n$  einer beschränkten Teilfolge  $b_n = \cos n \neq 0$  und einer Nullfolge  $c_n = \frac{1}{n}$  aufgefasst werden. Entsprechend ist deren Produkt ebenfalls eine Nullfolge und der Grenzwert ist  $a = 0$ .

vi) Es gilt

$$\begin{aligned} \sqrt{n+1} - \sqrt{n} &= \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{1}{n}}}. \end{aligned}$$

Unter Verwendung der Produkt und Additionsregel erhalten wir den Grenzwert  $a = 0$ .

vii) Die Folge  $a_n = \frac{2^n}{n!}$  kann für  $n > 3$  nach oben und unten beschränkt werden

$$0 \leq \frac{2^n}{n!} = \frac{\overbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \dots 2}^n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} \leq \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{2} \cdot \underbrace{\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{4} \dots \frac{2}{n-1}}_{\leq 1} \cdot \frac{2}{n} \leq \frac{4}{n}.$$

Da die Folge von oben und unten durch zwei Nullfolge beschränkt ist, erhält man mit dem Einschließungssatz den Grenzwert  $a = 0$ .

---

### Aufgabe 2.3: Folgenkonvergenz

Untersuchen Sie die nachfolgenden Folgen auf Konvergenz und bestimmen Sie – wenn möglich – den Grenzwert:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2n^2 + 3n}{2n^2 + 7} & b_n &= \frac{2n^3 - 2}{5n^2 - 1} \\ c_n &= \frac{2n^2 + 7n + (-1)^n}{5n + 2} - \frac{2n^3 - 2}{5n^2 - 1}, & d_n &= \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n \\ e_n &= n \left(\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1}\right) & f_n &= \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \text{ (mit ganzzahligem } x) \\ g_n &= \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n+1} \end{aligned}$$

#### Hinweise:

- Setzen Sie voraus, dass  $f_n$  konvergiert und ermitteln Sie den Grenzwert.
- Benutzen Sie zur Untersuchung von  $g_n$  das Ergebnis für  $f_n$ .

#### Lösung 2.3:

- a) Der Bruch wird zunächst mit dem Kehrwert der höchsten auftretenden  $n$ -Potenz ( $1/n^2$ ) erweitert:

$$a_n = \frac{2 + \frac{3}{n}}{2 + \frac{7}{n^2}}$$

Die beiden Ausdrücke  $\frac{3}{n}$  und  $\frac{7}{n^2}$ , die noch von  $n$  abhängen, konvergieren beide gegen Null, damit konvergieren Zähler und Nenner jeweils gegen 2 und man hat insgesamt:

$$a_n = \frac{2 + \frac{3}{n}}{2 + \frac{7}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n}}{2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7}{n^2}} = \frac{2 + 0}{2 + 0} = 1.$$

- b) Da die  $n$ -Potenz des Zählers größer als die des Nenners ist, nehmen wir an, dass  $b_n$  divergiert. Um dies zu zeigen, schätzen wir ab:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2n^3 - 2}{5n^2 - 1} = \frac{\frac{2}{5}(5n^2 - 1)n + \frac{2}{5} \cdot n - 2}{5n^2 - 1} = \frac{2}{5}n + \underbrace{\frac{2n - 10}{25n^2 - 5}}_{\geq 0 \text{ für } n \geq 5} \\ &\geq \frac{2}{5}n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \end{aligned}$$

Also ist  $b_n$  größer als die divergente Folge  $\frac{2}{5}n$  und divergiert ebenfalls.

- c) Der Ausdruck für  $c_n$  wird zunächst auf einen Bruchstrich gebracht und dann mit dem Kehrwert der höchsten  $n$ -Potenz ( $1/n^3$ ) erweitert:

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{(2n^2 + 7n + (-1)^n)(5n^2 - 1) - (2n^3 - 2)(5n + 2)}{(5n + 2)(5n^2 - 1)} \\ &= \frac{31n^3 + (5 \cdot (-1)^n - 2)n^2 + 3n - (-1)^n + 4}{25n^3 + 10n^2 - 5n - 2} \\ &= \frac{31 + \frac{5 \cdot (-1)^n - 2}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{4 - (-1)^n}{n^3}}{25 + \frac{10}{n} - \frac{5}{n^2} - \frac{2}{n^3}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{31}{25} \end{aligned}$$

Alle Ausdrücke, die noch von  $n$  abhängen, haben die Form  $\frac{z}{n^l}$ , wobei  $z$  entweder konstant oder zumindest beschränkt ist, deswegen konvergieren diese Ausdrücke  $z/n^l$  gegen Null.

Bringt man beide Ausdrücke nicht auf einen Hauptnenner, kann man nichts weiter über die Konvergenzeigenschaften sagen, da die einzelnen Brüche divergieren. (siehe  $b_n$ )

- d) Wir zeigen, dass  $d_n$  durch eine divergente Folge nach unten abgeschätzt werden kann und folgern die Divergenz von  $d_n$ : Für  $n \geq 2$  gilt

$$\begin{aligned} d_n &= \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{n-2} \\ &= \left(1 + \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{n-3} \\ &= \left(1 + \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{2}{n} + \frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{n-3} \\ &= \left(1 + \frac{3}{\sqrt{n}} + \dots\right) \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{n-3} \\ &\geq 1 + \frac{n}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Die Ungleichung gilt, da die wegfallenden Summanden auf jeden Fall positiv sind, also kann man abschätzen:

$$d_n \geq 1 + \frac{n}{\sqrt{n}} = 1 + \sqrt{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

Damit muss auch für  $d_n$  gelten  $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \infty$ .

- e) Wir erweitern den Ausdruck für die Folge  $e_n$  mit  $(\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1})$  um die

dritte binomische Formel anzuwenden:

$$e_n = \frac{n(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1})(\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1})}{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1}} = \frac{n(\sqrt{n^2+1}^2 - \sqrt{n^2-1}^2)}{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1}}$$

$$= \frac{n(n^2+1 - n^2+1)}{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1}} = \frac{2n}{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1}}$$

Erweitern mit dem Kehrwert der höchsten  $n$ -Potenz  $\frac{1}{n}$  liefert nun

$$e_n = \frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}} + \sqrt{1-\frac{1}{n^2}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{1+1} = 1.$$

f) Im ersten Schritt werden nur  $x > 0$  zugelassen.

Der Vollständigkeit halber überprüfen wir zunächst als Ergänzung der Aufgabenstellung, dass die Folge  $f_n$  konvergiert, dies geschieht in zwei Schritten und unter Nutzung der Bernoulli-Ungleichung

$$(1+y)^m \geq 1+my \quad \text{für } m \in \mathbb{N} \text{ und } y \geq -1$$

i) Die Folge  $f_n$  steigt monoton:

$$\frac{f_{n+1}}{f_n} = \frac{\left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} = \left(\frac{1 + \frac{x}{n+1}}{1 + \frac{x}{n}}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

$$= \left(1 + \frac{-\frac{x}{n} + \frac{x}{n+1}}{1 + \frac{x}{n}}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{x}{n}\right) = \left(1 + \frac{-x}{(n+x)(n+1)}\right)^{n+1} \cdot \frac{n+x}{n}$$

$$\geq \left(1 + (n+1) \cdot \frac{-x}{(n+x)(n+1)}\right) \cdot \frac{n+x}{n} \quad (\text{Bernoulli-Ungleichung})$$

$$= \frac{n+x-x}{n+x} \cdot \frac{n+x}{n} = 1$$

$$\Rightarrow f_{n+1} \geq f_n$$

ii) Die Folge  $f_n$  ist beschränkt:

Wegen der Monotonie muss lediglich gezeigt werden, dass  $f_n$  eine obere

Schranke besitzt:

$$1 + \frac{x}{n} < 1 + \frac{2x}{n}$$

$$\leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2x} \quad (\text{Bernoulli-Ungleichung})$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2x \cdot n}$$

$$= \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^{2x} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{2x}$$

Damit ist  $f_n$  begrenzt durch eine konvergente Folge und somit selbst auch beschränkt.

Als beschränkte, monotone Folge muss  $f_n$  auch konvergieren.

Für  $x > 0$  lässt sich  $f_n$  umformen zu

$$f_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \left(\left(1 + \frac{1}{n/x}\right)^{n/x}\right)^x$$

$f_n$  hat mit  $n_k = k \cdot x$  die konvergente Teilfolge

$$f_{n_k} = \left(\left(1 + \frac{1}{k \cdot x/x}\right)^{kx/x}\right)^x = \left(\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k\right)^x \xrightarrow{k \rightarrow \infty} e^x.$$

Wenn also  $f_n$  konvergiert muss der Grenzwert mit dem der Teilfolge übereinstimmen und es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = e^x.$$

Der Fall negativer  $x < 0$  lässt sich mit Hilfe des Falls  $x > 0$  behandeln: Wir untersuchen dazu mit  $y = -x > 0$  die Folge

$$h_n := f_n \cdot \left(1 + \frac{y}{n}\right)^n = \left(\left(1 - \frac{y}{n}\right) \left(1 + \frac{y}{n}\right)\right)^n = \left(1 - \frac{y^2}{n^2}\right)^n.$$

Es gilt einerseits  $h_n < 1$ . Andererseits liefert die Bernoulli-Ungleichung zumindest für  $n > y$ :

$$h_n \geq 1 - n \cdot \frac{y^2}{n^2} = 1 - \frac{y^2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Wegen dieser beiden Ungleichungen muss  $h_n$  konvergieren:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 1.$$

Nach Definition von  $h_n$  ist

$$f_n = \frac{h_n}{\left(1 + \frac{y}{n}\right)^n}.$$

Zähler und Nenner dieses Ausdruckes konvergieren und somit konvergiert auch  $f_n$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} h_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{y}{n}\right)^n} = \frac{1}{e^y} = e^{-y} = e^x.$$

Für  $x = 0$  hat man ohnehin

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1^n = 1 = e^0.$$

Es gilt also für alle  $x \in \mathbb{Z}$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = e^x.$$

g) Es ist

$$g_n = \left(\frac{n+1-2}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{-2}{n+1}\right)^{n+1}.$$

Also ist  $g_n = f_{n+1}$  mit  $x = -2$  und es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = e^{-2}.$$

---

#### Aufgabe 2.4: Ableitungen

Berechnen Sie die erste Ableitung der folgenden Funktionen

a)  $f(x) = x^x$

b)  $g(x) = x^{3^x}$

c)  $h(x) = x^{\cos(x)}$

#### Lösung 2.4:

Wir nutzen die folgende Identität:

$$a^b = e^{b \ln(a)} .$$

a) Wir schreiben zunächst:

$$f(x) = e^{x \ln(x)}$$

Mit der Ketten- und der Produktregel erhalten wir die Ableitung

$$f'(x) = x^x (\ln(x) + 1)$$

b) Wir schreiben  $g(x)$  als:

$$g(x) = e^{e^{x \ln(3)} \ln(x)}$$

Mit der Ketten- und der Produktregel erhalten wir die Ableitung

$$g'(x) = x^{3^x} \left( \ln(3) 3^x \ln(x) + \frac{3^x}{x} \right)$$

c) Wir schreiben  $h(x)$  als:

$$h(x) = e^{\cos(x) \ln(x)}$$

Mit der Ketten- und Produktregel erhalten wir die Ableitung

$$h'(x) = x^{\cos(x)} \left( \frac{\cos(x)}{x} - \ln(x) \sin(x) \right)$$

---



### Aufgabe 2.5: Differenzieren

- a) Bestimmen Sie jeweils die erste Ableitung. (Eventuell notwendige Beschränkungen des Definitionsgebietes sind nicht angegeben.)

$$\begin{aligned} f_9(t) &= \sinh(t) - \cosh(2t), & f_{10}(t) &= (t-3)^4 \sinh(t), \\ f_{11}(t) &= t^2 e^{-2t} \sin(3t), & f_{12}(t) &= \sqrt{t} e^{2t}, \\ f_{13}(t) &= \sin^3(e^{2t^2} + t^5), & f_{14}(t) &= \sqrt{2t^2 + 1}, \\ f_{15}(t) &= \ln(t) - \ln(5t), & f_{16}(t) &= \ln(t^2) - \ln(t^5). \end{aligned}$$

- b) Bestimmen Sie die  $n$ -te Ableitung folgender Funktionen.

$$\begin{aligned} f_{21}(t) &= \sin(3t), & f_{22}(t) &= t e^{2t} \\ f_{23}(t) &= t \cdot \cos(t), & f_{24}(t) &= t \ln(2t) \end{aligned}$$

### Lösung 2.5:

- a)

$$\begin{aligned} f'_9(t) &= \cosh(t) - 2 \sinh(2t) \\ f'_{10}(t) &= 4(t-3)^3 \sinh(t) + (t-3)^4 \cosh(t) \\ f'_{11}(t) &= 2te^{-2t} \sin(3t) + t^2(-2e^{-2t}) \sin(3t) + t^2 e^{-2t} \cdot 3 \cos(3t) \\ &= te^{-2t} (2(1-t) \sin(3t) + 3t \cos(3t)) \\ f'_{12}(t) &= \frac{1}{2\sqrt{t}} e^{2t} + \sqrt{t} \cdot 2e^{2t} = \frac{1+4t}{2\sqrt{t}} e^{2t} \\ f'_{13}(t) &= 3 \sin^2(e^{2t^2} + t^5) \cdot \cos(e^{2t^2} + t^5) \cdot (4te^{2t^2} + 5t^4) \\ f'_{14}(t) &= \frac{4t}{2\sqrt{2t^2 + 1}} \\ f'_{15}(t) &= \frac{1}{t} - \frac{5}{5t} = 0 \\ f'_{16}(t) &= \frac{d}{dt}(\ln(t^2) - \ln(t^5)) = \frac{d}{dt}(2 \ln t - 5 \ln t) = \frac{-3}{t} \end{aligned}$$

- b) i) Jedes Ableiten der Funktion  $f_{21}$  führt wegen der inneren Ableitung aus der Kettenregel zu einem Faktor 3. Außerdem ergibt jedes zweite Ableiten der äußeren Funktion (immer die Ableitung einer cos-Funktion) einen weiteren Faktor  $(-1)$ . Die äußere Funktion wird nach gradzahligem Ableiten zu einem

Sinus, bei ungradzahligen Ableitungen zu einem Kosinus. Insgesamt ergibt sich also:

$$f_{21}^{(n)}(t) = \begin{cases} 3^n \sin(3t) & \text{für } n = 4k + 0 \ (k \in \mathbb{N}_0) \\ 3^n \cos(3t) & \text{für } n = 4k + 1 \ (k \in \mathbb{N}_0) \\ -3^n \sin(3t) & \text{für } n = 4k + 2 \ (k \in \mathbb{N}_0) \\ -3^n \cos(3t) & \text{für } n = 4k + 3 \ (k \in \mathbb{N}_0) \end{cases}$$

- ii) Die erste Ableitung von  $f_{22}$  ist

$$f'_{22}(t) = e^{2t} + 2te^{2t} = e^{2t} + 2f_{22}(t).$$

Setzt man dies sukzessive fort, ergibt sich

$$\begin{aligned} f_{22}^{(n)}(t) &= n \cdot 2^{n-1} e^{2t} + 2^n f_{22}(t) \\ &= (n \cdot 2^{n-1} + 2^n \cdot t) e^{2t} = (n + 2t) 2^{n-1} e^{2t} \end{aligned}$$

- iii) Die ersten vier Ableitungen von  $f_{23}$  sind:

$$\begin{aligned} f_{23}(t) &= t \cdot \cos(t), & f'_{23}(t) &= \cos(t) - t \sin(t) \\ f''_{23}(t) &= -2 \sin(t) - t \cos(t), & f'''_{23}(t) &= -3 \cos(t) + t \sin(t), \\ f_{23}^{(4)}(t) &= 4 \sin(t) + t \cos(t), & f_{23}^{(5)}(t) &= 5 \cos(t) - t \sin(t) \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich für  $n \geq 1$ :

$$f_{23}^{(n)}(t) = \begin{cases} +n \cos(t) - t \sin(t) & \text{für } n = 4k + 1 \ (k \in \mathbb{N}_0) \\ -n \sin(t) - t \cos(t) & \text{für } n = 4k + 2 \ (k \in \mathbb{N}_0) \\ -n \cos(t) + t \sin(t) & \text{für } n = 4k + 3 \ (k \in \mathbb{N}_0) \\ +n \sin(t) + t \cos(t) & \text{für } n = 4k + 4 \ (k \in \mathbb{N}_0) \end{cases}.$$

- iv) Die ersten beiden Ableitungen von  $f_{24}$  sind

$$\begin{aligned} f'_{24}(t) &= \ln(2t) + t \cdot \frac{2}{2t} = \ln(2t) + 1 \\ f''_{24}(t) &= \frac{1}{t}. \end{aligned}$$

Alle weiteren Ableitungen ( $n = 2, 3, \dots$ ) ergeben sich zu

$$f_{24}^{(n)}(t) = (-1) \cdot (-2) \cdot \dots \cdot (-(n-2)) t^{-(n-1)} = (-1)^n (n-2)! t^{-(n-1)}.$$

## Aufgabe 2.6: Differentiation

- a) Geben Sie die Konstanten  $b, c, d \in \mathbb{R}$  an, damit die Funktion

$$g(x) = \begin{cases} bx^3 + cx^2 + d & \text{für } x \leq 1 \\ \ln x & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

auf  $\mathbb{R}$  zweimal differenzierbar ist.

Ist  $g(x)$  für diese Wahl auch dreimal differenzierbar?

- b) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & \text{für } x \neq 0, \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

in  $x = 0$  stetig ist, aber *nicht* differenzierbar.

**Hinweis:** Betrachten Sie zur Untersuchung der Differenzierbarkeit die Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  mit  $x_n = \frac{1}{n\pi + \pi/2}$ .

## Lösung 2.6:

- a) Außerhalb des kritischen Punktes  $x = 1$  hat man

$$g'(x) = \begin{cases} 3bx^2 + 2cx & \text{für } x < 1 \\ \frac{1}{x} & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

sowie

$$g''(x) = \begin{cases} 6bx + 2c & \text{für } x < 1 \\ -\frac{1}{x^2} & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

Da die Funktion zweimal differenzierbar sein soll, müssen  $g(x)$  und  $g'(x)$  stetig sein, im Punkt  $x = 1$  muss also gelten:

$$g(1) = b + c + d = \ln 1 = 0 \text{ und } g'(1) = 3b + 2c = \frac{1}{1} = 1.$$

Aus der zweiten Relation erhält man  $c = \frac{1-3b}{2}$ .

Die linksseitige zweite Ableitung im Punkt  $x = 1$  ist

$$\begin{aligned} g''_-(1) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{g'(x) - g'(1)}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{3bx^2 + 2cx - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{3bx^2 + (1 - 3b)x - 1}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{3b(x^2 - x) + x - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} (3bx + 1) = 3b + 1 \end{aligned}$$

und die rechtsseitige zweite Ableitung:

$$\begin{aligned} g''_+(1) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{g'(x) - g'(1)}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{1 - x}{x(x - 1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \left( -\frac{1}{x} \right) = -1 \end{aligned}$$

Beide Grenzwerte müssen übereinstimmen, damit  $g''(1)$  sinnvoll definiert ist, also gilt

$$b = \frac{-2}{3} \Rightarrow c = \frac{3}{2} \Rightarrow d = -b - c = \frac{-5}{6}.$$

Man hat dann

$$g''(x) = \begin{cases} -4x + 3 & \text{für } x < 1 \\ -1 & \text{für } x = 1 \\ -\frac{1}{x^2} & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

Die linksseitige Ableitung dieser Funktion im Punkt  $x = 1$  ist

$$\begin{aligned} g'''_-(1) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{g''(x) - g''(1)}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{-4x + 3 - (-1)}{x - 1} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{-4x + 4}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \left( -4 \frac{x - 1}{x - 1} \right) = -4 \end{aligned}$$

und die rechtsseitige Ableitung:

$$\begin{aligned} g'''_+(1) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{g''(x) - g''(1)}{x - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{-\frac{1}{x^2} - (-1)}{x - 1} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x^2 - 1}{x^2(x - 1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x + 1}{x^2} = 2 \end{aligned}$$

Da die beiden Werte nicht übereinstimmen ( $-4 \neq 2$ ), ist  $g''$  im Punkt  $x = 1$  nicht differenzierbar.

- b) Die Funktion ist stetig in  $x = 0$ , denn  $|\sin(1/x)| \leq 1$  und somit ist  $|f(x) - f(0)| = |f(x)| \leq |x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ .

Der Differenzenquotient in  $x_0 = 0$  ist

$$Q(x) := \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{1}{x} f(x) = \sin(1/x).$$

Dieser Ausdruck konvergiert **nicht** für  $x \rightarrow 0$ . Setzt man zum Beispiel  $x_n = \frac{1}{n\pi + \pi/2}$ , dann gilt  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  und

$$Q(x_n) = \sin(n\pi + \pi/2) = \begin{cases} +1, & \text{für gerade } n \\ -1, & \text{für ungerade } n \end{cases}$$

---

---

**Ergebnisse zu Aufgabe 2.1:**

a)  $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x) = \pm 2, \lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x) = 1 \pm (-1)$

b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \begin{cases} 0, & |a| > 1 \\ 1, & |a| = 1 \\ \infty, & |a| < 1 \end{cases}$

**Ergebnisse zu Aufgabe 2.2:**

b)

i)  $a = \frac{1}{3}$

ii)  $a = 1$

iii)  $a = -1$

iv)  $a = e^3$

v)  $a = 0$

vi)  $a = 0$

vii)  $a = 0$

**Ergebnisse zu Aufgabe 2.3:**

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1, b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty, c_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{31}{25}, d_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty, e_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1, f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^x,$$

**Ergebnisse zu Aufgabe 2.4:**

- $f'(x) = x^x (\ln(x) + 1)$
- $g'(x) = x^{3^x} \left( \ln(3) 3^x \ln(x) + \frac{3^x}{x} \right)$
- $h'(x) = x^{\cos(x)} \left( \frac{\cos(x)}{x} - \ln(x) \sin(x) \right)$

**Ergebnisse zu Aufgabe 2.5:**

a)  $f'_9(2) \approx -50.818, f'_{10}(2) \approx -10.745, f'_{11}(2) \approx 0.2315, f'_{12}(2) \approx 173.73, f'_{13}(2) \approx -2039.7,$

$f'_{14}(2) = 4/3, f'_{15}(2) = 0, f'_{16}(2) = -3/2$

b)  $f_{22}^{(n)}(t) = (n+2t)2^{n-1}e^{2t}, f_{24}^{(n)}(t) = (-1)^n(n-2)!t^{-(n-1)}.$

**Ergebnisse zu Aufgabe 2.6:**

a)  $b = -\frac{2}{3}, c = \frac{3}{2}, d = -\frac{5}{6}$