

## Mathematik II

WT 2024

## Blatt 1

Definitheit, Ähnlichkeit

### Einführende Bemerkungen

- Vermeiden Sie die Verwendung von Taschenrechnern oder Online-Ressourcen.
- Die mit einem Stern \*) markierten (Teil-)Aufgaben entfallen in diesem Trimester. Stattdessen werden einzelne Online-Aufgaben im ILIAS-Kurs kenntlich gemacht, zu denen Sie dort Ihre Lösungswege zur Korrektur hochladen können.

### Aufgabe 1.1\*\*: Positive Definitheit

Welche der folgenden Matrizen ist positiv definit?

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & \text{b)} & \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ \text{c)} & \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} & \text{d)} & \mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 1 & 1 + \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\lambda \in \mathbb{R}) \end{array}$$

### Aufgabe 1.2\*: Lineare Abbildung im Komplexen

Gegeben ist die lineare Abbildung  $L: \mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^3$  mit der Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 1 & i \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2i & i & 2i-1 \end{pmatrix}$$

sowie der Vektor  $\mathbf{b}_\lambda = (\lambda - i, 0, -2i)^\top$ .

- a) Geben Sie Rang( $\mathbf{A}$ ) und Orthonormalbasen von Bild $\mathbf{A}$  sowie Kern $\mathbf{A}$  und  $(\text{Bild}\mathbf{A})^\perp$  an.

### Hinweise:

- Der Orthogonalraum  $U^\perp$  eines Unterraumes  $U \subset \mathbb{C}^n$  enthält alle Vektoren, die senkrecht zu allen Vektoren aus  $U$  sind:

$$U^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = 0 \text{ für alle } \mathbf{u} \in U\}$$

- Im Komplexen gilt  $(\text{Bild}\mathbf{A})^\perp = \text{Kern}(\mathbf{A}^*)$ .

- b) Für welche  $\lambda \in \mathbb{C}$  ist  $\mathbf{b}_\lambda \in \text{Bild}\mathbf{A}$  enthalten?
- c) Geben Sie für beliebige  $\lambda \in \mathbb{C}$  eine Zerlegung von  $\mathbf{b}_\lambda$  in Komponenten aus Bild $\mathbf{A}$  und  $(\text{Bild}\mathbf{A})^\perp$  an.
- d) Bestimmen Sie alle  $\mathbf{x}_\lambda \in \mathbb{C}^4$ , so dass  $\mathbf{A}\mathbf{x}_\lambda$  die orthogonale Projektion von  $\mathbf{b}_\lambda$  auf Bild $\mathbf{A}$  ist.

### Aufgabe 1.3: Determinanten

Bestimmen Sie die Determinante der folgenden Matrix mit Hilfe des Gauß'schen Algorithmus:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 & 0 \\ -3 & -6 & -4 & 7 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & -5 & 2 \\ -3 & -8 & -2 & 7 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

### Aufgabe 1.4: Determinanten

Bestimmen Sie die Determinanten folgender Matrizen:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 3 & 0 & 2 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 5 & 0 & 3 \end{pmatrix}, & \text{b)} & \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -7 & 8 & 3 \\ 3 & -4 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \\ \text{c)} & \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & -1 \\ -5 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \text{d)} & \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 7 & 7 \\ 4 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}. \end{array}$$

### Aufgabe 1.5: Ähnlichkeitstransformation

Gegeben sind

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \\ -1 \end{pmatrix} \text{ und } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \beta \\ -\beta \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie – wenn möglich –  $\alpha$  und  $\beta$  so, dass  $\mathbf{a}$  und  $\mathbf{b}$  Eigenvektoren der Matrix  $\mathbf{A}$  sind.
- b) Berechnen Sie einen weiteren (linear unabhängigen) Eigenvektor nebst zugehörigem Eigenwert.
- c) Bestimmen Sie orthogonale Matrizen  $\mathbf{Q}_i$ , sowie Diagonalmatrizen  $\mathbf{D}_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ), so dass gilt

$$\mathbf{D}_i = \mathbf{Q}_i^\top \mathbf{B}_i \mathbf{Q}_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

Dabei sind  $\mathbf{B}_1 = \mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}_2 = \mathbf{A}^{-1}$  und  $\mathbf{B}_3 = \mathbf{A}^3$ .

### Aufgabe 1.6: Symmetrische Matrizen

- a) Bestimmen Sie mit Hilfe des Gaußschen Algorithmus die inverse Matrix von

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- b) Ist  $\mathbf{A}^{-1}$  wieder symmetrisch? Gilt diese Aussage für beliebige invertierbare symmetrische Matrizen?

### Aufgabe 1.7: Umkehrfunktion

Gegeben seien die folgenden Funktionen

- i)  $f_1(x) = e^{\frac{1}{x}}$ ,                      iii)  $f_3(x) = \sin(x)$ ,
- ii)  $f_2(x) = \frac{1}{x^2-1}$ ,                      iv)  $f_4(x) = \tan(x)$ .

- a) Bestimmen Sie den maximalen Definitionsbereich und den Wertebereich.
- b) Bestimmen Sie die Einschränkung des Definitionsbereichs und Wertebereichs, so dass die Funktionen bijektiv sind. (Betrachten Sie, falls nötig, den Hauptzweig.)
- c) Bestimmen Sie die inverse Funktion.
- d) Skizzieren Sie die Funktion sowie deren inverse Funktion.

### Aufgabe 1.8: Umkehrfunktion

Gegeben seien die folgenden Funktionen. Geben Sie den Definitionsbereich an (betrachten Sie dabei den Hauptwert der Funktion) und überprüfen Sie, ob die Funktionen invertierbar sind. Bestimmen Sie jeweils die inverse Funktion.

- i)  $f(x) = 2x - 1$ .
- ii)  $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ .
- iii)  $f(x) = (x - 1)^{\frac{1}{3}}$ .
- iv)  $f(x) = \frac{x}{x+1}$ .
- v)  $f(x) = \log_2(x+3)$ .
- vi)  $f(x) = 2 + e^{x-1}$ .
- vii)  $f(x) = \arccos(x^{-2})$ .

### Aufgabe 1.9: Inverse Funktion

Gegeben seien die folgenden Funktionen

- i)  $f_1(x) = e^{\frac{1}{x}}$ ,                      iii)  $f_3(x) = \sin(x)$ ,
- ii)  $f_2(x) = \frac{1}{x^2-1}$ ,                      iv)  $f_4(x) = \tan(x)$ .

- a) Bestimmen Sie den maximalen Definitionsbereich und den Wertebereich.
- b) Bestimmen Sie die Einschränkung des Definitionsbereichs und Wertebereichs, so dass die Funktionen bijektiv sind. (Betrachten Sie, falls nötig, den Hauptzweig.)
- c) Bestimmen Sie die inverse Funktion.
- d) Skizzieren Sie die Funktion sowie deren inverse Funktion.

### Aufgabe 1.10: Umkehrfunktion

- a) Geben Sie zu den folgenden Funktionen an, in welchem Bereich sie umkehrbar sind, geben Sie im Punkt  $(0, f_j(0))$  den Wert der Ableitung von  $f_j^{-1}(x)$  an.

$$f_1(y) = y^3 - 3y$$
$$f_2(y) = \frac{y^2 + 3y}{1 - y}$$

b) Gegeben seien die Funktionen

$$g_3(x) = \tan(x), \quad g_4(x) = e^{x^2+2x-8}, \quad g_5(x) = \cosh(x), \quad g_6(x) = \frac{1}{x^2+2}.$$

Bestimmen Sie zunächst die Ableitungen  $g'_j(x)$  ( $j = 3, 4, 5, 6$ ) dieser Funktionen. Ermitteln Sie daraus mit Hilfe von Satz 3.38 (Ableitung der Umkehrfunktion) die Ableitung der Umkehrfunktionen  $f_j(y) = g_j^{-1}(x)$  ( $j = 3, 4, 5, 6$ ). (Es gilt  $f_j(g_j(x)) = x$ .) Geben Sie auch für jede Funktion an, in welchem Bereich die Umkehrfunktion erklärt ist.

---

#### Ergebnisse zu Aufgabe 1.1:

$A$  und  $B$  sind nicht positiv definit,  $C$  ist positiv definit.

#### Ergebnisse zu Aufgabe 1.2:

a)  $\text{Rang}(A) = 2$ ,  $\text{Bild}(A) = \text{span}\{(1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2})^\top, 1/\sqrt{8}(1 - i, 2, i - 1)^\top\}$ ,  
 $\text{Kern}(A) = \text{span}\{1/\sqrt{3}(i, -1, 1, 0)^\top, 1/\sqrt{21}(2 - i, -2 - i, i - 1, 3)^\top\}$   
b)  $b_{-i} \in \text{Bild}(A)$

#### Ergebnisse zu Aufgabe 1.3:

a)  $\det B = -48$

#### Ergebnisse zu Aufgabe 1.4:

$\det A = -160$ ,  $\det B = -6$ ,  $\det C = 40$ ,  $\det D = -2$

#### Ergebnisse zu Aufgabe 1.5:

b)  $\lambda \in \{-2, 6\}$ ,  $v_1 = (1, 0, -1)^\top$ ,  $v_2 = (1, 0, 1)^\top$ ,  $v_3 = (0, 1, 0)^\top$

#### Ergebnisse zu Aufgabe 1.6:

a)  $A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

#### Ergebnisse zu Aufgabe 1.8:

i)  $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$ . ii)  $f^{-1}(x) = x^3$ . iii)  $f^{-1}(x) = x^3 + 1$ . iv)  $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x}$ . v)  $f^{-1}(x) = 2^x - 3$ . vi)  $f^{-1}(x) = \ln(x-2) + 1$ . vii)  $f^{-1}(x) = \pm \frac{1}{\sqrt{\cos x}}$ .

#### Ergebnisse zu Aufgabe 1.10:

a)  $f_1^{-1}(0) = -1/3$ ,  $f_2^{-1}(0) = 1/3$