

Fax: 01 72 09 13 13

## **Ordonnance**

**Bétadine Scrub 1%** 1 flacon

Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention, s'abstenir en cas d'allergies à l'iode





Fax: 01 72 09 13 13

## **Ordonnance**

A faire de préférence dans les 13 premiers jours qui suivent le 1<sup>er</sup> jour des règles.

## Bilan mammaire préopératoire :

Mammographie et échographie si nécessaire.

Fax: 01 72 09 13 13



## **Ordonnance**

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes VS TC, TCK, TP Groupe rhésus + Agglutinines Glycémie Urée Ionogramme sanguin Sérologie hépatite B et C HIV



phbellity@gmail.com

Secrétariat : 01 30 87 87 87 Assistante Natasha : 06 07 87 95 85

Fax: 01 72 09 13 13



## **Ordonnance**

Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.

Fax: 01 72 09 13 13



### **Ordonnance**

A prendre 21 jours avant l'intervention

**Fumafer** 

3 comprimés par jour

**Spéciafoldine** 

3 comprimés par jour

**Vitamines B12** 

3 comprimés par jour



Fax: 01 72 09 13 13



# Ordonnance pour l'infirmière

Pansements 1 fois par semaine, à domicile, par une Infirmière Diplômée d'Etat, pendant 15 jours pour les patients ne pouvant venir en consultation post-opératoire

Fax: 01 72 09 13 13



### Ordonnance de sortie

#### **Codoliprane 500**

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boite).

#### Lamaline

1 suppositoire 1 à 3 fois par jour, en cas de douleurs insistantes et pendant 2 à 3 jours En cas de douleur persistante contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

### Augmentin ou générique

1 gramme matin et soir pendant 8 jours. NE PAS PRENDRE EN CAS D'ALLERGIE CONNUE À LA

PENICILLINE, dans ce cas contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

**2 boites de LUMIDERM 10x30cm** à apporter en consultation postopératoire

Dakin: 1 flacon

Compresses stériles (40x40 cm): 20 compresses



## Ordonnance pour traitement homéopathique

**GELSEMIUM 15 CH: 2 doses** 

1 dose 8 jours avant l'intervention

1 dose la veille de l'intervention

**ARNICA 9 CH: 3 tubes** 

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention 5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

STAPHYSAGRIA 7 CH: 3 tubes

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.

Dr BELLITY Philippe 75 1 70840 5 Clinique Elysée Montaigne 3 rue Marignan 75008 PARIS

Secrétariat : 01 30 87 87 87 Assistante Natasha : 06 07 87 95 85

Fax: 01 72 09 13 13