

## Ordonnance

**Bétadine Scrub 1%**

1 flacon

*Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention, s'abstenir en cas d'allergies à l'iode*

## **Ordonnance**

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes

VS

TC, TCK, TP

Groupe rhésus + Agglutinines

Glycémie

Urée

Ionogramme sanguin

Sérologie hépatite B et C

HIV

## **Ordonnance**

Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.

## **Ordonnance de sortie**

### **Paracetamol 500**

2 comprimés 4 fois par jour

### **Codoliprane 500 – si douleurs persistentes**

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boîte).

### **Lamaline**

1 suppositoire 1 à 3 fois par jour, en cas de douleurs insistantes et pendant 2 à 3 jours  
En cas de douleur persistante contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

## **Ordonnance pour traitement homéopathique**

### **GELSEMIUM 15 CH : 2 doses**

1 dose 8 jours avant l'intervention

1 dose la veille de l'intervention

### **ARNICA 9 CH : 3 tubes**

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

### **STAPHYSAGRIA 7 CH : 3 tubes**

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

*Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.*