

Ordonnance

Bétadine Scrub 1%

1 flacon

Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention.

Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes

VS

TC, TCK, TP

Groupe rhésus + Agglutinines

Glycémie

Urée

Ionogramme sanguin

Sérologie hépatite B et C

HIV

Ordonnance

Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.

Ordonnance de sortie

Fer, vitamines, anticoagulants
(APRÈS LIPOASPIRATION ET CHIRURGIE DU VENTRE)

FUMAFER

3 comprimés par jour /15 jours

SPÉCIAFOLDINE

3 comprimés par jour/15 jours

Vitamine B12

3 comprimés par jour/15 jours.

LOVENOX 0.4

Une injection par jour tous les jours à la même heure par une infirmière diplômée à domicile pendant 15 jours.

Modifiez votre alimentation pour y inclure des aliments plus riches en fer, comme les viandes rouges et blanches, le poisson, les palourdes, les huîtres, les légumes-feuilles vert foncé, les grains entiers, les légumineuses et les pains et céréales enrichis de fer. Un supplément de vitamine C : 1 GRAMME PAR JOUR LE MATIN peut favoriser l'absorption du fer.

Faire pratiquer au laboratoire d'analyse une numération des plaquettes une semaine après la sortie.

Ordonnance de sortie

Paracetamol 500

2 comprimés 4 fois par jour

Codoliprane 500 – si douleurs persistentes

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boîte).

Lamaline

1 suppositoire 1 à 3 fois par jour, en cas de douleurs insistantes et pendant 2 à 3 jours
En cas de douleur persistante contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

Ordonnance pour infirmière

Pansements à refaire à domicile une fois par semaine pendant deux semaines par une infirmière diplômée pour les patients ne venant pas en post-opératoire.

2 boîtes de pansements LUMIDERM de 10x30 cm à apporter en consultation post-opératoire.

Dakin : 1 flacon

Compresse stérile (40x40cm) : 20 compresses

Ordonnance pour traitement homéopathique

GELSEMIUM 15 CH : 2 doses

1 dose 8 jours avant l'intervention

1 dose la veille de l'intervention

ARNICA 9 CH : 3 tubes

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

STAPHYSAGRIA 7 CH : 3 tubes

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.

ORDONNANCE POUR L'INFIRMIERE DIPLOMEE D'ETAT

Faire pratiquer tous les jours à la même heure pendant 15 jours à domicile une injection de Lovenox 0,4 en sous cutanée par une infirmière diplômée d'état.