



Ordonnance

Bétadine Scrub 1%

1 flacon

Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention.



Ordonnance

Bilan mammaire préopératoire :

Mammographie et échographie si nécessaire.



Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes

VS

TS, TC, TCK, TP

Groupe rhésus + Agglutinines

Glycémie

Urée

Ionogramme sanguin

Sérologie hépatite B et C

HIV

ECBU



Ordonnance

Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.



Ordonnance

Pansements à refaire tous les deux jours pendant deux semaines par une infirmière diplômée.

Produits en quantité suffisante :

1-Nettoyer la cicatrice avec un compresse non tissée stérile et de la CHLOREXIDINE.

2-S'il existe des croûtes laisser imbiber une compresse stérile avec de l'eau oxygénée sur la cicatrice pendant 3 minutes.

3-Passer une compresse stérile largement imbibée de Bétadine jaune, laisser sécher une minute.

4-Appliquer une feuille de tulle gras pliée en deux tout au long de la cicatrice.

5-Poser une compresse stérile pliée en deux puis une bande d'Hypafix.



Ordonnance

Codoliprane 500

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boîte).

Lamaline

1 suppositoire 1 à 3 fois par jour, en cas de douleurs insistantes et pendant 2 à 3 jours
En cas de douleur persistante contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

Augmentin ou générique

1 gramme matin et soir pendant 8 jours.

NE PAS PRENDRE EN CAS D'ALLERGIE CONNUE À LA PENICILLINE, dans ce cas
contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.



Ordonnance pour traitement homéopathique

GELSEMIUM 15 CH : 2 doses

1 dose 8 jours avant l'intervention
1 dose la veille de l'intervention

ARNICA 9 CH : 3 tubes

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention
5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

STAPHYSAGRIA 7 CH : 3 tubes

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.