



Ordonnance

Bétadine Scrub 1%

1 flacon

Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention.



Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes

VS

TS, TC, TCK, TP

Groupe rhésus + Agglutinines

Glycémie

Urée

Ionogramme sanguin

Sérologie hépatite B et C

HIV



Ordonnance

Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.



Ordonnance de sortie

Codoliprane 500

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boîte).

Solupred 20mg

2 comprimés par jour le matin en une prise pendant 3 jours puis un comprimé le matin pendant deux jours.

En cas d Hypertension artérielle ou d'ulcère à l'estomac ne pas prendre ce traitement et prévenir votre chirurgien ou votre anesthésiste.

Nettoyer les cicatrices délicatement avec une compresse non tissée et de la **chlorexidine**.

S'il existe des croûtes imbiber largement une compresse avec de l'**eau d'AVÈNE en bombe** et laisser reposer sur la cicatrice pendant plusieurs minutes.



Ordonnance pour traitement homéopathique

GELSEMIUM 15 CH : 2 doses

1 dose 8 jours avant l'intervention
1 dose la veille de l'intervention

ARNICA 9 CH : 3 tubes

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention
5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

STAPHYSAGRIA 7 CH : 3 tubes

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.