



## Ordonnance

Bétadine Scrub 1% : 1 flacon

*Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention.*



## Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes  
VS  
TS, TC, TCK, TP  
Groupe rhésus + Agglutinines  
Glycémie  
Urée  
Ionogramme sanguin  
Sérologie hépatite B et C  
HIV

Acte gratuit

Dr BELLITY Philippe  
75 1 70840 5  
Clinique Elysée Montaigne  
3 rue Marignan  
75008 PARIS

Secrétariat : 01 30 87 87 87  
Assistante Natasha : 06 07 87 95 85  
Fax : 01 72 09 13 13



## Ordonnance

Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.

Acte gratuit

Dr BELLITY Philippe  
75 1 70840 5  
Clinique Elysée Montaigne  
3 rue Marignan  
75008 PARIS

Secrétariat : 01 30 87 87 87  
Assistante Natasha : 06 07 87 95 85  
Fax : 01 72 09 13 13



### **Ordonnance de sortie**

Fer, vitamines, anticoagulants  
(APRÈS LIPOASPIRATION ET CHIRURGIE DU VENTRE)

#### **FUMAFER**

3 comprimés par jour /15 jours

#### **SPÉCIAFOLDINE**

3 comprimés par jour/15 jours

#### **Vitamine B12**

3 comprimés par jour/15 jours.

#### **LOVENOX 40**

Une injection par jour tous les jours à la même heure par une infirmière diplômée à domicile pendant 15 jours.

Modifiez votre alimentation pour y inclure des aliments plus riches en fer, comme les viandes rouges et blanches, le poisson, les palourdes, les huîtres, les légumes-feuilles vert foncé, les grains entiers, les légumineuses et les pains et céréales enrichis de fer. Un supplément de vitamine C : 1 GRAMME PAR JOUR LE MATIN peut favoriser l'absorption du fer.

Faire pratiquer au laboratoire d'analyse une numération des plaquettes une semaine après la sortie de la clinique.



## Ordonnance de sortie

### **Codoliprane 500**

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boîte).

### **Lamaline**

1 suppositoire 1 à 3 fois par jour, en cas de douleurs insistantes et pendant 2 à 3 jours  
En cas de douleur persistante contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

### **Augmentin ou générique**

1 gramme matin et soir pendant 8 jours.

**NE PAS PRENDRE EN CAS D'ALLERGIE CONNUE À LA PENICILLINE**, dans ce cas  
contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.