



## Ordonnance

### **Bétadine Scrub 1%**

1 flacon

*Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention, s'abstenir en cas d'allergies à l'iode*



## Ordonnance

### **Bilan mammaire préopératoire :**

Mammographie et échographie si nécessaire.



## Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes

VS

TC, TCK, TP

Groupe rhésus + Agglutinines

Glycémie

Urée

Ionogramme sanguin

Sérologie hépatite B et C

HIV

ECBU



## Ordonnance

Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.



## Ordonnance

Pansements à refaire tous les deux jours pendant deux semaines par une infirmière diplômée.

Produits en quantité suffisante :

1-Nettoyer la cicatrice avec un compresse non tissée stérile et de la CHLOREXIDINE.

2-S'il existe des croûtes laisser imbiber une compresse stérile avec de l'eau oxygénée sur la cicatrice pendant 3 minutes.

3-Passer une compresse stérile largement imbibée de Bétadine jaune, laisser sécher une minute. S'abstenir en cas d'allergies à l'iode.

4-Appliquer une feuille de tulle gras pliée en deux tout au long de la cicatrice.

5-Poser une compresse stérile pliée en deux puis une bande d'Hypafix.



## Ordonnance

### **Codoliprane 500**

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boîte).

### **Lamaline**

1 suppositoire 1 à 3 fois par jour, en cas de douleurs insistantes et pendant 2 à 3 jours  
En cas de douleur persistante contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

### **Augmentin ou générique**

1 gramme matin et soir pendant 8 jours.

**NE PAS PRENDRE EN CAS D'ALLERGIE CONNUE À LA PENICILLINE**, dans ce cas  
contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.



## Ordonnance pour traitement homéopathique

### **GELSEMIUM 15 CH : 2 doses**

1 dose 8 jours avant l'intervention  
1 dose la veille de l'intervention

### **ARNICA 9 CH : 3 tubes**

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention  
5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

### **STAPHYSAGRIA 7 CH : 3 tubes**

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

*Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.*