



Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes

VS

TS, TC, TCK, TP

Groupe rhésus + Agglutinines

Glycémie

Urée

Ionogramme sanguin

Sérologie hépatite B et C

HIV



Ordonnance de sortie

Eviter de prendre de l'aspirine ou de prendre des médicaments en contenant les 15 jours qui précèdent l'intervention.

Dicynone 500

Prendre 2 comprimés matin et soir en commençant 5 jours avant l'intervention. (1 boîte)

Ery 500

Prendre 1 comprimé 3 fois par jour pendant 5 jours en commençant le jour de l'intervention. (1 boîte)

Célestène 2mg

Prendre 2 comprimés par jour en une seule prise pendant 3 jours, au petit déjeuner ou au déjeuner. Commencer le jour de l'intervention et les 2 jours suivants. (1 boîte)

Codoliprane

1 à 2 comprimés en cas de douleur après l'intervention. (1 boîte)



Ordonnance pour traitement homéopathique

GELSEMIUM 15 CH : 2 doses

1 dose 8 jours avant l'intervention
1 dose la veille de l'intervention

ARNICA 9 CH : 3 tubes

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention
5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

STAPHYSAGRIA 7 CH : 3 tubes

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.